

KAIS.KÖN.HOF- BIBLIOTHEK

104.469-B

ALT-

9.80569.

104.469 B.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ
ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА.

ЧАСТЬ XIV. N. 1.

*Discere ne cessa: cura sapientia crescit:
Rara datur longo prudentia temporis usu.*

Одн.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,
ВЪ ТИПОГРАФИИ МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

1829 ГОДА.

СОДЕРЖАНІЕ.

	Стран.
I. О жизненныхъ припасахъ, какъ предметъ Медицинской Полиціи.	3.
II. О лѣченіи оправленныхъ.	61.
III. Шаберпово пропивоглистное ма- сло	85.
IV. Извлечение изъ сочиненія; Reports of Medical Cases, selected with a view of illustrating the symptoms and cure of Diseases, by a referen- ce to Morbid Anatomie	101.
V. Наружное употребленіе селипро- кислаго серебра.	113.
VI. О распряженіи связокъ	128.
VII. Смѣсь.	
1. Кѣ Анатоміи общихъ покрововъ.	135.
2. Рвотный камень какъ противолихо- радное средство.	—
3. Дешевѣйшій способъ готовить моксы.	137.
4. Ворвань (?) Oleum jecinatoris azelli.	138.
5. Яланпа какъ слабительное.	139.
6. Кора гранатоваго дерева противъ плоскихъ глистовъ.	140.

7. Водяная позвоночного столба, излеченная прокалыванием 143.
 8. Превратное положеніе внутреннихъ 145.
 9. Настойка опиума противъ полиповъ. . 146.
 10. Лечение нароста называемаго *lupus*. 147.
 11. Способъ оживлять новорожденныхъ младенцевъ Доктора Блунделла. . 148.
- VIII. Официальные извѣстія съ 1-го
Юля по 1-е Сентября 1829 года. 151.
-

I.

О ЖИЗНЕННЫХЪ ПРИПАСАХЪ, КАКЪ ПРЕДМЪТЪ Медицинской Полици.

(Продолженіе).

О растительной пищѣ.

Къ обыкновеннѣйшимъ въ нашихъ спра-
нахъ ясшвамъ, получаемымъ изъ царства
распишельнаго, принадлежащъ: 1. хлѣбъ и
хлѣбная пища, пригошовляемая изъ смоло-
шыхъ зеренъ хлѣбныхъ; 2. зелень, подъ ко-
шорою разумѣются ядомыя огородныя, садо-
выя, полевые расшенія, цѣлыя или часпи
ихъ; онѣ употребляются въ пищу сырыя,
либо измѣненныя повареннымъ искусствомъ.

I. Х Л Ъ Б Ъ .

Виды порти и подмѣсей хлѣба. Виды сія
сущъ весьма разнообразны и основываются
на вредномъ качествѣ:

1. Зеренъ хлѣбныхъ,
2. Муки хлѣбной,
3. Самага хлѣба.

Причины порчи и подмѣсей хлѣба. Каждый видъ порчи и подмѣсей хлѣба имѣетъ свои особенныя причины, а именно:

1. Хлѣбныя зерна могутъ вредить: а) болѣзненнымъ своимъ состояніемъ и б) примѣсю къ онымъ поспороннихъ, нерѣдко ядовитыхъ веществъ.

а. Болѣзни хлѣбныхъ зеренъ суть двоякаго рода. Однѣ изъ нихъ свойственны хлѣбнымъ распеніямъ, прозябающимъ еще въ полѣ, а другія состоятъ въ болѣзненномъ измѣненіи хлѣбныхъ зеренъ, по сожатіи уже хлѣбныхъ распеній. Къ первымъ относятся: рожки, медуница, головня, изгара. Къ послѣднимъ принадлежатъ хлѣбныя зерна, поросшія, запылыя, запхлыя, равно также зерна, полученныя изъ такихъ хлѣбныхъ распеній, которыя пожинаются прежде наступленія совершенной ихъ зрѣлости.

Рожки (*Secale cornutum*) свойственны, почти исключительно, ржи: ибо, кромѣ ячменя, другія пахатныя распенія весьма рѣдко

подвергаются сей болѣзни *), состоящей въ томъ, что большее или меньшее число колосныхъ зеренъ превращается въ темнобурые, нерѣдко искривленные наросты, видомъ своимъ и длиною подобные пшичьему ногтю. По сей-то причинѣ дано сей болѣзни Французское названіе Ergot. Наросты сіи имѣють снаружи продолговатыя полосы, а внутри представляють бѣловатое или голубоватое существо. Замѣчено, что холодъ и продолжительные дожди, бывающіе во время образованія молодыхъ зеренъ, наиболѣе благоприятствуютъ рожкамъ. По опытамъ *Кнапе* **) *Кирхейзена* ***), и другихъ, можно

*) *Тессье* и *Тилле* видѣли рожки и на пшеницѣ (Tessier de Clave—in Mémoires de la Société Roy. de Med. A. 1776. стр. 417. A. 1777 et 1778 стр. 587. Tillet dissert. sur la cause qui corrompt et noircit les grains du bled dans les épis et les moyens de prévenir les accidens. 1755.).

**) Kritische Jahrbücher der Staatsarzneykunde für das 19-te Jahrhundert. Herausg. v. Ch. Knappe u. A. F. Hecker. I. B. 2. T. Berlin. 1808 стр. 243.

***) J. P. G. Kircheisen's Beobachtungen über das Mutterkorn und dessen Entstehung. Mit einer Vorrede v. C. G. Gruner. Altenburg. 1800.

произвести искусственнымъ образомъ рожки чрезъ частое поливаніе ржи, посѣянной на мокрой почвѣ. Въ Французской провинціи Солонь рожки весьма часто появляются и несравненно чаще, нежели во всей Франціи. Какъ древніе не сѣяли ржи, то, кажется, рожки не были имъ извѣстны. Хлѣбныя зерна, спраждающія рожками, неспособны для расплода, незаразительны для здоровыхъ зеренъ, но вредны не только для людей, но и для животныхъ. Аббапъ Тессье *) давалъ нѣкопорымъ животнымъ рожки, смѣшенные съ кормомъ, отъ чего они вскорѣ лишились жизни. По мнѣнію Вильденова **), рожки происходятъ отъ того, что образованіе сердечка сѣменнаго (corculum) замедляется, такъ что одно только боковое плѣдо сѣмени или половинка (cotyledon, albumen) расщепъ и достигаетъ чрезмѣрной величины. Посему состояніе сіе сходствуеетъ съ заносомъ или мапочнымъ клубомъ (mola). Поле и Декандоль ***)) уш-

*) Пр. соч. Mémoires de la Soc. Roy. de Medecine.

**) C. L. Willdenov Grundriss der Kräuterkunde, 4-te Auflage. Berlin. 1805. стр. 468.

***)) Leçons de Medecine legale, par M. Orfila. T. II. Paris. 1821. стр. 293.

верждають, что грибъ, извѣстный подъ именемъ *Sclerotium*, выросшая вмѣсто зерна въ сѣменной оболочкѣ, составляетъ рожки. Не смотря однакожь на сіе разногласіе въ мнѣніяхъ, *Вокеленъ* *), при химическомъ разложеніи рожковъ, нашелъ въ нихъ густое масло и амміакъ, — вещества, ненаходимыя въ здоровой ржи; припомъ клейковатое вещество было совершенно измѣнено, а крахмалу вовсе не оказалось. Иногда замѣчаючися на рожкахъ малыя насѣкомыя, копорымъ также приписываемо было происхожденіе сей болѣзни, хотя и несправедливо, потому что въ новѣйшія времена замѣчены на ржаныхъ и пшеничныхъ колосьяхъ особенныя наросты, отличныя отъ рожковъ, но дѣйствительно производимыя насѣкомыми. Такъ многіе Силезскіе Напуралисты доказали, что насѣкомыя прокалываютъ колосья ржаныя или пшеничныя и въ сдѣланное отверстіе кладутъ свои лички, отъ чего наконецъ вырастаютъ на колосьяхъ не рожки, но особенныя красныя наросты. Бреславскій Профессоръ *Миллеръ*

*) Тамъ же и *Manuel medico-legale des poisons*. par. E. de Montmahon. Paris. 1824. стр. 181.

нашелъ посредствомъ микроскопа въ шаковыхъ колосьяхъ нѣсколько насѣкомыхъ, называемыхъ *Vibrio tritici* *).

Медуница (*Mellago*) есть сладковато-припорный, прозрачный, клейкій сокъ, покрывающій поверхность ржаныхъ зеренъ. Сокъ сей есть не иное что, какъ испарина зеренъ, чрезмѣрно возвышенною температурою атмосферы приведенная въ засохшее и плотное состояніе **), отъ чего мучнистая часть зерна теряетъ свои качества и подвергается порчѣ. Кипячая вода, наливая на сей сокъ, получаетъ пленку на поверхности своей, издаетъ проливный запахъ и скоро подвергается гнилости.

Головня (*Ustilago*) есть распуханіе и превращеніе зеренъ въ черную клейкую пыль, которая либо занимаетъ внутреннюю только часть зерна и тогда называется *carbunculus*, либо же вмѣстѣ и наружную часть, а посему поражаетъ цѣлое зерно и тогда на-

*) Archiv für die gesammte Naturlehre. Herausg. von Kastner. 10. B. 4-tes Heft.

**) C. F. L. Wildberg's praktisches Handbuch für Physiker. I. T. Erfurt. 1823. §. 85. стр. 62. Handbuch der Staats - Arzneywissenschaft v. I. F. Niemann. I. T. стр. 420-421.

зывается *caries*. Сія болѣзнь преимущественно свойственна пшеницѣ и рѣдко появляеи-ся на ячменѣ и овсѣ, а еще рѣже на ржи. Касапельно происхожденія головни на мно-гихъ полевыхъ распеніяхъ, произрастающихъ вмѣстѣ съ пахатными распеніями, имен-но же на слѣдующихъ: *Tragopogon pratense*, *Serratula arvensis*, *Carex hirta et arenaria*, *Кнапе* говоритъ *), что шупъ образуется мелкій грибокъ *Uredo segetum*, который весь-ма удобно переносится въпромѣ на хлѣбныя сѣмена. Грибокъ сей состоитъ изъ черной пы-ли, развивающейся подъ внѣшнею кожицею хлѣбныхъ зеренъ; послѣ сего кожаца разры-вается и цѣлое зерно представляется въ видѣ черного клейкаго порошка.

Изгара (*Rubigo*) появляется въ видѣ жел-шопокрасной пыли на стебляхъ и листьяхъ всѣхъ пахатныхъ распеній и опнииаеишъ у зеренъ мучнистую часть, слѣдспвенно суще-спвенно питапельную. Древніе Римляне празд-новали ежегодно 25-е число Апрѣля; празд-никъ сей назывался *Robigaliae* и учрежденъ былъ Нумою Помпиіемъ въ честь богини *Robigo* или *Rubigo*, для полученія опъ сего

*) Прив. Соч. стр. 244.

божества защиты пропиву изгары пахатныхъ распеній. По наблюденіямъ *Кнапе* *), изгара происхожденіемъ своимъ сходствуесть съ головнею и зависить отъ другаго, также мелкаго гриба, *Uredo linearis*, или *Aecidium berberidis*. Онъ расстепъ на листьяхъ нѣкоторыхъ полевыхъ распеній (*Berberis vulgaris*, *Rosa canina et rubiginosa*, *Ribes grossularia*), и если распенія сіи находятся въ сосѣдствѣ съ хлѣбными распеніями, то грибокъ сей переносится вѣтромъ отъ первыхъ на послѣднія. Отягченное большимъ количествомъ сихъ грибовъ распеніе изнуряется такъ, что стебель и листья получаютъ болѣзненный видъ, а зерна дѣлаются пустыми. *Кнапе* чрезъ искусственный посѣвъ сего гриба произвелъ на многихъ распеніяхъ изгару.

Всѣ сіи болѣзни хлѣбныхъ зеренъ сообщаютъ приговоренному изъ оныхъ хлѣбу вредное свойство. Послѣ употребленія такого хлѣба люди получали особенный свербежъ кожи или зудъ, за которымъ слѣдовали судороги и корчи; отъ чего и взято Нѣмецкое названіе *Kriebelkrankheit*. Къ дальнѣйшимъ припадкамъ принадлежатъ: помѣшательство

*) Тамъ же.

ума и, что весьма примѣчательно, усиленный позывъ на ѣду, также сухой антоновъ огонь, причемъ опваливаются пальцы на ногахъ или рукахъ. Впрочемъ сухой антоновъ огонь, какъ замѣчаетъ *Франкъ* *), въ нынѣшнія времена весьма рѣдко появляется, такъ что одни только пузыри и пятна, вмѣстѣ съ оппаденіемъ персповъ, иногда оказываются. Совокупность всѣхъ сихъ przypadковъ имѣетъ, несвойственное впрочемъ, названіе *garbania*, взятое отъ того, что славный *Линней* сіи болѣзненные явленія, оказавшіяся въ Швеціи, приписалъ употребленію въ пищу хлѣба, смѣшаннаго съ полевою рѣдкою (*Raphanus garbanistrum*).

Поросшія, запрѣлыя, запхлыя хлѣбныя зерна совершенно лишаются пшпательныхъ частей, такъ что оспаеется одна только шелуха, особливо въ пережженныхъ, легко пальцами распираемыхъ зернахъ; изъ чего выходитъ мука, нисколько непишпательная и неспособная къ надлежащему броженію или закисанію. Сія порча оказывается на хлѣб-

*) J. P. Frank's System einer vollständigen Medic. Polizey. 3. B. Dritte Auflage. Wien. 1787. стр. 207 (§ 11.).

ныхъ зернахъ тогда, когда, впрочемъ зрѣлая, хлѣбныя растенія, будучи сняты съ стебля, кладутся поспѣху въ кучу, безъ надлежащаго провѣтриванія оныхъ, особливо же въ сыромъ мѣстѣ и при дождливой погодѣ. Равнымъ образомъ, при дальнихъ пранс-портахъ вымолоченнаго уже хлѣба сухимъ пушемъ и водою, особливо когда мѣшки, наполненные хлѣбными зернами, кладутся въ большія высокія кучи, нерѣдко зараждается сія порча въ среднемъ и нижнемъ ряду мѣшковъ. Замѣчено, что хлѣбныя зерна, прозябавшія на полѣ, цѣлый годъ опдыхавшемъ, прочнѣе и при всѣхъ равныхъ обстоятельствеихъ менѣе подвержены порчѣ, нежели зерна, выросшія на полѣ, ежегодно засѣваемомъ, коего распыленность чрезмѣрнымъ удобреніемъ какъ бы вынуждается. Менѣе всѣхъ подвержены сей порчѣ хлѣбныя зерна, собранныя въ такіе годы, когда жатва была совершенно суха и зерна надлежащимъ образомъ созрѣли; однакожь и въ семъ случаѣ долѣе сохраняется рожь и ржаная мука, нежели пшеница и пшеничная мука *).

*) Militärische Gesundheits Polizey v. I. N. Isfor-

сія имѣетъ свои степени, которыя оказываются на самыхъ зернахъ, а именно:

Поросшіе свѣжіе или высохшіе оппрыски или распочки, которые оказываются въ видѣ нипей на понкомъ кончикъ зерна.

Черезъ разгоряченіе измѣненные и запхлыми сдѣлавшіяся сѣмена, коихъ внупренность превращается въ желшую и горькую пережженную золу.

Несозрѣлыя хлѣбныя зерна, какъ неимѣющія еще надлежащаго количества и качества мучнистыхъ частей, не могутъ доставить здоровой пищи. Опъ употребленія таковой пищи приключаются глисты, водяная болѣзнь, расстройство пищеварительныхъ органовъ, сухотка и проч.

б. Постороннія вещества, находимыя въ хлѣбныхъ зернахъ, суть нѣкоторыя насѣкомыя, сѣмена вредныхъ распеній, пыль, песокъ, земля и проч.

Изъ насѣкомыхъ частѣйшія суть: черный ржаной червь (*Curculio granarius*. L., *Calandria granaria*. Fabr.), насѣкомое чернобураго цвѣта, съ малыми почками на груди. Онъ

dink. I. B. Wien. 1827. (2-te Aufl). Стр. 257.

§ 136.

пожираетъ зерна, будучи еще въ видѣ личинки и уже въ совершенномъ состояніи. Одна пара сихъ насѣкомыхъ размножается въ одинъ годъ до 6000. Часпо на каждомъ зернѣ сидитъ такое насѣкомое.

Красной ржаной червь (*Attelabus frumentarius*. F., *Curculio frumentarius*. L.), насѣкомое красно-кровянаго цвѣта, съ надрѣзнымъ и полосатымъ покрываломъ. Видъ его овальный. Онъ испребляетъ въ зернахъ все мучное вещество и оставляетъ одну только шелуху; водится наиболѣе въ старыхъ хлѣбныхъ зернахъ.

Бѣлая ржаная моль или бѣлый червь (*Tinea granella*), насѣкомое бѣло-сребристаго цвѣта, съ бурюю головою. Онъ попадаетъ наиболѣе во ржи, которую сбиваетъ въ малые комки. Въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи бѣлый червь превращается въ бабочку (*Phalaena granella*).

Всѣ сіи насѣкомыя водятся наиболѣе въ тѣхъ хлѣбныхъ магазинахъ, гдѣ вымолоченный хлѣбъ складывается въ кучу весьма плотно и остается долго въ совершенномъ покоѣ.

Вредныя растенія, коихъ сѣмена могутъ быть смѣшаны съ хлѣбными зернами, суть: полевая рѣдка (*Raphanus raphanistrum*), мян-

лина (*Bromus secalinus*), плевель или голо-
волоомъ (*Lolium temulentum*), паспушья сум-
ка (*Thlaspi arvense*), куколь (*AgrostHEMA
githago*), коровій кормъ (*Melampyrum nemo-
rosum et arvense*), пѣтушій гребешокъ (*Rhi-
nanthus crista galli*) и проч. Сии ядовитыя
сравы распушѣ черѣдко посреди пахашныхъ
распеній, съ коими если пожинаются вмѣ-
стѣ, то при опдѣленіи хлѣбныхъ зеренъ
опѣ колосевъ легко также опдѣляются
справыя сѣмена и смѣшиваются съ хлѣб-
ными зернами. Если сѣмена сии вмѣстѣ съ
хлѣбными зернами превращаются въ муку,
то хлѣбъ, пригопшвенный изъ оной, при-
чиняетъ припадки опьяненія, особливо голов-
ную боль, слабоспѣ внѣшнихъ чувствъ, дро-
жаніе членовъ и ш. д. Впрочемъ если съ
хлѣбною мукою смолотись сѣмена паспушьеѣ
сумки или коровьяго корму (см. выше), то
хлѣбъ сего рода дѣлается только чернымъ
и прудноваримымъ *).

Пыль, песокъ, земля и другія подобныя
примѣси случаются въ хлѣбныхъ зернахъ,

*) Systematisches Handbuch der Staats - Arzney-
kunde von Joseph Bernt. Erster Theil. Wien.
1816. Стр. 280 - 281. § 706.

какъ очевидно, опть молоченія хлѣбныхъ распецій на грязномъ, пыльномъ, нечиспомъ шокъ или гумнѣ.

2) Хлѣбная мука получаетъ вредныя качества или во время самого молошья ея, или уже по смолошью. Частѣйшія въ такихъ случаяхъ порчи и подмѣси суть слѣдующія:

а). Нерѣдко мельники, для скорѣйшаго окончанія работы, мелютъ хлѣбныя зерна очень слабо, опть чего мука бываетъ весьма крупная; или же, для собственной выгоды, мелютъ онаы очень сильно, опть чего выходитъ мука чрезъ мѣру тонкая. Тѣсно, приготавливаемое изъ очень тонкой муки, медленно закишается или и совсѣмъ не закишается. Мука слишкомъ крупная легко запрѣваетъ. Послѣдній родъ муки наиболѣе употребляется продавцами для покрытія постороннихъ мучныхъ примѣсей (гороховой муки и проч.).

б. Смѣшиваніе лучшей муки съ худшею. Иногда мельники берутъ для себя муку изъ данныхъ имъ для молошья зеренъ, а вмѣсто оной опдають свою крупную муку, или даже гороховую, ячменную, муку изъ бобовъ и проч. Во всѣхъ сихъ случаяхъ приготовленный хлѣбъ бываетъ мало питателенъ

и безвкусенъ, припомъ же и прудноваримъ: ибо пекаръ упошребляеть на закваску время, нужное для хорошей муки, между тѣмъ какъ подмѣшанная мука въ печеніи шакого времени не успѣваетъ окиснуть, и попому даеть неспѣлое тѣсто и прудноваримый хлѣбъ. Таковой хлѣбъ, особливо въ походахъ, гдѣ солдаты не всегда могутъ пользоваться порціею спиртныхъ напитковъ и припомъ подвергаются худой погодѣ, причиняеть упорнѣйшіе поносы и опасныя изнуренія.

в. Къ частѣйшимъ примѣсамъ муки принадлежитъ песокъ. Примѣсъ сія зависить отъ мягкости мѣльничныхъ камней, или же отъ того, что хлѣбныя зерна мѣлются свѣже-насѣченными камнями. Нерѣдко мѣльники, при первомъ спускѣ, нарочно укрѣпляютъ мѣльничные камни весьма туго, дабы имѣть болѣе мучной пыли; отъ сего мука также получаетъ много песку. Часпо мѣльничные камни лежатъ косвенно, отъ чего съ нихъ спирается много песку, который, смѣшавшись съ мукою, даеть хлѣбъ, причиняющій запоры на низъ, боль въ желудкѣ, скиррную окрѣпость

и даже дыры въ желудкѣ, какъ шо замѣпилъ Профессоръ Рейль 1810 года въ Галле *).

г. Гипсъ (Sulphas calcis) попадаетъ въ муку или случайно, ш. е., когда хлѣбныя зерна мѣлются жерновами, употребленными прежде того для молотья гипсу, или же примѣсь сія дѣлается нарочно, дабы увеличить вѣсъ муки и самого хлѣба.

д. Мѣлъ (Carbonas calcis) прибавляется съ такимъ же намѣреніемъ, какъ и гипсъ.

е. При дороговизнѣ барышники увеличиваютъ вѣсъ муки чрезъ прибавленіе къ ней древесной золы, или золы изъ костей.

ж. Подмоченіе муки дѣлается или нарочно для увеличенія вѣсу, или же зависить отъ содержанія муки въ сырѣмъ, запершѣмъ мѣстѣ. Таковая мука въ печеніи нѣсколькихъ дней можетъ совершенно испорпиться. Такъ называемый поплый хлѣбъ есть мука, подмоченная при перевозкѣ ея на баркахъ.

з. Лежалая, пропухлая мука есть слѣдствіе подмоченія ея, или весьма долгаго лежанія въ большой кучѣ.

*) Isfordink. Пр. соч. I. Ч. стр. 251. §. 139.

и. Опъ шаковыхъ же причинъ зараждаются въ мукъ черви, испребляющіе клейкое вещество ея.

і. Свинцовыя бѣлила (*Subcarbonas plumbi*) доспавляютъ мукъ бѣлѣйшій цвѣтъ, а хлѣбу изъ оной больше вѣсу, и по шаковому корысполубивому виду примѣшиваются иногда къ мукъ.

к. Висмушовыя бѣлила (*Subnitras bismuti*) подмѣшиваютъ къ мукъ по шаковому же поводу, какъ и свинцовыя.

л. Углекислый попашъ и зола прибавляющся иногда хлѣбниками къ мукъ для того, чтобы химическимъ оныхъ дѣйствіемъ и искусственнымъ развиваніемъ различныхъ газовъ, безъ наспоющаго броженія, доведишь хлѣбъ до того, чтобы онъ поднимался и выпекался. Подмѣсъ сія нерѣдко случается въ здобномъ хлѣбѣ и кондитерскихъ заѣдкахъ.

м. Для доспавленія бѣлизны хлѣбу прибавляютъ къ мукъ квасцы (*Supersulphas aluminæ et potassæ*); но чтобы хлѣбъ такой не дѣлалъ запора на низъ, то прибавляется сверхъ того порошокъ ялапнаго корня (*rad. Jalappæ*)

✱

3. Испеченный хлѣбъ дѣлается вреднымъ: чрезъ худое печеніе онаго, чрезъ постороннія примѣси и чрезъ долгое лежаніе.

Хлѣбъ изъ муки свѣже-смолопой не соопвѣспивуетъ своей цѣли, также какъ и хлѣбъ недопеченный или перепеченный.

Хлѣбъ, внупри пустой, съ малою шолько частію мякища, зависипть опть весьма мягкаго пѣста; опть чего хлѣбы, вынупые прежде другихъ изъ квашни, перекисають. Хлѣбъ сжапый и мало поднявшійся при печеніи, зависипть опть пропивныхъ причинъ, опть весьма сухаго пѣста. Въ семъ случаѣ первые хлѣбы мало окисають, а послѣдніе и вовсе не окисають.

Хлѣбъ весьма швердый, жесткій, неупругій и жирный зависипть сколько опть худаго и сухаго выработыванія пѣста, сполько же и опть небрежнаго управленія печнымъ жаромъ.

Хлѣбъ влажный и споль мокрый, чпо можно изъ онаго выдавипть воду, происходипть опть шого, чпо въ квашню положено весьма много кислаго пѣста и чрезъ шо очень ускорено поднятіе всей массы, копторая, бывъ посажена въ весьма жаркую печь и наскоро испечена, получаетъ снаружи

красивую бурую корку, внутри коей накопляется мокропа.

Если къ хлѣбу прибавляются худые дрожжи, то онъ не поднимается въ печи и бываетъ спяжель. Впрочемъ хлѣбъ хорошо испеченный, если разрѣзывается пощчасъ по вынутіи изъ печи, покажется всегда спяжельмъ. Извѣстно также, что пекари часто не даютъ хлѣбу того вѣса, какой по таксъ должно ему имѣть; а для скрыванія сего обмана не допекаютъ хлѣбъ и теплый еще кладутъ въ шкапы, стоящіе у влажныхъ стѣнъ и крѣпко запираютъ, дабы испареніе хлѣба въ немъ же оспавалось и удерживало его влажностъ, и такимъ образомъ прибавляютъ нужный или даже лишній вѣсъ.

Что принадлежитъ до подмѣсей хлѣба, то изъ худой или подмѣшанной муки приготовленный хлѣбъ будетъ содержать въ себѣ всѣ пѣ вещества, которыя вычислены между различными видами порчи и подмѣсей муки хлѣбной.

Сверхъ того испеченный хлѣбъ содержитъ иногда въ себѣ мѣдные и свинцовые соспавы, по причинѣ храненія пѣста въ мѣдной, свинцовой, оловянной, — нечистой посудѣ; при-

чемъ металлы сіи, окисляясь, легко растворяются въ кислотоѣ шѣста.

Наконецъ хлѣбъ чрезъ долгое лежаніе засыхаетъ, плѣснѣетъ, дѣлается кислымъ, твердымъ, или мокрымъ. Хлѣбъ, лежащій нѣсколько дней въ многочелюдныхъ покояхъ, въ казармахъ солдатскихъ, всасываетъ въ себя испаренія оныхъ. Чтобы въ семъ удостовѣриться, нужно только, замѣчаетъ *Исфординъ* *), опшѣдать вкусъ хлѣба, полежавшаго два или три дня въ большихъ казармахъ.

Предотвращеніе порчи и подлѣсей хлѣбной пищи. Само собою явствуетъ, что для сего пребуяуща мѣры, сообразныя съ вреднымъ качествомъ хлѣбныхъ зеренъ, хлѣбной муки и самаго хлѣба. Посему:

1. Для опшращенія болѣзней, коимъ подвержены хлѣбныя растенія во время прозябанія своего на нивѣ, предложены различныя мѣры, хоша и не всегда успѣшныя. Къ паковымъ мѣрамъ опносятся: выжиганіе стеблей больныхъ пахатныхъ растеній послѣ ихъ сожачія, лучшее вспахиваніе полей, засѣваніе оныхъ чистыми, сухими и здоровыми сѣме-
*) Пр. соч. 1. Ч. стр. 281. (§ 149).

нами того же или другого рода, какъ то уже и Моисей предписалъ Иудейскому народу. Если же, что весьма нерѣдко случается, больныя сѣмена хлѣбныя сожаты уже и вымолочены, то для отвращенія дальнѣйшаго вреда Врачебно-Полицейскіе Писатели совѣтуютъ строго запретить продажу и употребленіе такихъ зеренъ, опредѣливъ для сего особенныхъ смотрителей, замѣняятъ опныя больныя зерна выдачею изъ общественныхъ магазиновъ потребнаго количества здоровыхъ и хорошихъ хлѣбныхъ зеренъ и т. д. Въ общественныхъ магазинахъ древнихъ Римлянъ сохранялись, вмѣстѣ съ запасомъ хлѣба на нѣсколько лѣтъ, хлѣбныя постановленія или законы. Такова была житница, устроенная по повелѣнію *Семпронія* (*Horrea Semproniana*) и заключающая въ себѣ, кромѣ хлѣбнаго припаса, законы хлѣбные (*leges framentariae*). Законъ, извѣстный подъ именемъ: *lex annonaria*, изданъ былъ *П. Клодіемъ* и предписывалъ раздавать народу, въ случаѣ надобности, хлѣбныя зерна безденежно. Наконецъ, въ случаѣ необходимости, при недостаткѣ потребнаго въ замѣнъ количества здоровыхъ хлѣбныхъ зеренъ, предлагаются общенародно

средства, служащія къ безвредному употребленію больныхъ зеренъ. Для сей послѣдней цѣли найдено полезнымъ: просѣиваніе больныхъ зеренъ, полченіе оныхъ, вымываніе, провѣприваніе, просушиваніе, смѣшеніе съ другими сѣменами, прибавленіе къ хлѣбному пѣспу кислыхъ или, какъ другіе совѣшуютъ, жирныхъ веществъ, употребленіе припомъ другихъ яспвъ, кислыхъ или жирныхъ и проч. Болѣзненное измѣненіе хлѣбныхъ зеренъ, уже по снятіи хлѣбныхъ распеній съ стебля, предопвращается надлежащимъ провѣприваніемъ сноповъ и складываніемъ оныхъ въ сухомъ мѣспѣ и въ сухое время. Касатель-но вымолоченныхъ и очищенныхъ уже хлѣбныхъ зеренъ, если мѣшки, наполненные оными, перевозятся въ дальнія мѣста, то порча таковыхъ зеренъ предопвращается удаленіемъ отъ нихъ сырости, мокроты, расположеніемъ мѣшковъ невысокими рядами и проч. Поелику же хлѣбныя зерна, способнѣйшія для дальнихъ перевозовъ или для складки въ магазинахъ, суть пѣ, копорыя собраны изъ опдыхавшихъ долгое время полей и копорыя имѣють совершенную сухости и зрѣлости: то для сего очевидно пребуется,

чтобы жатва хлѣбная происходила въ надлежащее время, чтобы также не были продаваемы и употребляемы на муку незрѣлыя хлѣбныя зерна, чтобы наконецъ не мололись хлѣбныя зерна въ томъ же самомъ году, въ которомъ собраны оныя съ поля, а избирались бы для сего прошлогоднія: ибо свѣжія зерна не такъ крѣпки, какъ спарыя и высохшія. Въ крайней надобности признано необходимымъ новыя зерна сіи провѣшривать и сушить, по крайней мѣрѣ 14 дней, а въ запасныя магазины насыпать не прежде, какъ въ холоднѣйшее время года, которое, по замѣчаніямъ Шлюппера *), есть способнѣйшее къ отвращенію порчи хлѣбныхъ зеренъ.

Въ Провіантскихъ Регулахъ сказано по сему *): Въ сочиненныхъ договорахъ и конш-

*) Schlupper ueber Bewirthschaftung der Getreide-Magazine. Isfordink. Пр. соч. 1. В. стр. 237. (§ 136).

**) Провіантскіе Регулы. (1758 года). Третьимъ писаніемъ. Санктпетербургъ. 1821. 8. гл. III. П. 10. стр. 58. Какія кондиціи для объявленія подрячиковъ и продавцовъ вносить надлежитъ.

„ракпахъ для обязапельства подрядчиковъ и „явльшихся ради общеспвенной поставкн про- „давцовъ нижеслѣдующія конднціи вносптъ „надлежптъ, чпобъ провіантъ и фуражъ спав- „лень былъ, а именно: 1) рожъ сухая, не- „сыромолопная, нележалаа, незапхлаа и не- „подмоклаа и нн съ чѣмъ несмѣшанная, „безъ куля, въ деваятъ пудъ и проч.“ Искус- пвенное сушеніе хлѣбныхъ зеренъ, для до- спавленія онымъ должайшей прочноспн, мо- жептъ бытъ упопрелблено въ плодородныхъ только спранахъ, пѣмъ болѣе, что высу- шенныа такъ зерна неспособны уже къ за- сѣву, теряюптъ много своей сплы и потому даюптъ худую закваску; однакожъ способъ сей важенъ для военныхъ крѣпоспей, гдѣ неспѣ- гда можно запаспнсь спарыми зернами, так- же для продолжпшельныхъ спранспортовъ, въ копорыхъ новыа зерна недолго оспаюптся безъ порчн. По мнѣнію *Галнса* и *Каде де Во **), лучшее средспво къ оппвращенію бо- лѣзненнаго измѣненія хлѣбныхъ зеренъ со- спопнть въ томъ, чпобы пожннаптъ хлѣбныа распенія осьмью днями ранѣе обыкновенна- го срока. Однакожъ опытъ показаль, что

*) Jsfordink. Пр. соч. 1. Ч. стр. 239. *Прилгг.*

мука, полученная изъ такихъ зеренъ, не доставляетъ хорошаго хлѣба, и потому въ Баваріи послѣдовало въ 1805 году запрещеніе касательно жатвы несовершенно зрѣлыхъ хлѣбныхъ распеній.

Если же, не смотря на сказанныя предосторожности, хлѣбныя зерна измѣнились уже болѣзненнымъ образомъ, то оныя могутъ быть только способны для гонки хлѣбнаго вина и другихъ хозяйственныхъ надобностей, но не для приготоовленія муки и хлѣба. Въ случаѣ недоспѣлка и незначительнаго измѣненія хлѣбныхъ зеренъ необходимо нужно искусственнымъ образомъ заглушать и припуглять вредное качество оныхъ. Для сего похваляется провѣтриваніе больныхъ зеренъ, высушиваніе, смѣшеніе съ здоровыми зернами, превращеніе оныхъ въ мельчайшую муку, вспомошествованіе должному окисанію тѣста и надлежащему качеству хлѣба чрезъ хорошія дрожжи и прибавленіе къ тѣсту нѣсколько водки, соли, шмина, аниса, гульбы; нужно также, чтобы хлѣбъ такой былъ доспѣчно и крѣпко выпеченъ и чтобы для сего не давалъ ему большой формы, не сажалъ его въ горячую печь, а только чрезъ зало-

женіе заслонки увеличитъ жаръ подъ конецъ печенія.

Порча хлѣбныхъ зеренъ, причиняемая насѣкомыми, предотвращается шѣмъ, когда оныя не насыпаюцца въ большіе и высокіе ящики, часто перемѣшиваюцца и провѣтриваюцца; для чего надлежитъ отворять двери и всѣ продушины въ хлѣбныхъ анбарахъ.

Хорошее устройство и содержаніе хлѣбныхъ магазиновъ весьма много содѣйствуетъ къ предотвращенію порчи хлѣбныхъ зеренъ. Для сего нужно, чѣобы хлѣбныя магазины построены были на мѣсплахъ возвышенныхъ, сухихъ, открытыхъ съ южной и западной стороны, имѣющихъ свободное печеніе воздуха. Военные магазины полезно соорудить при большихъ дорогахъ, но припомъ удалять ихъ отъ дорожной пыли на 40 или 50 саженей. Кромѣ сего пребуется, чѣобы полъ въ магазинахъ былъ по крайней мѣрѣ двумя футами выше земной поверхности. Полъ изъ еловыхъ или сосновыхъ досокъ лучше, нежели изъ липовеничнаго дерева, или изъ гипса: ибо оба послѣднія вещества хотя и прохлаждають болѣе, за то также болѣе при-

чиняють сыроепи. *Варронъ* *) хотѣлъ, чпобы полъ и спѣны хлѣбныхъ магазиновъ были подщекатурены. Къ хорошему устройству магазиновъ принадлежишь и то, чпобы на каждыхъ двухъ саженьяхъ устройены были продушины, имѣющія 6 дюймовъ ширины, 6 дюймовъ высолы, припомъ равномерную высолу и распояніе опъ полу; продушины сіи пребують спавней или опускныхъ дверейъ, для защищенія магазиновъ опъ жаркаго и влажнаго воздуха. Пространство хорошихъ магазиновъ соразмѣряется количеству хранимаго въ оныхъ хлѣба; для сего пребують, чпобы весь полъ былъ измѣренъ, чпобы на каждой квадрапной сажени не насыпашъ зеренъ выше 3-хъ фуповъ и чпобы новыя молодыя зерна лежали вышиною въ одинъ полько фупъ. *Геккеръ* *) и *Эргартъ* **) совѣпують для хранения хлѣбныхъ зеренъ выспроишь на горизонтальной плоскости круг-

*) Varro de re rustica. Прив. м.

*) A. F. Hecker's vollst. Handb. der Kriegsarzneykunde. Berlin. 1816—17. 1. B. стр. 63.

**) G. v. Ehrhart's Entwurf eines physikalisch-medizinischen Polizey-Gesetzbuches etc. 2. B. Augsburg u. Leipzig. (s. a.) 8. стр. 388.

лыя, или чептырехъугольныя трубы, кошорыя въ верхней своей части должны бытъ выпуклы и снабжены небольшимъ отъверстіемъ для всыпанія зеренъ. Въ нижней части каждой трубы находится небольшая желѣзная дверь, снабженная крѣпкимъ запоромъ и служащая для высыпки попребнаго количества зеренъ. Трубы сіи нужно хорошо устроить, выжечь и обложить досками. Послѣ сего чрезъ верхнее отъверстіе наполняется каждая труба до самаго верха сухими хлѣбными зернами, а самое отъверстіе закрывается круглымъ, плотно приспаяющимъ камнемъ и даже, для воспященія проходу внѣшняго воздуха, замазывается. Всякой разъ попребное количество зеренъ высыпается чрезъ желѣзную дверь, внизу находящуюся, такъ что воздухъ никакъ не можетъ проникнуть во внутренность трубы. Многія таковыя трубы покрываются одною общею кровлею. По свидѣтельству *Варрона* *), хлѣбныя зерна, зарытыя глубоко въ песчаную землю и сверху покрытыя пескомъ, оспались безъ порчи 50 лѣтъ. Извѣстно впрочемъ, что и въ наши времена хлѣбныя зерна сберегаются въ нѣ-

*) Прив. м.

копторыхъ спранахъ чрезъ зарываніе въ землю. Въ Персіи и Аравіи, около Багдада, говорятъ *Нибуръ* *), хлѣбные магазины устроены подѣ поверхностью земли. Чѣмъ же касается до обыкновенныхъ хлѣбныхъ магазиновъ, то полезно было бы не оставлять здѣсь хлѣбныхъ зеренъ долѣе, какъ на чепыре года, и припомъ ежегодно замѣнять половинную часть запаса новыми зернами.

Если же на хлѣбныхъ зернахъ, долго въ кучѣ лежавшихъ, замѣчаются уже знаки червей, то нужно поспѣшь верхній слой зеренъ снять, тщательно провѣтришь, вычистишь мешлою, опыскашь и выбросишь всѣхъ насѣкомыхъ. Но если въ хлѣбномъ магазинѣ загнились уже насѣкомыя, то способъ сей недостаточенъ, и тогда нужно въ теченіи цѣлаго года не складывать хлѣбныхъ зеренъ въ такой анбаръ, а вмѣсто того наполнять оный сѣномъ и соломой. Впрочемъ, проптиву насѣкомыхъ сего рода предложены многіе способы и даже обливаніе хлѣбныхъ зеренъ ѣдкими растворами; но какъ оное найдено весьма вреднымъ, то въ Парижѣ сіе средство запрещено еще въ 1766 году. Други-
 ***) Niebuhr's Reisebeschreibung. II. В. стр. 349.

гіе безвредные способы употребляются и до-
нынѣ. Сюда принадлежишь вкладываніе между
хлѣбными зернами, насыпанными кучею, бу-
зинныхъ цвѣтновъ свѣжихъ или, за неимѣні-
емъ ихъ, сухихъ, покрываніе хлѣбныхъ зе-
ренъ цѣлыми бузинными вѣтвями, изъ листь-
евъ и цвѣтовъ состоящими. Австрійскій
Военный Совѣтъ въ предписаніи своемъ отъ
15-го Февраля 1809. года похваляетъ для
сего употребленіе свѣжескошеннаго весьма
справянистаго сѣна *). Сей же Совѣтъ пред-
лагаетъ поспѣшь по сожатию хлѣбныхъ ра-
спеній отдѣлишь нѣсколько мѣръ свѣжихъ,
невысохшихъ или въ молокъ находящихся
еще хлѣбныхъ зеренъ, а лучше всего пше-
ницы, положить оныя въ анбаръ, гдѣ нахо-
дился хлѣбный червь, и поелику живописное
сіе весьма быспро нападаетъ на паковыя
свѣжія зерна, то чрезъ повпореніе сего опы-
та, два или три раза, можно такимъ обра-
зомъ вмѣстѣ съ сими зернами вынести изъ
анбара и самыхъ червей. Если же, не смо-
тря на всѣ сказанныя мѣры, насѣкомыя раз-
велись уже и хлѣбныя зерна попорчены, то
продажа паковыхъ зеренъ, какъ совершенно
*) Jsfordink. Пр. соч. т. Ч. стр. 243-244. (§ 138).

неспособныхъ для употребленія на хлѣбную муку, не можетъ быть безвредною.

Мѣры противу ядовитыхъ справъ, коихъ сѣмена смѣшиваются нерѣдко съ хлѣбными зернами, супъ тѣже самыя, которыя употребляются противу рожковъ, ржавины и другихъ болѣзней, коимъ подвержены пахашныя распенія во время прозябанія своего въ полѣ (см. спр. 22 - 23).

Дабы хлѣбныя зерна, при молоченіи сноповъ и отдѣленіи зеренъ отъ соломы и мякны, не смѣшивались съ землею, пескомъ и другими посторонними веществами, по для сего пребуется, чптобы гуино или шокъ имѣлъ надлежащую плотность, гладкость и совершенно чистую поверхность; чптобы самое вѣяніе и очищеніе хлѣбныхъ зеренъ производилось съ надлежащею точностію и въ способное для сего время; чптобы наконецъ нехорошо очищенные хлѣбныя зерна, содержащія въ себѣ землю, песокъ, впорично перечищались вѣяніемъ, полченіемъ, просѣиваніемъ, вымываніемъ и пересушиваніемъ.

2. Поелику добраго хлѣбной муки зависитъ не только отъ хорошаго качества хлѣбныхъ зеренъ, но и отъ надлежащаго ея при-

гошповленія, устройства во всѣхъ мѣльничныхъ орудіяхъ, приборахъ и чистопы оныхъ: по не бесполезно посему осматривать почаще мѣльницы, а особливо удословѣряться въ надлежащей крѣпости и положеніи мѣльничныхъ камней. Нѣкоторые весьма благо-разумно совѣщаютъ укрѣплять мѣльничные камни желѣзными обручами. Равнымъ образомъ предопвращеніе порчи и подмѣсей муки иребуесть, чшобы новые мѣльничные камни, или же снова наоспренные сперва упошреблялись для молошья однихъ только опрубей или хлѣбныхъ зеренъ, назначенныхъ на гонку хлѣбнаго вина; чшобы молошье гипса для удобренія полей и проч. не производи-лось въ хлѣбныхъ мѣльницахъ; чшобы мѣль-ники не занимались продажею хлѣбныхъ зе-ренъ и муки, а продавцы муки не продавали бы подмоченной, запхлой, испорченной, под-мѣшанной муки. Въ Провіантскихъ Регу-лахъ *) сказано: „Буде кто изъ подрядчи-ковъ и продавцовъ, кромѣ Шляхешства, оп-

*) О штрафованіи подрядчиковъ, Офицеровъ и магазинъ-вахтеровъ за учиненный въ провіантъ примѣсъ. Провіантскіе Регулъ стр. 145-146. II. 25.

„важится поспавятъ въ магазейны провіантъ
 „съ какимъ нибудь, яко то съ известью, съ
 „пескомъ, дресвою, камнемъ, разбишыми
 „кирпичами и прочимъ тому подобнымъ при-
 „мѣсомъ: изъ оныхъ смѣшенное съ известью
 „и другимъ, опъ чего людямъ вредъ приклю-
 „чень бытъ можесть, не опдавая имъ обра-
 „но, жечь или бросать въ воду; а самыхъ
 „ихъ, ежели по опъ нихъ учинено, кои въ
 „службу годны, писать безъ штрафу въ сол-
 „дашы или профосы, куда кпо способенъ
 „явился, вѣчно“ и проч. Далѣе сказано: „Бу-
 „де же примѣсъ изъ вышеписаннаго такой
 „явился, который вреда людямъ учинишь
 „не можесть, а шокмо вѣсу или мѣры умно-
 „жаесть, чшо разумѣеся смѣшенная ржа-
 „ная мука съ овсяною или ячною, и ячная
 „крупa со ржаною и прочее тому подобное:
 „за оное годныхъ пропивъ вышеписаннаго
 „писать безъ наказанія въ службу на чѣтыре
 „года“ и проч. О Шляхетствѣ сказано: „А для
 „учиненія имъ штрафа, ежели опъ самихъ
 „шо послѣдуетъ, чему по гражданскимъ пра-
 „вамъ подлежатъ будутъ, кого, куда надле-
 „житъ, опсылать.“—Впрочемъ, какъ хлѣбъ,
 пригошовленный изъ равныхъ частей ржаной



и пшеничной муки, имѣеть всѣ потребныя качества: по, при недостаткѣ въ ржаной мукѣ и при избыткѣ пшеничной, таковое смѣшеніе и утверждено въ Россіи Высочайшимъ Указомъ касательно продовольствія войскъ *).

Дабы мука не была подмочена, не сдѣлалась заплѣлою, пропухлою и совершенно испорченною, по, кромѣ надзора за надлежащимъ молопьемъ оной, нужно прежде всего, чптобы свѣже-смолопая мука не была нарочно окропляема водою въ мѣльницахъ для умноженія ея вѣса и чптобы свѣжая сія мука не менѣе 6-8 дней содержима была въ прохладномъ и сухомъ мѣстѣ, ежедневно перемѣшивалась и тогда только высыпается въ назначенныя мѣшки, бочки, ящики, когда она совершенно проспыла и подсохла. Посему въ Про-

*) Указъ 1811 Октября. О добротѣ муки по ея вкусу и чптобы пашь, гдѣ недостаточно на продовольствіе войскъ ржаной муки и гдѣ можно довольно находить муки пшеничной, печь хлѣбы для войскъ изъ половины ржаной и половины пшеничной муки.

віантскихъ Регулахъ *) сказано: „Но при-
 „шомъ сверхъ того въ полевыхъ укрѣпле-
 „ніяхъ, гдѣ построенныхъ магазейновъ не
 „случится, наиприлѣжнѣйше наблюдать,
 „чтобъ оный провіантъ на землѣ кладенъ
 „не былъ, и чрезъ то опъ сырости и мо-
 „кропы снизу лежащіе кули поврежденія не
 „имѣли и провіанту праты не было, но спа-
 „рались на подкладинахъ досками или брев-
 „нами намостить. Ежели же досокъ и бревенъ
 „не случится и въ близости достать бу-
 „дешъ не возможно: то по необходимой
 „нуждѣ шѣ мѣста возвышавъ хопя уже и
 „дерномъ и настилавъ камышемъ и хворо-
 „спомъ, а сверхъ, сколько возможно, накрыва-
 „въ рогожами, опъ опорожненныхъ кулей
 „остающимися; а чптобы вода наилучше спе-
 „кавъ могла, то складывавъ оный на подо-
 „біе пирамидъ.“ Равнымъ образомъ назначен-
 ные для храненія муки сараи и магазины
 тогда только соотвѣтствуютъ своей цѣ-
 ли, когда они совершенно сухи, защищены
 опъ вліянія погоды и возвышены надъ по-

*) О оставленіи изъ походнаго магазейна при
 хрѣпостяхъ и полевыхъ укрѣпленіяхъ прові-
 анта. Пров. Рег. Гл. X. П. 17. стр. 291-292.

верхностію земли по крайней мѣрѣ на одинъ футъ. Подъ поломъ сихъ спроеній, всегда досчатымъ, *Исфординкѣ* *) не совѣщуетъ оставлять пустаго мѣста, а напротивъ того дѣласть довольно высокія деревянныя перекладины, набишныя хорошо сполченнымъ сухимъ мусоромъ. Въ Провіантскихъ Регулахъ **) значится слѣдующее: „Принимаемое въ ма-
„газейны: муку, крупу и овесь складывать
„въ снопы такимъ образомъ, чѣмъ въ ши-
„рину не болѣе двухъ кулей было, а въ дли-
„ну и вышину, сколько возможно, имѣя ме-
„жду снопами проспаннаго мѣста, дабы
„человѣку пройди и куль пронести безъ
„ушѣсненія можно было; и для того въ шѣхъ
„магазинныхъ анбарахъ ставили линіями спол-
„бы, между которыми утверждать полстныя
„доски въ нѣсколько ярусовъ до самаго верьху,
„на которыхъ кули съ провіантомъ класъ
„надлежитъ, дабы при смѣнѣ всегда пробо-
„вать и годность провіанта, не разбивая оныхъ
„снопъ, видѣть можно было.“ Поелику въ

*) Пр. соч. 1. Ч. стр. 255. (§ 141).

**) Какимъ образомъ въ магазинны провіантъ и овесь складывать. Пров. Рег. Гл. VI. Ц. 1, стр. 164.

бочкахъ мука долѣе сохраняется *), то полезно употреблять ихъ для складки муки въ магазинахъ, равно также для пересылки ея въ отдаленныя мѣста. Для отвращенія порчи муки въ бочкахъ необходимо нужно насыпать въ оныя плотно и крѣпко совершенно сухую муку. Бочки, наполненныя крѣпко такою мукою и положенныя на деревянныхъ перекладинахъ въ при ряда, одна на другой, въ закрытыхъ и воздухопроходныхъ мѣстахъ, сохраняютъ муку отъ порчи до 20-ти лѣтъ **). Дабы удостовѣриться въ томъ, не испортилась ли мука, хранимая въ бочкахъ, нужно каждую четверть года, а въ Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ мѣсяцахъ ежемесячно пробуравливать бочки полымъ мучнымъ буравомъ, осматривать муку и, что всего вѣрнѣе, печь изъ такой муки нѣсколько хлѣбовъ для пробы. Въ Провіантскихъ Регулахъ значится такъ ***): „Магазейнъ - „Оберъ-Офицеры и вахтеры наипаче должны „того смотрѣть, чѣмъ провіантъ складыванъ былъ погодно по сортамъ, дабы изъ

*) Jsfordink. Пр. соч. I. Ч. стр. 256. (§ 142).

**) Тамъ же.

***) О складываніи провіанта въ стопы погодно.

Пр. Рег. Гл. VI. П. 4. стр. 168.

„шого, который давно принятъ, а прочій,
 „хоть и вновь принятый, но къ долговре-
 „менному лежанію непрочный, прежде дру-
 „гаго въ расходъ упошреблять безъ помѣ-
 „шательства и препятствія возможно бы-
 „ло, чего и при пересылкахъ накрѣпко смо-
 „трьшь, дабы прежнихъ приемовъ и къ ле-
 „жанію непрочный ближе кладень былъ; а
 „чтобъ Генераль-Провіантмейстеру-Лейпе-
 „нанпу, или кто для свидѣтельства, какъ
 „скоро въ анбары вступятъ, видно было,
 „сколькихъ годовъ и копорыхъ именно въ
 „оныхъ приемъ соспоить и въ коемъ мѣспѣ
 „оный (провіантъ) положень, имѣть на спѣ-
 „нахъ или, гдѣ пристойно, на бумажкахъ
 „надписи, дабы пошому могли оному поп-
 „часъ, ежели надобно будетъ, годень ли оный
 „въ дачу и опъ чего иногда поврежденъ, не-
 „медленно свидѣтельство учинить.“

Если же лежалая мука чрезъ предшедшее броженіе потеряла болѣе, нежели половину пылашельнаго своего вещества, то она не- способна уже къ упошребленію и къ поправ- ленію. Таковую муку слѣдуетъ назначать шолько на гонку вина или другія подобныя надобности. Поправленіе подмоченной муки

прибавленіемъ одного лоша пошаша къ 20-ши фунтамъ пѣста, какъ нѣкоторые совѣшуютъ, не совсѣмъ безвредно. Напротивъ того легчайшая степень затхлости въ мукѣ можетъ быть уничтожена чрезъ высушивание, пончайшее молошье, — словомъ, чрезъ всѣ пѣ средства, коими поправляется и уничтожается болѣзненное измѣненіе хлѣбныхъ зеренъ (см. стр. 27). *Оберлехнеръ* *) совѣшуетъ для сего дѣлать опшваръ изъ молока и льняныхъ сѣмянъ, съ примѣсю муки изъ незрѣлыхъ пшеничныхъ зеренъ. Соспавленное изъ такой смѣси пѣсто, послѣ умѣренного сушенія, разламывается въ кусочки, еще разъ мѣлется и прибавляется къ проухлой мукѣ. Въ Провіантскихъ Регулахъ **) посему сказано: „Ежели случится такой „(провіантъ), который слежился, опсырѣлъ, етъ, или по какимъ обстоятельствомъ сырой принятъ будетъ, или же опъ воды и „прочаго поврежденіе претерпитъ: то для

*) Wie kann man sich bei grosser Theuerung und Hungersnoth ohne Getreide gesundes Brodt verschaffen? v. D. Oberlechner. Salzburg. 1816.

**) О чиненіи провіанту перевалки и перебивки, Пров. Рег. стр. 166-167. II. 3.

„убѣжанія казеннаго убытка слѣжавшіеся и
 „подмоклые кули перебивать, когда того на-
 „добность требовать будетъ и годный опъ
 „негоднаго опдѣлять.“ Далѣе говорится: „а
 „негодный провіантъ, сколько съ подлиннаго
 „свидѣтельства и аппробаціи его Генераль-
 „Провіантмейстера-Лейтенанта, или кому
 „по поручено будетъ, на что купцы сы-
 „щущая, съ публичнаго торгу продавая, а
 „совсѣмъ уже къ употребленію и скопу не-
 „годный изъ приходу выключать; шокмо въ
 „помъ выключеніи не весьма спѣшишь и
 „оное не прежде чинишь, покуда явнымъ сви-
 „дѣтельствомъ доказано будетъ, что тотъ
 „провіантъ въ негодность пришелъ подлинно
 „опъ непреодолимыхъ приключеній, а не опъ
 „оплошности и несмотрѣнія и проч.“

Касательно отвращенія порчи муки, при-
 чиняемой червями, служатъ всѣ вышеозна-
 ченныя мѣры пропиву подмоченной, заплѣ-
 лой, заплхлой муки. Для умерщвленія сихъ
 червей въ новѣйшія времена предложено раз-
 спилашь вокругъ муки вѣтви дикаго роз-
 марина или багуна (*ledum palustre*. L.), пе-
 ремѣняемая всякій разъ, когда потеряють
 уже запахъ. Можно бы также, говорить

Исфординкѣ *), опваромъ сей правы вымывають мучныя камеры. Дабы сберечь опть червей муку, хранимую въ мѣшкахъ, совѣшуютъ приносишь въ мучныя анбары лѣсныхъ муравьевъ, копорые мукѣ не вредяють, а другихъ насѣкомыхъ испребляють. *Галисѣ* **) увѣряеть, что самое лучшее средство для оптварщенія всякаго рода насѣкомыхъ опть мучныхъ магазиновъ состоишь въ окуриваніи мѣшковъ мучныхъ сѣрою, опть чего мука не дѣлаеться вредною. Тоже самое полезно дѣлать, говоришь *Исфординкѣ* ***), съ бочками, наполненными мукою и съ мучными камерами. Обыкновеніе рассыпать въ мучныхъ магазинахъ ядовитыя вещества съ пѣмъ, чтобы оными опправлять крысъ и мышей, весьма вредно и непозволишельно.

3) Печеніе хлѣба и употребленіе испеченнаго уже хлѣба, соопвѣстствующее своей цѣли, предполагаетъ необходимость надзора надъ пекарями, мукою, водою, пѣспомъ, посудою, печами и надъ самымъ испеченнымъ уже хлѣбомъ. Пекари обязаны соблюдать

*) Пр. соч. I. Ч. стр. 258. (§ 142).

**) Пр. мѣст.

***) Пр. м.

всевозможную чистоту и опрятность въ мучныхъ камерахъ, пекарняхъ, печахъ, и муку для сего хранишь въ мѣспѣ, удаленномъ отъ пыли и нечистоты; если же мука взята изъ бочекъ, то нужно оную предварительно располочь и просѣять. Весьма важно при печеніи хлѣбовъ надлежащее пространство пекарни; если она будеть мала и служить для кого либо спальнею, то столь удобная здѣсь порча воздуха повредитъ тѣсту и умножитъ теплоту. Что муку, назначенную для печенія хлѣбовъ, нужно хранишь какъ можно ближе къ пекарнѣ, дабы при переносѣ оной въ пекарню въ открытомъ сосудѣ не примѣшивались постороннія вещества, что вообще мука сія должна имѣть всѣ потребныя качества, то сіе само собою явствуетъ, равно какъ и то, что для приготовления тѣста пребудетъ вода чистая, мягкая, нехолодная и негорячая. Мука, мѣсимая съ дождевою водою, какъ увѣряютъ *), даетъ пылюю частію хлѣба болѣе, нежели мѣсимая съ колодезною водою. Кроме сего нужно наблюдать, дабы при дѣланіи тѣста

*) Oeconomische Heften. 1800. Junius. s. 571.

Magaz. aller neuen Erfindungen. N 2. стр. 109.

не употреблялись вредныя, броженію способствующія вещества, дабы также кислое шѣсто или закваска не хранилась долѣе 8-ми часовъ и не содержалась въ мепаллической посудѣ. Тоже разумѣется касательно храненія дрожжей; причемъ пакъ называемыя впулочные дрожжи всегда лучше подонныхъ. Французское Медико-Полицейское Правленіе въ xvii столѣтіи вело жаркій споръ касательно употребленія дрожжей *). Время и способъ при-
бавленія кислаго шѣста располагается по добротѣ муки. *Вильдбергъ* **) говоритъ: ничто столько не поправляетъ муки изъ худой ржи, какъ если для закваски опредѣленная мука и взятое для сего кислое шѣсто раздѣляется, и прежде одна половина, а чрезъ нѣсколько часовъ и другая заквасится и смѣшается съ первою, начавшею уже окисанъ. Когда на другой день поупру мѣсится шѣсто, то не нужно прибавлять къ оному ни холодной,

*) Des Essarts Dictionnaire universel de Police. T. I. стр. 359. J. Ch. F. Scherf's Beyträge z. Archiv d. Med. Poliz. 4. B. 2-te Samml. S. 71.

**) System der medizinischen Gesetzgebung v. C. F. L. Wildberg. 2-te Ausg. Berlin. 1820. стр. 63. § 125.

ни теплой воды. Если хлѣбъ готовится изъ муки не такъ хорошей, то полезно продолжать заквашиваніе цѣлыми сушками долѣе обыкновеннаго.

Печи, имѣющія каменную поспилку или помостъ, не соотвѣтствуютъ своей цѣли, потому что шаковыя печи принимаютъ въ себя много жару и долго оный удерживаютъ, отъ чего хлѣбъ можетъ весьма легко пригорѣть на нижней своей поверхности, между тѣмъ какъ верхъ хлѣба не допекается и не получаетъ надлежащаго цвѣта. Посему глиняная поспилка всегда предпочитается; посему также обыкновеніе предъ печеніемъ хлѣбовъ удерживать печной жаръ чрезъ раскаленные уголья весьма вредно. Ежели хлѣбныя печи новы, то предъ употребленіемъ необходимо нужно нѣсколько разъ выпопить ихъ и совершенно высушить, употребляя для сего не хворостъ или обломки отъ старыхъ конюшенъ и клѣвовъ, но гладкія, хорошо высохшія, новыя дрова; при этомъ въ самомъ топленіи нужно наблюдать надлежащую мѣру. *Малень **) приводитъ примѣръ, гдѣ топленіе печи старыми, зеленою крас-

*) Р. Frank. Пр. соч. стр. 260. (§ 25).

кою окрашенными дровами сообщило хлѣбу лдовипое свойство мѣдной яри. Споль же вредно и предосудительно сушеніе въ хлѣбныхъ печахъ волосъ человѣческихъ и постелей больныхъ. Касательно печнаго жара, сколько чрезмѣрная теплоота благопріиспвуесть пригорѣлости хлѣба, сполько же недостапчая теплоота препяпспвуесть выпеченію онаго, пакъ что въ семъ послѣднемъ случаѣ тѣспо теряесть свою воду и подсыхаесть, но нимало не выпекаесться, особливо на нижней поверхности. Тѣспо, изъ хорошей муки пригоповленное, пребуесть умѣренной степени печнаго жара; для тѣспа пропивоппложнаго качества поппребна бѳльшая степень онаго. Дабы увѣрипсья въ помъ, что печь имѣесть надлежащую степеппь жара, нужно, по совѣппу *Эргарта* *), взяпть щепопку муки и поппжипть оную на край помоспа или поспилки печной; если мука сія поппчасъ сдѣлаесться бурою, то печь имѣесть надлежащую степеппь теплоты; если же мука поппчасъ почернѣесть, или же напропивъ удерживаесть бѣлый цвѣтъ: то въ первомъ случаѣ печной жаръ весьма великъ, а въ по-

*) Пр. соч. 3. Ч. стр. 192.

слѣднемъ недоспапochenъ. При печеніи хлѣбовъ, каждый изъ нихъ пребуесть доспапочнаго для себя мѣспа въ печи; иначе получится недопеченный хлѣбъ. Равнымъ образомъ намазываніе пирожныхъ и вообще кондиторскихъ хлѣбовъ предъ печеніемъ оныхъ красящими веществами пребуесть, чпобы для сего употреблялись одни только распишелные, припомъ безвредные соки.

Для ускоренія печенія хлѣба въ походахъ *Эргартъ* *) совѣпуесть даватъ оному продолговашую фигуру, копторая однакожь неудобна для укладки хлѣба въ повозки и сумки; припомъ форма сія погда только полезна, когда хлѣбъ скоро съѣдается: ибо иначе онъ скоро засыхаетъ; самое даже дѣланіе продолговатыхъ хлѣбовъ пребуесть болѣе времени.

Свѣже - испеченный хлѣбъ неспособенъ въ топъ же день къ употребленію и прежде испеченія первыхъ супокъ послѣ печенія надлежитъ остерегаться класть одинъ хлѣбъ на другой, дабы не мѣшашъ остыванію онаго. Для помѣщенія свѣже - испеченнаго хлѣба нужно избирать особыя камеры, удаленныя

*) Пр. соч. 2. Ч. стр. 389.

отъ пекарни и расположенныя всегда въ нижнемъ этажѣ, пошому что свѣже - испеченный хлѣбъ, въ верхнемъ этажѣ положенный, лѣтомъ очень скоро сохнеетъ, а зимою замерзаетъ. Камеры сіи пребываютъ многихъ продушинъ, или же противуположныхъ оконъ, либо пуспаго подъ поломъ мѣста, дабы хлѣбъ лѣтомъ скорѣе просыхалъ. Весьма вредно свѣже-испеченный хлѣбъ класъ на землю или на солому, лежащую на землѣ: ибо пары земляныя удобнѣе проникаютъ въ теплый еще хлѣбъ и зараждаютъ въ немъ плесень. Посему, ежели избираются для сихъ хлѣбовъ овины, нужно класъ хлѣбъ на доски, возвышенныя отъ земли по крайней мѣрѣ на полфута. По сей же причинѣ весьма обыкновенное между пекарями запираніе свѣжаго хлѣба въ шкапы, поставленные у сырыхъ стѣнъ и въ влажномъ мѣстѣ, не можетъ быть безвредно. Въ деревняхъ всего бы лучше было, говорить славный П. Франкъ *), запретишь продажу хлѣба по домамъ и назначишь общественнаго хлѣбника, обязаннаго продавать по сходной цѣнѣ хлѣбы: ибо симъ легче можно бы соблюсти правила безвреднаго пече-

*) Пр. соч. Ч. 3. стр. 251 - 255. (§ 21).

нія хлѣба. Сіе распоряженіе существуетъ уже въ нѣкоторыхъ странахъ, на прим: въ Тирингенѣ.

Перевозъ хлѣба, особливо въ жаркіе лѣтніе дни, производится всего лучше при вечерней прохладѣ, исключая развѣ небольшое разстояніе. Главнѣйшая въ семъ случаѣ оспорожность состоить въ томъ, чѣмъ, чтобы чрезъ худое уложеніе хлѣба въ повозки оный не раздавливался, а чрезъ худое покрываніе не измѣнялся во время дождя и чѣмъ для перевоза хлѣба въ арміяхъ не употреблялись повозки, служація для перевозки больныхъ, мяса, сала и проч. Въ Баваріи *), по случаю перевозки хлѣба на повозкахъ, служащихъ для транспорта больныхъ, произошелъ значительный вредъ, шѣмъ болѣе, что повозки сіи всегда были закрыты и не провѣтривались. Касательно возвращенія въ магазейны опорожненныхъ кулей, сказано въ Провіантскихъ Регулахъ **) слѣдующее: „и для того въ „полкахъ и ротахъ накрѣпко наблюдать, что- „бы полковые служители оныхъ (кулей) ни „куда, а паче для покрыванія лошадей, оп-

*) Anleitung zum Gebrauche der Vorbeugungsmittel gegen ansteckende Krankheiten. München. 1815. стр. 29.

**) Пр. Рег. гл. VII. П. 26. стр. 233.

„нюдь не употребляли и годныхъ негоднымъ
„не перемѣняли.“

Для отвращенія вреда, причиняемаго хлѣбамъ лежалымъ, кислымъ, заплеснѣвшимъ, твердымъ, мокрымъ, пребудетъ конечно замѣнъ онаго здоровымъ хлѣбомъ; но въ случаѣ недоспапка и при незначительной порчѣ хлѣба предложены способы къ поправленію онаго. Кислопа у хлѣба опнимается размачиваніемъ кусковъ его въ водѣ и поджариваніемъ; плесневое мѣсто въ хлѣбѣ вырѣзывается; твердый хлѣбъ снова подогрѣвается, отъ чего внутренность его смягчается; поверхность мокрого хлѣба срезывается, а остальное подогрѣвается.

Если, при спеченіи особенныхъ обстоятельствъ, предложенныя доселѣ мѣры недоспапчны для предотвращенія порчи готоваго уже хлѣба, какъ то бываетъ на корабляхъ, особливо если пребудетъ, чтобы хлѣбная поклажа не обременяла солдата при большихъ переходахъ или во время военныхъ дѣйствій: то съ древнихъ уже временъ введено въ употребленіе превращать его въ *сухари*. Подобно сушенію мяса, приготовленіе и храненіе сухарей пребудетъ особеннаго

*

вниманія, безъ чего оныя скоро плеснѣють, дѣлаются влажными, гнилыми, или же раздѣдаются червями. Особливо важно при семъ надлежащее качество и количество хлѣбнаго шѣста, умѣренная величина сухарнаго куска и искусное направленіе печнаго жара. Если на хлѣбѣ, подверженномъ сушенію, образуется крѣпкая корка, прежде нежели внапуренная влага испарилась: то оставшійся внутри сухарей мякишъ всасываетъ въ себя внѣшнюю влагу и подвергается броженію, чрезъ что сухари весьма скоро порчутся, и особливо приманиваютъ къ себѣ насѣкомыхъ. Надлежащее обсыхиваніе свѣже-приготовленныхъ сухарей, провѣриваніе и храненіе оныхъ въ сухомъ мѣстѣ, суть также необходимыя условія долговременной цѣлости ихъ. Въ Провіантскихъ Регулахъ *) поему сказано: „и „по заготовленіи принимаютъ изъ одной чеп- „пверпи муки сухарей по двенадцати чеп- „вериковъ, въ нихъ во всѣхъ вѣсу по пяти „пудъ, по десяти фунтовъ; токмо припомъ „накрѣпко смотрѣть, чтобъ были негорѣ- „лые, негнилые, съ ячною и овсяною мукою „и другимъ хлѣбомъ несмѣшанные, квашенные

*) О заготовленіи сухарей. Пр. Рег. Гл. VI. П. 6.

„добрымъ квасомъ; а недосушенныхъ и сырыхъ, также и мякинныхъ и изъ опрубей, дѣланныхъ опнюдь не принимаешь, и тѣ сухари, высыпая изъ кулей, осматриваешь, чпобъ въ нихъ отъ печей сухой комьями глины и кирпичныхъ обломковъ и песку не было.“ На корабляхъ *Эргартъ* *) совѣдуетъ хранишь сухари въ ящикахъ, обложенныхъ внутри тонкими оловянными листами. Столь славные въ прежнее время Венеціанскіе сухари, особенно мореплавателями уважаемые, найдены въ 1798 году нимаго неиспорченными, не смотря на то, что лежали цѣлые сто лѣтъ. Какъ приготовленіе сихъ сухарей составляло секретъ, то Австрійскій Военный Департаментъ **) спарался опыскашь оставшихся еще въ живыхъ присяжныхъ Венеціанскихъ хлѣбниковъ, приготовлявшихъ тайнымъ образомъ, по приказанію своего Начальства, сіи сухари. Чрезъ сіе извѣстно стало, что для приготовленія Венеціанскихъ сухарей берется пшеничная мука; тѣспо обрабатывается также, какъ и для хлѣба, но мѣсится довольно сухо. Особенное присемь

*) Пр. соч. 2. Ч. стр. 442.

**) Isfordink, Пр. соч. 1. Ч. стр. 285 - 286.

есть то, что при молощѣ изъ 100 фунтовъ пшеницы опходишь 20 фунтовъ опрубей и что на 100 фунтовъ такъ очищенной муки берется при дѣланіи шѣста одинъ фунтъ соли и 33 фунта воды. Обработанное такимъ образомъ шѣсто сперва взвѣшивается по часпямъ, потомъ превращается въ круглые валики и раздѣляется на четыре равныхъ кома. Обработавъ отдѣльно сіи четыре часпи, должно оныя потомъ соединить вмѣстѣ и положить на хлѣбныя доски для надлежащаго выброженія. Послѣ сего сажая ихъ въ печь и при щадательномъ направленіи жара пекутъ также, какъ и хлѣбъ. Вынутая изъ печи и охлажденная масса разламывается на четыре часпи, сажается снова въ печь, непопленную однако въпорично, и сушится до того, что корка сдѣлается желтубурою и всѣ влажныя часпи испарятся изъ сухаря.

Вентурины *) предлагаетъ слѣдующій способъ приготоовленія сухарей: нужно замѣсить вмѣстѣ 3 фунта муки, 30 яицъ, 1 фунтъ масла, 2 лота перцу и 5 лотовъ соли. Смѣсь сію надлежитъ потомъ раскатать довольно тонко

*) *Venturini's Lehrbuch der Kriegskunst.* I. T. § 31, Jsfordink. Пр. соч. стр. 287 - 288.

и разрѣзать въ малые куски. Для отвращенія слипанія куски завертываются въ холстину, обсыпанную мукою. Потомъ раскладываются сіе пѣсто на доску и кладутъ въ умеренно-наполенную печь для сушенія. Очевидно, что такое приготовленіе сухарей было бы очень дорого и для армейскаго употребленія весьма неудобно; впрочемъ, если солдаты не могутъ имѣть мяса и зелени, то можно рекомендовать сію сухарную смѣсь.

Основываясь на сдѣланномъ Г-мъ *Рулифордомъ* замѣчаніи, что ячменная мука пшпашельнѣе всѣхъ прочихъ, нѣкоторыя совѣтуютъ употреблять сію муку для дѣланія сухарей. Для сего произвольное количество пересѣянной ячменной муки всыпается въ мѣшокъ и кладется въ кошелъ, на днѣ, коего находится солома, съ пѣмъ, чтобы прибавляемая потомъ вода подходила и подъ нижнюю часть мѣшка и защищала оный отъ загорѣнія. Мѣшокъ кладется въ кошелъ и наливается пѣлой воды столько, чтобы она спояла на 2 дюйма выше мѣшка; потомъ на мѣшокъ кладется доска, а на доску камень. Воду варить должно 8 часовъ и вмѣсто испарившейся приливать снова. Послѣ сего мѣшокъ вынимается

изъ копла, жидкость опдѣляется и топчась употребляется, а твердая часть высушивается на доскѣ, приводится въ тонкій порошокъ и печется въ видѣ малыхъ лепешекъ, копорыя, какъ увѣряють, 20 лѣтъ остаются безъ порчи и, бывъ размочены въ водѣ, всегда имѣють питательную силу. Хотя же химически доказанъ избытокъ питательнаго вещества въ ячменѣ, но по опыту извѣстно, что сія пища весьма скудна и малопитательна, для рабочаго особливо класса людей.

Дабы сухари, надлежащимъ образомъ приготовленные, удерживали всегда, въ морскихъ путешествіяхъ и при другихъ обстоятельствевахъ, хорошее качество, нужно, кромѣ всего вышесказаннаго, кромѣ удаленія мокроты и сырости, часто оныя осматривать, особливо въ началѣ весны. Совершенно испорченные сухари конечно вредны и неспособны для употребленія; но незначительная порча оныхъ можетъ быть исправлена. Такъ подмоченные сухари чистятся щеткою и, когда ржаной хлѣбъ вынуть изъ печи, кладущся въ оную въ такомъ количествѣ, какое можетъ помѣститься въ печи. Однако

вычищенные и высушенные сухари сіи не могутъ уже долго оспаваться безъ порчи, а потому нужно поспчасъ употреблять оные. Сухари лежалые и мало только попорченные червями (*Апобіиш ранісеум*) поправляются тѣмъ, когда надъ парами кипячей воды размягчаютъ ихъ и снова пекутъ.

Наконецъ въ тѣхъ печальныхъ случаяхъ, когда и свѣжій и высушенный хлѣбъ совершенно испорченъ, а недоспалокъ въ здоровомъ хлѣбѣ сдѣлался уже весьма ощупительнымъ, предложено дѣлать хлѣбъ изъ веществъ, питательностію своею подходящихъ къ настоящему хлѣбу. Можно для сего употреблять ячмень, — сію древнѣйшую пищу *), пшеницу, гречиху, овесъ, а въ случаѣ нужды шелушные плоды, картофель, даже вещества, впрочемъ непричисляемые къ питательнымъ для человѣка **). Такъ предложено въ случаѣ

*) Плиній говоритъ (*Hist. natur. Lib. XVIII*), что самые древніе народы приготавливали хлѣбъ изъ ячменя.

**) Питательность хлѣба зависитъ особенно отъ выбора муки. Пшеничная мука, имѣя въ себѣ много сахарнаго вещества, удобоварима; однакожъ претъя часть пшеничныхъ

недостатка употреблять для печенія хлѣба корень волчьяго боба *) (*Butumus umbellatus*). Въ Швеціи готовятъ хлѣбъ изъ торфянаго мха **) (*Sphagnum palustre*) и говорятъ, что онъ бѣлъ и столь же хорошъ, какъ

зеренъ состоитъ изъ непитабельныхъ веществъ; припомъ пшеничный хлѣбъ скоро засыхаетъ. Съ другой стороны ржаной хлѣбъ въ жаркое время года и въ жаркихъ странахъ труднѣе переваривается, склоненъ къ окисанію и причиняетъ непривыкшимъ къ оному, или слабожелудочнымъ, боль и жженіе въ желудкѣ, или поносъ. Напротивъ того пшеничный хлѣбъ въ холодныхъ странахъ менѣе пится и менѣе созрѣваетъ. По сей причинѣ въ холодныхъ странахъ и въ классѣ рабочихъ людей употребляется при всѣхъ равныхъ обстоятельствахъ болѣе ржаной хлѣбъ. *Саллюстій* почитаетъ причиною ослабленія Римскихъ воиновъ по, что они продавали хлѣбныя зерна, получаемыя ими въ видѣ провіанта и покупали нѣжный бѣлый хлѣбъ. „(*Frumentum publice datum vendere, panem in dies mercari.*“ *C. C. Sallustii Opera*, ed. Glascoviæ. 1817. *Bellum Jugurthinum*. Cap. XLIV. стр. 124).

*) *Med. Chir. Zeitung*. 1804. ч. III. стр. 191.

**) *Annales de Chimie*. T. 50. стр. 318.

ржаный хлѣбъ. Въ Австріи, 1772 года, по недоспапкѣ хлѣба позволено было мѣшать одну часпъ муки изъ жолудей съ преме часпями хлѣбной муки *). *Пармантье* **) училъ дѣлать хлѣбъ изъ карпофелю, *Решъ* и *Гизеке* ***) изъ брюквы, *Оберлехнеръ* ****) изъ многихъ корней и корокъ древесныхъ. Другіе совѣщовали *****) дѣлать хлѣбъ изъ цвѣсныхъ почекъ бѣлой и красной дяплины или прилиспника, изъ дикихъ кашпановъ, жолудей, проса, изъ сѣменъ щавеля, изъ муки горца (*Polygonum bistorta*), желтаго афоділя, (*Asphodelus luteus*), черники (*Vaccinium myrtillus*), корня кокушкиныхъ слезъ (*Orchis*), тыквы (*Cucurbita*), Исландскаго мха и проч. Касательно замѣны провіанта, въ образова-

*) John's Lexicon der K. K. Med. Gesetz. Ч. I. стр. 265.

**) Wildberg. с. 1. стр. 54. (§§ 105 - 106)
Примѣт.

***) Reichsanzeiger. 1806. N 149. стр. 1757.

****) Hartleben's allgem. Just. u. Poliz. Fama. 1807. N 36. стр. 281.

*****) Hermbstaedt's Bulletin etc. Ч. III. Heft 2. стр. 127.

ии *) Полеваго Провіантскаго Управленія
Гл. III. Отд. 4. §§ 88, 89 и 90 сказа-
но слѣдующее: „въ недоспаккѣ хлѣба до-
„полняется оный прибавкою мяса, полагая
„за каждый фунтъ хлѣба четверть фунта
„мяса. Въ недоспаккѣ гречневыхъ, овся-
„ныхъ, просяныхъ и полбенныхъ крупъ по-
„лучаютъ войска рисъ или срачинское пшено,
„по мѣрѣ, для крупы опредѣленной, или го-
„рохъ, бобы и чечевицу, вдвое прошивъ крупъ.
„Крупа можетъ быть замѣняема картофе-
„лемъ, рѣпою и другими огородными овоща-
„ми, въ надлежащей соразмѣрности.

(Продолженіе въ слѣдующемъ N)

*) Руководство для скорѣйшаго соображенія, ис-
численія и повѣрокъ по продовольствію войскъ.
Изданное П. Филимоновымъ. Санктпетербургъ.
1819. 4. стр. 90 - 92.

О ЛѢЧЕНІИ СТРАВЛЕННЫХЪ.

Сочиненіе Докт. Медич. Ст. Хотовицкаго.

Самоскорѣйшее удаленіе яда изъ тѣла оп-
равленной особы, съ другой стороны уни-
чтоженіе или припупленіе яда, оставшаго-
ся внутри тѣла, наконецъ прекращеніе по-
слѣдствій оправленія,—сіе прякое показаніе
есть цѣль и сущность многоразличныхъ, едва
небезчисленныхъ, способовъ подаванія помо-
щи оправленнымъ.

I. *Удаленіе яда изъ тѣла отравленной
особы.* Опъ благовременнаго выполненія сего
показанія зависить большею частію спасе-
ніе жизни оправленнаго. Чѣмъ скорѣе послѣ
поглощенія яда извергается оный изъ тѣла,
чѣмъ менѣе слѣдственно успѣлъ онъ обнару-
жить убійственную свою силу, тѣмъ скорѣе

и вѣрнѣе наступаетъ выздоровленіе. Посему совершенное изверженіе всего проглоченнаго яда, слѣдующее непосредственно, такъ сказать, за самымъ проглотченіемъ онаго, само по себѣ, безъ всякихъ дальнѣйшихъ пособій, возвращаетъ оправленному жизнь и здоровье, если только не препятствуетъ сему необычайно пронизательное качество проглоченнаго яда. Посему выполненіе впораго и претвяго показаній въ такомъ случаѣ совершенно не нужно. Посему наконецъ тамъ, гдѣ изверженіе яда не возможно, самое тщательное выполненіе обоихъ послѣднихъ показаній, особливо при значительныхъ оправленіяхъ, не подастъ, большею частію, никакой надежды на выздоровленіе оправленнаго.

Изверженіе проглоченнаго яда, какъ простѣйшее и коренное лѣченіе (*cura radicalis*), совершается различными способами, между коими изверженіе чрезъ рвоту занимаетъ и должно занимать первое мѣсто, потому что сему способу научаетъ насъ сама природа. Сіе благотворное усиліе природы (*vomitus salutaris*) оказывается особливо при оправленіи острыми ядами (*venena acris, inflammantia, fixa*). Къ рвотѣ скоро присоединяется

сильная жажда,—другое столь же благодѣтельное усиліе природы, которое, побуждая оправленного почти къ непрерывному пипію, продолжающемуся даже до переполненія желудка, способствуетъ большому разжиженію яда и посему удобнѣйшему изверженію его чрезъ рвоу.

И такъ произвольная рвоа и склонность къ пипію,—сіи первѣйшія естественныя средства противъ оправленія, должны быть со стороны Искусства поддерживаемы иначе, какъ чрезъ подражаніе натурѣ,—чрезъ одно только искусственное переполненіе желудка подаваніемъ оправленному значительнаго количества тепловатыхъ водянистыхъ и слизистыхъ жидкостей, тепловатаго маслястаго пипія, именно, воды съ масломъ, теплаго молока, а при недостаткѣ оныхъ теплой воды. Химическія средства (*tartarus emeticus*, *vitriolum album* etc.) были бы здѣсь, по причинѣ предстоящаго воспаленія, очевидно вредны, не говоря уже о томъ, что спасительная произвольная рвоа дѣлаешь ихъ совершенно излишними. Даже при недостаткѣ естественной рвоы послѣ оправленія оспрыми ядами, что рѣдко бываетъ при сихъ

ядахъ, рвошный корень (rad. Iresacuahnae) всегда предпочитается рвошному камню и бѣлому купоросу, и будучи употребленъ отъ одной до двухъ драхмъ, производитъ безопасно и вѣрно искусственную рвоту.

Есть однакожъ классъ ядовъ, значительно препятствующихъ произвольному изверженію проглоченнаго яда чрезъ естественную рвоту. Таковы преимущественно супъ яды чисто-оглушающіе (ven. narcotica pura). Сколько острые, разѣдающіе яды возвышаютъ раздражительность, столько же наркотические яды понижаютъ оную. Сколько посему, въ первомъ случаѣ, гдѣ проглоченный ядъ дѣйствуетъ первоначально ѣдкою своею силою на одинъ только желудокъ, съ коимъ находится въ непосредственномъ соприкосновеніи, рвота постепенно усиливается, сперва какъ спасительное усиліе природы къ изверженію яда, а при дальнѣйшемъ пребываніи яда въ желудкѣ, какъ припадокъ неминуемаго воспаленія сей внутренности, — столько въ послѣднемъ случаѣ, гдѣ проглоченный ядъ дѣйствуетъ усыпительною своею силою не только на желудокъ, съ коимъ находится въ соприкосновеніи, но вмѣстѣ и на отдаленные

органы пѣла, замѣчается медленность въ
 проявленіи рвопы, либо и совершенный ея не-
 доспапокъ, какъ слѣдствіе нераздражающаго
 и невоспалющаго, но напротивъ того усып-
 ляющаго дѣйствія яда. Слѣдственно, вмѣ-
 сто того, чтобы слизистыми и водянистыми
 пипіями припуплять раздражительно-
 ность желудка и только способствовать
 продолженію начавшейся естественной рво-
 пы, здѣсь нужно сильными рвотными сред-
 ствами возбудить немедленно и рѣшитель-
 но раздражительность желудка и недоспа-
 покъ естественной рвопы замѣнить искус-
 ственною. По сей же причинѣ обыкновенныя
 противупоказанія рвотныхъ средствъ,—чахоп-
 ное расположеніе, кровохарканіе, явное рас-
 положеніе къ удару или поспрѣлу, прису-
 ствіе грыжи въ оправленномъ,—напоминають
 только присемъ Врачу о соблюденіи нѣко-
 торыхъ предосторожностей, но никакъ не
 могутъ и не должны удерживать его отъ упо-
 требленія рвотныхъ. Гдѣ должно выслушать
 жизненное показаніе (*indicatio vitalis*), тамъ
 всѣ прочія показанія и противупоказанія не
 имѣють мѣста. Наконецъ, поелику для воз-
 бужденія раздражительности желудка, усил-

ленной наркотическимъ ядомъ и для скорѣйшаго отвращенія опасности отъ быстраго дѣйствія сихъ ядовъ на опдаленные органы шѣла, пребуяются не только сильныя, но и одною только рвоною ограничивающіяся средства: по выборъ рвоныхъ лѣкарствъ, ихъ количество и качество заслуживаютъ здѣсь особенное вниманіе Врача. Такъ количество рвожнаго камня (tart. emet.), доспашочное въ другихъ случаяхъ для произведе- нія рвоты, здѣсь окажется недѣйствитель- нымъ; если же количество сіе будетъ увели- чено, то, какъ извѣстно, окажется поносъ, и ядъ, находившійся доселѣ въ одномъ только желудкѣ, не только разносится по всему кишечному каналу, но и испражняется гораздо медленнѣе и не столь совершенно, какъ чрезъ рвоту. Напротивъ того бѣлый купоросъ (sulphas zinci), данный за разъ количествомъ отъ десяти до пятнадцати грановъ, произ- водитъ и скоро и вѣрно рвоту, безъ всякаго поспороннаго дѣйствія, а потому и пред- почтается при оправленіи наркотически- ми ядами всѣмъ рвонымъ средствамъ. Рво- ный корень (rad. Ipecac.) предписывается въ сихъ случаяхъ не иначе, какъ отъ одной до

двухъ драхмъ на пріемъ. Нѣкоторые Врачи дають для произведенія рвоны крупный порошокъ (pulv. grossus) горчицы на пріемъ до одной драхмы и болѣе, или же крѣпкую наспойку оной; однакожъ и сіе средство, бывъ употреблено въ большемъ количествѣ, получаетъ слабительную силу. Въ крайнихъ случаяхъ, при недоспавкѣ сихъ средствъ, возбуждается рвота вложеніемъ першовъ въ полость зѣва, щекопаніемъ помощію перышка, смазаннаго масломъ и вложеннаго въ щепріемное горло, сколько можно далѣе, причемъ должно подвигать сіе перышко попеременно вверхъ и внизъ.

Второе средство къ самоскорѣйшему выведенію изъ шѣла проглоченнаго яда есть механическое извлеченіе онаго посредствомъ насоса, предложенное уже *Бюргаволъ*, но не прежде, какъ въ новѣйшія времена усовершенствованное *Дюжотренолъ*, *Ренолтолъ*, *Ридолъ*, *Вейссолъ* *) и проч. Способъ сей со-

*) *Traité des poisons, tirés de regnes mineral, végétal et animal, ou Toxicologie générale par M. P. Orfila. T. I. 2-de edition. Paris. 1818. стр. 123.*

стоятъ въ проведеніи въ желудокъ трубки, сдѣланной изъ упругой смолы и соединяющейся съ насосомъ, посредствомъ котораго можно вытянуть изъ полости желудка всѣ находящіяся въ ней жидкости. Славный Лондонскій Операторъ *А. Куперъ* произвелъ самъ надъ собою сію операцію въ Генварѣ 1824 года въ присутствіи великаго числа Врачей. Онъ проглотилъ смѣсь изъ солодкового корня и воды и чрезъ нѣсколько минутъ извлекъ оную вышесказаннымъ насосомъ изъ желудка всю. Для успѣшнаго производства сей операціи требуется, чтобы эластическая трубка имѣла надлежащую длину и достигала до самаго дна желудка, чтобы также пространство ея было достаточно для безпрепятственнаго проведенія мягкой полусварившейся желудочной смѣси и другихъ подобныхъ веществъ. Оба конца сей трубки открыты; но къ наружному ея концу придѣлывается металлическая гайка для соединенія трубки съ насосомъ. Употребленіе сего прибора есть слѣдующее: эластическая

Manuel medico-legal des poisons précédé, des considérations sur l'empoisonnement etc. Par E. de Montmahou. Paris. 1824. стр. 41-43.

трубка проводится презъ ротъ или носъ въ самой желудокъ и соединяется съ насосомъ, чрезъ который впрыскивается сперва въ желудокъ нѣкоторое количество жидкости, способной къ разведенію, удержанію или растворенію яда (водянистой жидкости); потомъ чрезъ выпягиваніе поршня вбирается въ трубку и въ насосецъ вся жидкость, содержащаяся въ желудкѣ. Чрезъ многократное повтореніе сихъ двухъ дѣйствій желудокъ достаточно обмывается и весь ядъ испражняется, безъ сотрясенія тѣла, почти безъ боли и въ самое короткое время. Отъ щекотанія въ пищепріемномъ горлѣ и желудкѣ, причиняемаго трубкою, происходитъ нерѣдко рвота, — явленіе весьма благопріятное. Если ядъ не успѣлъ еще пройти чрезъ выходъ желудка (pylorus), если онъ не состоиптъ изъ большихъ кусковъ, то возмознось изверженія его симъ способомъ весьма очевидна. Желательно посему, чтобы столь простое, легкое и надежное средство вошло во всеобщее употребленіе. Средство сіе употреблено также съ совершеннымъ успѣхомъ при опьяненіи или оправленіи спиртными на-

нишками *). Пользу сего средства доказыва-
 опъ между прочимъ и слѣдующій случай, со-
 общенный Докторомъ Бердвали **). Больной,
 спирававшій легкою холерою, принялъ шарикъ
 (bolus), состоящій изъ трехъ гранъ merc. dul-
 cis и одного скрупула Confectionis opii. Чрезъ
 четыре часа погрузился онъ въ глубокий сонъ,
 причѣмъ оказались всѣ припадки оправленія
 опіемъ. Никакія средства не могли произвестъ
 рвоны. Посему шопчасъ употребленъ Вейс-
 совъ насосъ, посредствомъ коего вышлануто
 изъ желудка $\frac{1}{2}$ унца темнобурой жидкости,
 подобной водяному раствору опіа; за симъ
 впрыснушы въ желудокъ рвошныя сред-
 ства (solutio zinci sulphur. et cupri sul-
 phur. vinaris); но рвота не послѣдовала. На
 икры и подошвы положенъ горчишникъ. Про-
 изведено многократное впрыскиваніе въ же-
 лудокъ теплой воды и изверженіе ея чрезъ
 насосъ. Лице и грудь обливаемы были непре-
 рывно холодною водою, а къ носу подносили
 нашатырный спиртъ. По прошествіи трехъ

*) v. Froriep's Notizen a. d. Gebiete der Natur
 und Heilkunde 18-er B. стр. 79.

**) Edinb. medical a. surgical Journal N. xcii,
 October, 1828.

часовъ оправленный нѣсколько опомнился. Теперь впрыснуты были въ желудокъ раздражающія средства,—вода съ водкою, разведенный сѣрный эфиръ и проч. и послѣдовало промывашельное съ перпеншиннымъ масломъ. Мало помалу оправленный могъ уже отвѣчать на вопросы; но совершенное выздоровленіе не скоро воспослѣдовало.

Третье средство для выведенія яда изъ тѣла оправленной особы относится преимущественно къ тѣмъ оправленіямъ, гдѣ ядъ прошелъ въ тѣло не чрезъ ротъ но чрезъ поверхность тѣла. Укушеніе и ужаленіе ядовитыхъ животныхъ, случайно или умышленно произведенное соприкосновеніе ядовитого вещества съ какою либо раной, также раны отъ стрѣлъ, намазанныхъ ядомъ, суть главнѣйшія причины оправленій сего рода. Самоскорѣйшее изверженіе яда изъ тѣла основывается въ сихъ оправленіяхъ на томъ, чтобы воспрепятствовать всасыванію и прохожденію ядовитого вещества изъ раненой поверхности въ кровеносную систему. Для достиженія сей цѣли предлагаются: а) сжиманіе или перевязка, б) кровопусканіе, в) вы-

тасываніе, г) вырѣзываніе или опсѣченіе опрaвленнаго члена.

а) Механическое давленіе, производимое на ядовитую рану, равно перевязываніе раненнаго члена надъ самою ядовитую раню, оказались по новѣйшимъ опытамъ весьма важными средствами. Для перевязки обыкновенно совѣлупють *) брашь не снурокъ, но пшесму, шириною въ два перста, дабы не раздражать кожи, припомъ не крѣпко сплгивать повязку и не оставлать оную долго, дабы не увеличитъ багровости члена и не содѣйствовать развитію помершвѣнія. Недавно однакожь Г. Буиллярдъ **) впрыскивалъ многократно сприхнинъ и синильную кислоту въ нижнюю конечность кроликовъ и въ слѣд-

*) Orfila. Прив. соч. Т. II. стр. 544. Montmahou. Прив. соч. стр. 215.—Ueber die Gifte in medicinisch-gerichtlicher u. medicinisch-polizeylicher Rücksicht v. P. Schneider. 2-te Auflage, Tübingen. 1821. стр. 340. § 329. Vorlesungen u. d. Rettungsmittel beym Scheintode u. in plötzlichen Lebensgefahren. von I. Bernt, Wien. 1819. стр. 187. § 564.

**) Archives générales de Medecine, Т. XII. November, 1826.

ствіе сихъ опытовъ оказалось: 1) что крѣпкое давленіе на ядовитую рану, или, еще лучше, крѣпкая, сжимающая сосуды перевязка, приложенная надъ сею ранюю, совершенно предотвращаетъ смертельное дѣйствіе яда; 2) что даже тамъ, гдѣ ядъ, впу- щенный въ рану, успѣлъ уже произвестъ опасные припадки и угрожалъ близкою смертію, крѣпкая перевязка члена надъ самую ранюю почти мгновенно прекращаетъ всѣ припадки и, такъ сказать, возвращаетъ живопному жизнь; 3) что облегченіе, производи- мое сею перевязкою, продолжается во все то время, пока повязка крѣпко спянуша; но если послѣ нѣкотораго времени (по опы- тамъ *Бюллара* чрезъ 9-10 часовъ) повяз- ка будетъ ослаблена, то опасные припадки возобновляются во всей своей силѣ и жи- вотное умираетъ; 4) что однако же въ семъ послѣднемъ случаѣ можно еще прекратитъ припадки съ величайшею удобностію чрезъ крѣпчайшее спягиваніе перевязки. Такимъ образомъ *Г. Бюллардъ* 5-6 разъ попеременно возобновлялъ и прекращалъ припадки, ко- торые безъ сего, по видимому, сдѣлались бы неизбежно смертельными. Осипъ-Индскій Врачъ

*Д. Боттерб **), пользовавшій многократно людей, укушенных ядовитыми змѣями, также совѣщуетъ перевязывать крѣпко опрaвленнѣй членъ надъ самую ядовитую рану и неснимать перевязки слишкомъ скоро.

б) Кровопусканіе, какъ средство мѣстное, производимое чрезъ приспавливаніе кровососныхъ банокъ (*cucurbita sanguinolenta*) къ поверхности ядовитой раны, извергаетъ ядъ, непроникшій еще далѣе изъ ядовитой раны и пособляетъ посему пѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ скорѣе послѣ происшедшаго мѣстнаго опрaвленія употребляющія кровососныя банки. Докторъ *Барри ***) доказалъ сіе опытами надъ собакою и кроликомъ. Равнымъ образомъ свободное испеченіе крови изъ ядовитой раны, поддерживаемое выдавливаніемъ раны, погруженіемъ, гдѣ можно, опрaвленнаго члена въ теплую воду, теплою примочкою, немало способствуетъ изверженію яда; а потому и похваляется многими врачебными писателя-

*) Transaction of the medical Society of Calcutta. Vol. II. 1826.

**) Archiv. génér. de Med. Septembre. 1825. London medical a. physical Journal. January 1826. стр. 67-68.

ми (*Орфилю, Бернтолиъ, Монлагу, Шнейдеролиъ* *) и проч.). Общее кровопусканіе, какъ средство къ изверженію яда, перешедшаго уже изъ ядовитой раны въ кровеносную систему, предложено весьма недавно *Г. Берниеролиъ* **). Если, говоришь онъ, ядъ проникнулъ еще только къ большимъ венамъ, къ легкимъ и сердцу, то обильное кровопусканіе изъ широкаго отверстія вены, испражняющаго легко и много крови, заставляя жидкость сію устремляться туда, гдѣ она находитъ менѣе сопротивленія, и слѣдственно количество крови, для другихъ органовъ плѣла опредѣленное, по мѣрѣ кровоиспеченія уменьшается, а плѣмъ самымъ распространеніе яда по всей массѣ крови удерживается. Въ подтвержденіе мнѣнія сего *Г. Берниеръ* ссылается во первыхъ на опыты *Г-на Мажанди*, который, впрыскивая одной собакѣ въ вены значительное количество теплой воды, произвелъ искусственное полнокровіе и такимъ образомъ совершенно уничтожилъ дѣйствіе всасыванія. Основываясь

* Вышепривед. Сочин.

**) v. *Frozier's Notizen*. ххх. В. No 7. стр. 106-108.

на семь, Г. Берніеръ сдѣлалъ рану въ лапѣ одной молодой собаки и впуспивъ въ сію рану три грана спиртнаго экстракта чилибухи (extr. alcohol. nucis vomicæ), положилъ надъ раню, при локотно-плечевомъ членосоединеніи (articulatio humero-cubitalis), повязку; за симъ впрыскивалъ онъ мало помалу въ яремную вену столько воды, сколько живописное безъ значительнаго спраданія могло выдержать. Потомъ, отворивъ вену надъ перевязкою опрaвленнаго члена, выпустилъ онъ нѣсколько унцій крови и впрыснулъ сію послѣднюю кровь въ яремную вену другой собаки, которая мгновенно издохла отъ сполбняка и судорогъ. Между тѣмъ рана первой собаки тщательна была очищена, и когда вытекло изъ ней небольшое количество крови, то возвращена была животному полная свобода и оно не показывало никакихъ знаковъ опрaвленія, а чрезъ восемь дней послѣ сего, находясь въ полномъ здоровьѣ, употреблено было для другихъ опытовъ. И такъ, принявъ, что полнокроемъ уничтожается всасываніе, въ семь опытъ ядъ смѣшался только съ кровью, выпекающею изъ отворенной вены, потому что одна только сія вена

съ своими вѣпцями не участвовала во всеобщемъ полнокровіи. Сверхъ того, какъ здѣсь печеніе крови совершалось только изъ артеріи въ открытую вену, то ядъ, вошедшій въ сосуды, принужденъ былъ слѣдовать печенію крови въ вену и такимъ образомъ испражнялся изъ пѣла. Сей опытъ показался Г-ну *Берніеру* рѣшительнымъ; оставалось одно только затрудненіе, — необходимость впрыскивать воду въ вену. Для избѣжанія сей трудности можно, по его мнѣнію, впрыскиваніе замѣнить искусственнымъ полнокровіемъ оправленного члена, производимымъ весьма легко чрезъ умѣренно - крѣпкое перевязываніе онаго и отвореніемъ подъ перевязкою одной изъ главныхъ венъ, дабы испражнить ядъ, смѣшавшійся съ кровью. Въ доказательство сего мнѣнія при графа спиртнаго экстракта чилибухи вложены были въ рану, сдѣланную на правой щекѣ малой собаки; послѣ чего испытатель большими своими перстами сдвигалъ обѣ яремныя вены, а чрезъ шесть минутъ, обнаруживъ шу изъ сихъ венъ, которая находилась на оправленной сторонѣ, сдѣлалъ въ ней ланцетомъ значительное отверстіе; кровь лав-

ла весьма изобильно, и животное, получивъ опять свободу, не имѣло никакихъ припадковъ, исключая небольшой слабости. Другой собаку впущены были при грана вышеупомянушаго экстракта подъ кожу, покрывающую заднія части правой лапы. Надъ равною пошчасъ приложена крѣпкая повязка, а чрезъ шесць минушь удаленъ ядъ чрезъ повпоренное вымываніе раны. По надлежащемъ очищеніи раны животное получило свободу и бѣгало совершенно спокойно; но скоро однакожь получило жесточайшій сполбнякъ. Топчасъ сдѣлано обильное кровопусканіе изъ яремной вены. Животное, получивъ свободу, бѣгало по прежнему спокойно и только нѣсколько разъ слышно было хрипливое дыханіе, кошорое однакожь пошчасъ почти сдѣлалось естественнымъ. Изъ сего опыта Г. Берніеръ заключаетъ, что обильное кровопусканіе извергаетъ ядъ изъ шѣла даже и тогда, когда оный далеко уже проникнулъ въ кровеносную систему. Весьма крѣпкую перевязку Г. Берніеръ почитаетъ бесполезною и приписываетъ появленіе сполбняка въ послѣднемъ своемъ опытѣ тому, что артерія сканга была выстѣ съ веною и что поему пол-

покровія не могло образоваться. И дѣйствительно, какъ сущность способа, предложеннаго Г-мъ *Берніеролиъ*, состояишь въ изверженіи яда, проникшаго уже далеко въ кровь, чрезъ обильное кровопусканіе: по крѣпкая перевязка не составляетъ здѣсь особенной важности и есть только вспомогательное средство, нужное при всякомъ кровопусканіи. Чтобы однако способъ Г-на *Берніера* согласишь въ полной мѣрѣ съ способомъ Г. *Билларда*, состоящимъ, какъ упомянуто (сир. 72-73), въ крѣпкомъ перевязываніи оправленнаго члена надъ самою ядовитой раной, то очевидно для сего потребуешь еще дальнѣйшее подтвержденіе опытовъ, не только *Биллардовыхъ*, сколько *Берніеровыхъ*. Но мѣстное кровопусканіе чрезъ кровососныя банки, выжиманіе крови и вспомошествованіе свободному ея испеченію изъ ядовитой раны, также перевязка, по крайней мѣрѣ нѣсколько крѣпкая, надъ ядовитой раной, оспаюшся необходимо нужными средствами, безъ копорыхъ искусственное раздраженіе ядовитой раны, нагноеніе и шому подобное (о чемъ упомянуто будетъ въ своемъ мѣстѣ) лѣченіе не можетъ быть успѣшнымъ.

в) Высасываніе яда изъ ядовитой раны есть древнѣйшее средство, забытое въ наши времена и замѣняемое кровососными банками. Особы, занимавшіяся симъ, были Ливійскаго и Германскаго происхожденія и назывались *Psylli et Marsi* *). Онѣ оказали великую услугу Римскимъ легіонамъ во время Пунической войны. Карфагенъ—соперникъ древняго Рима—не только былъ славенъ оружіемъ своимъ, но и изобиловалъ, по положенію своему въ Африкѣ, ядовитыми змѣями, причинявшими нерѣдко вредъ Римскимъ легіонамъ. И въ семъ-то особенно случаѣ, по увѣренію старшаго *Плинія и Плутарха* **), опличались *Psylli et Marsi* въ искусствѣ высасывать яды. Древніе знали уже, что проглотеніе змѣинаго яда совершенно безвредно, если только проглатывающій не имѣетъ въ полости своего рта изъязвленій. Когда *Катонъ* проводилъ свою

*) Strabo—L. 17. Dion. Halic. L. 51. C. 14. Lucan. h. 9. vers. 894-951. Herodot. L. 4. c. 173. Pausan. L. 9. cap. 28. A. classical Dictionary by I. Lempriere. The 10 Edit. London. 1818. Art. *Psylli*.

**) *Plinii Hist. natur. L. 7. c. 2. Plutarchus in vita Catonis minoris. Suetonius in vita Octavii* . . .

армію чрѣзь безводныя Ливійскія степи, шо войны его не рѣшались уполипь несперпимую свою жажду водою найденнаго ими одного тольکو во всей степи испочника, на-полненнаго многими змѣями. Мудрый сей Полководецъ уговорилъ своихъ воиновъ слѣдующими словами *): „ядъ змѣиный вредень „погда, когда онъ смѣшается съ кровью; „змѣи оправляютъ чрѣзь укушеніе и убива- „ють зубами; пипть сію воду можно безъ „опасности для жизни.“ Сказавъ сіе, онъ первый потребоваль для себя воды изъ ска-заннаго испочника. *Корн. Цельсѣ* говоритъ о высасываніи ядовитыхъ ранъ слѣдующее: „Neque hercules scientiam praecipuam habent ii, „qui Psylli nominantur, sed audaciam usu ipso „confirmatam. Nam venenum serpentis, ut quae- „dam etiam venatoria venena, quibus Galli praecipue utuntur, non gustu, sed in vulnere „nocent. Ideoque colubra ipsa tuto estur, ic- „tus ejus occidit. Et si stupente ea (quod per „quaedam medicamenta circulatores faciunt)

*) Lucani Pharsalia прив. мѣсто.

**) C. Celsi de Medicina libri octo. Ex recensione Leon. Torgæ. Edinburgi. 1815. стр. 200.

„In os digitum quis indidit, neque percussus
 „est, nulla in ea saliva noxia est. Ergo quis-
 „quis exemplum Psylli secutus, id vulnus
 „exsuxerit, et ipse tutus erit, et tutum homi-
 „nem præstabit. Illud interea ante debebit
 „attendere, ne quod in gingivis, palatove, ali-
 „ave parte oris ulcus habeat.“ Въ наши вре-
 мена безвредное проглотіе змѣинаго яда
 подтверждено опытами Профессора *Манджи-
 ли* *). Посему пѣ, кои вмѣсто употребле-
 нія кровососныхъ банокъ рѣшились бы вы-
 сасывать ядовитую рану, должны быть, по
 совѣту *Цельса*, совершенно увѣрены въ цѣ-
 ломъ и неповрежденномъ состояніи рта
 своего. Небезполезно также присесть, гово-
 ритъ *Бернтъ* **), выполоскать ротъ пред-
 вариительно уксусомъ, покрыть всю полость
 рта Прованскимъ чистымъ масломъ, либо, по
 совѣту *Мида* ***), держа въ нѣсколько масла
 сего во рту во время самаго высасыванія и по-
 слѣ каждого отсосанія выплюнуть вмѣстѣ
 съ слюною все высосанное. Во всякомъ одна-

*) Giornale di Fisica, Chimica etc. Vol. IX. p.
 458. Orfila. Т. II. p. 472.

**) Привед. соч.

***) Rich. Med. Opera. Parisiis. 1751. стр. 55.

кожъ случаѣ употребленіе сего способа требовало бы величайшей оспорожности: ибо самыя малыя поврежденія кожи, выспилающей полосъ рпа, не всегда, какъ извѣстно, легко открывающіяся глазамъ даже опыннѣйшаго Врача и могутъ слѣдственно подвергнуться опасности жизнь высасывателя. Неудивительно посему, что способъ сей нынѣ мало уважается, хотя впрочемъ въ сущности своей принадлежишь къ дѣйствительнѣйшимъ средствамъ противъ змѣйнаго укушенія.

г) Вырѣзываніе ядовитой раны есть, безъ сомнѣнія, вѣрное средство къ изверженію яда изъ тѣла и предопращенію повсеместнаго оправленія, если только средство сіе употребляется поспѣшь по полученіи ядовитой раны, прежде нежели окажется воспаление въ сей ранѣ. Если же время (весьма краткое), благопріятное для сей операціи, прошло, либо если самое мѣстоположеніе ядовитой раны не позволяетъ вырѣзать оную, и припомъ самъ оправленный не соглашается на сіе: то, очевидно, средство такое будетъ не только безполезнымъ, но даже нерѣдко и вреднымъ.

✱

Тоже самое должно сказать объ описаніи оправленного члена, и копия *Фонтана* *) старался опытами подпвердить пользу опъ сего средства, однако оное не вошло во всеобщее употребленіе.

(Продолженіе въ слѣдующемъ No)

*) *Traité sur le venin de la vipère, sur les poisons Americains, sur le laurier-cerise et sur quelques autres poisons végétaux. Par Felix Fontana. T. II. Florence. 1781. 4. стр 13-22.*

III.

ШАБЕРТОВО ПРОТИВУГЛИСТНОЕ МАСЛО.

(Oleum anthelminticum Schaberti).

(Сообщилъ Профессоръ Нелюбинъ).

Историческое извѣстіе.

Употребленіе Диппеліева масла *Монтенели* и скипидара *Фенвилели* и другими Англійскими Врачами пропиву глистовъ подало *Шаберту* первую мысль составить смѣсь изъ обоихъ сихъ средствъ, названную въ послѣдствіи времени пропивуглистнымъ *Шабертовымъ* масломъ. Средство сіе сначала даваемо было *Шабертомъ* только домашнимъ живописнымъ, какъ то: овцамъ, шеляпамъ, свиньямъ, собакамъ и лошадямъ. Успѣшное излѣченіе сихъ живописныхъ отъ глистовъ подало ему поводъ испытать сіе масло и надъ людьми. Первоначально предписано оно было имъ

одной 12-пилюльной дѣвицѣ, спрдавшей гли-
стами, и оказало желаемое дѣйствіе. Вско-
рѣ послѣ того *Рудольфи, Брера и Гезе* удо-
сповѣрились на опытѣ въ превосходномъ дѣй-
ствіи сего лѣкарства. Къ немалому сожалѣ-
нію, отккрытіемъ сего лѣкарства воспользо-
вались въ то время весьма немногіе Врачи, и
оно, по всей вѣроятности, оспалось бы на-
всегда забытымъ, еслибъ *Бремсеръ* въ пре-
восходномъ своемъ сочиненіи снова не про-
славилъ его дѣйствія и не спарался бы обра-
тити на сіе средство должнаго вниманія
Врачей. Съ сего времени, въ продолженіи 8
послѣднихъ лѣтъ, Шабертово масло введе-
но въ общее употребленіе и нынѣ споитъ
на ряду съ первыми пропивуглистыми сред-
ствами.

Приготовленіе Шабертова масла.

I.

Возьми одну часть костянаго масла (ol.
cornu cervi foetidum) и три части скипидару
(ol. terebinthinæ); оба масла смѣшай хо-
рошо между собою въ спклянкѣ, запкни
плотно пробкою и наспайвай четверо су-
шокъ въ обыкновенной температурѣ; попомъ

смѣшеніе сіе влей въ пубулатную ретпорту, приспавъ приѣмникъ, обвяжи хорошо смычки сосудовъ влажнымъ пузыремъ и производи перегонку изъ песчаной бани на слабомъ огнѣ до $\frac{3}{4}$ долей. Безцвѣтную масляную жидкость, перешедшую въ приѣмникъ, разлей въ маленькія спкляночки (опъ $\frac{1}{2}$ до 1 унціи), запкни плотно пробкою, обвяжи пузыремъ и храни въ холодномъ и темномъ мѣстѣ.

Прилѣтаніе. Дабы масло сіе получилъ сколько можно безцвѣтнымъ и прозрачнымъ, надлежитъ иногда прибавлять къ сказанному смѣшенію чистую воду и угольный порошокъ. Перешедшее съ водою масло опдѣляется опъ оной оспорожнымъ сливаніемъ въ спклянки.

II.

Шаберпово масло можетъ быть приготовлено еще другимъ образомъ, въ самое крапчайшее время, чрезъ непосредственное смѣшеніе одной часпти Диппеліева масла (ol. rugo-animale depuratum) и прехъ часпей очищенного скипидара (ol. terebinthinæ).

С в о й с т в а.

Свѣжеприготовленное Шаберпово масло:

1. Прозрачно; оно либо совершенно безцвѣтно, либо имѣетъ блѣдножелтоватый цвѣтъ.

2. Отъ дѣйствія воздуха и свѣта перемѣняется; сначала дѣлается желтоватымъ, потомъ бурымъ и наконецъ чернымъ; причемъ изъ тонкой жидкости превращается въ густую массу.

3. Запахъ имѣетъ вонючій, непріятный.

4. Вкусъ пряный, сначала теплошу, а потомъ холодъ во рту производящій.

5. Въ алкоголь растворяется совершенно.

6. Съ водою смѣшивается помощію слизи и доставляетъ эмульсію.

7. Отъ пламени горячей свѣчи воспламеняется и горитъ, испуская густой дымъ.

Динамическое дѣйствіе масла.

Шаберпово пропивуглисное средство соединяетъ въ себѣ дѣйствіе перпеншиннаго масла съ Диппеліевымъ; посему оно принадлежитъ къ героическимъ средствамъ, обнаруживающимъ дѣйствіе свое на кишечный каналъ и глисты, гнѣздящіеся въ ономъ. Оно

не только умерщвляет глисты, но даже разрушает органический состав их и низвергает по частям или въ видѣ полуиспльвшихъ кусочковъ. Большіе приемы масла возбуждаютъ поношу, иногда и самую рвоту. Люди раздражительные чувствуютъ поску, трудное дыханіе, боль подъ ложечкою и по всему кишечному каналу. Пульсъ дѣлается скорымъ и замѣчается умноженіе теплоты въ тѣлѣ. Опдѣленіе мочи увеличивается; иногда оказывается боль въ почкахъ, мочевою пузырь и испеченіе мочи съ кровью. Умѣренные приемы сего лѣкарства не производятъ паковыхъ припадковъ, да и самыя большіе у людей безчувствительныхъ не причиняютъ значительныхъ припадковъ; больные въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль принимали онаго до 6-ти и болѣе унцій безъ всякихъ дурныхъ послѣдствій.

Болѣзни, въ коихъ Шабертово масло употребляется.

Хотя лѣкарство сіе и было предписываемо до сего времени во многихъ болѣзняхъ, но наиболѣе оказалось оно полезнымъ прошиву глистовъ. *Шабертъ*, какъ выше ска-

зано, первоначально употреблялъ оное для домашнихъ животнохъ и давалъ попомъ многимъ людямъ. Другіе Врачи также предписывали съ успѣхомъ сіе средство прошиву глистовъ особамъ различнаго возраста и пола. *Бремизеръ* однакожь болѣе другихъ имѣлъ возможность испытать дѣйствіе сего лѣкарства въ различныхъ породахъ глистовъ и въ послѣдствіи времени представилъ множество весьма любопытныхъ испытаній. Въ сочиненіи своемъ (*Dr. B. über lebende Würmer im lebendem Menschen*), при изложеніи собственнаго способа лѣченія отъ глистовъ, онъ говоритъ: „ленточную глисту (*Bothriocercus latus*) имѣлъ я случай въ Вѣнѣ только при два выгнать: у Швейцарки, у дамы, пріѣхавшей изъ С. Петербурга (1812 года) и у одной особы, спровадившей сею же глистою.“

Бремизеръ въ продолженіи 10-ти лѣтъ излѣчилъ Шаббершовымъ масломъ болѣе 500 особъ отъ плоской глисты (*Taenia solium*). Изъ числа сихъ больныхъ были двое дѣтей 1½ года, четверо больныхъ принимали сіе лѣкарство во второй разъ, изъ коихъ шрое въ 1814-мъ, а четвертый въ 1817-мъ году ;

одинъ больной, будучи два года совершенно здоровымъ, получилъ на претпій годъ подобные прежнимъ опъ сей глисты припадки и былъ снова излѣченъ симъ же средствомъ; прочіе же больные, лѣченные *Бремзеролъ*, различнаго пола, возраста и соспоянія, излѣченны были совершенно, и болѣзнь у нихъ, сколько ему до 1819 года было извѣстно, болѣе уже не возвращалась.

При лѣченіи глистовъ Шаберповымъ масломъ *Бремзеръ* предлагаетъ слѣдующій способъ: больному, одержимому глистами, надлежитъ давать предварительно слѣдующую кашку:

Rp. *Semen cinæ s. Tanaceti pulverisatorum semunciam,*
pulveris radices Valerianæ off. drachmas duas,
 ————— *jalappæ semidrachmam*
vel scrupulos duos,
Tartari vitriolati sesquidrachmam vel
drachmas duas,
Oxymellis scillitici q. s. ut fiat electuarium D. s.

Принимать по чайной ложкѣ два или три раза въ день.

По исходѣ сей кашки надлежитъ приступить къ употребленію Шаберпова масла. Онаго дается по 2 чайныя ложки съ глоткомъ (въ двухъ споловыхъ ложкахъ) чистой воды, утромъ и вечеромъ. Поелику запахъ сего лѣкарства гораздо непріятнѣе, нежели вкусъ, то по принятіи не должно полоскать горла; но лучше проглотить два глотка чистой воды и стараться сжимать глотку; чрезъ сіе ополаскивается небная занавѣска отъ приславшаго къ ней масла и преграждается прохожденіе запаха въ носовую полость; иначе больные получаютъ тошноту, а иногда и самую рвоту. Для избѣжанія непріятнаго вкуса во рту можно больному жевать корицу или гвоздику. Вещества, производящихъ опрыжку, каковы суть: обсахаренныя померанцовая или лимонная корки и многія другія употреблятъ здѣсь не слѣдуетъ.

Двѣ чайныхъ ложки сего масла, даваемая утромъ и вечеромъ, удобно переносятся больными обоего пола. Однѣ только чувствительныя особы вскорѣ по принятіи сего лѣкарства получаютъ легкое головокруженіе. Въ семъ случаѣ приемъ онаго нѣсколько мо-

жно уменьшивъ. Сіе случается иногда только въ самомъ началѣ; въ послѣдствіи же времени больные привыкають къ сему маслу и принимаютъ его весьма удобно. Лѣкарство сіе гораздо лучше предписывать на пощакъ; но тѣмъ, кои не могутъ сего сдѣлать, дозволяется сначала легко позавтракать; послѣ чего, часъ или полтора часа спустя, можно приниматьъ опредѣленное количество лѣкарства. Если масло произведетъ боль въ животѣ или рѣзь при испусченіи мочи, то для укрощенія той либо другой надлежитъ больному выпить спаканъ оршаду или предписать ему масляную эмульсію.

Когда больной употребитъ сего масла отъ $2\frac{1}{2}$ до 3-хъ унцій, на что потребно отъ 10 до 12-ти дней, то нужнымъ признается предписать слѣдующее слабительное средство:

Rp. Pulveris radices Jalappae scrupulum,
 — — foliorum Sennae semidrachmam,
 Sulphatis potassae drachmam.

M. f. pulvis divide in jii vel jv partes
 aequales D. S.

Давать по половинѣ порошка чрезъ полчаса или каждый часъ по цѣлому порошку,

пока воспослѣдуетъ испражненіе низомъ. После сего надлежитъ снова приступитъ къ употребленію Шабберпова масла и принимать оное по прежнему. По свидѣтельствѣ *Бремзера*, для изгнанія глистовъ въ обыкновенныхъ случаяхъ бываетъ достаточно отъ 4-хъ до 5-ти унцій масла. Въ самыхъ упорныхъ случаяхъ, гдѣ другія средства не оказали никакого дѣйствія, потребно было онаго отъ 6 до 7-ми унцій. Лѣченіе симъ средствомъ есть вѣрное, легкое и безвредное для здоровья. Для совершеннаго освобожденія отъ глистовъ, особливо *a taenia cucurbitacea*, надлежитъ употреблять сіе масло въ малыхъ приемахъ въ печеніи долгаго времени. Тогда только можно ожидать совершеннаго уничтоженія какъ глистовъ, такъ и самаго расположенія къ произрожденію оныхъ вновь.

Относительно діеты больные должны сколько можно воздерживаться отъ употребленія грубой, мучной, жирной и вообще трудноваримой пищи, располагающей къ образованію слизи въ кишечномъ каналѣ.

При лѣченіи Шабберповымъ масломъ глисты никогда не выходятъ ни цѣльными, ни въ длинныхъ кускахъ, какъ сіе случается при

употребленіи другихъ лѣкарствъ, но большею частію испражняюся въ видѣ маленькихъ лоскушковъ. Въ первые дни употребленія сего масла глисты извергаются по часнямъ или въ видѣ лоскушковъ полуисплѣвшихъ и едва примѣшную форму глистовъ удерживающихъ, вмѣстѣ съ выходящею слизью и нечистотами кишечнаго канала. Посему нельзя здѣсь ожидать, чтобы непременно вышла и самая головка глисты. Вѣрный признакъ освобожденія отъ глисты есть пошъ, когда больной въ печеніи прехъ мѣсяцовъ болѣе глисты не испражняетъ. Если по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ окажутся припадки отъ глистовъ, то слѣдуетъ заключить, что онѣ образовались вновь.

По изгнаніи глистовъ рѣдко предстоитъ надобность въ употребленіи лѣкарствъ, исключая, когда больной чувствуетъ нѣкопоруую слабость и есть склонность къ образованію слизи и произрожденію самыхъ глистовъ. Въ таковомъ случаѣ можно предписать ему укрѣпляющія средства, изъ коихъ *Брелзеръ* въ особенності рекомендуетъ слѣдующія капли:

Rp. Tincturae aloes compositae Pharm. Austr.
 drachmam,
 — — Martis pomatae unciam,
 Elixir Vitrioli Angl. Pharm. London. sem-
 unciam.

М. D. S. Принимать 10, 20, 30 и бо-
 лѣе капель въ рюмкѣ воды или винограднаго
 вина, опъ 3 до 4-хъ разъ въ день въ про-
 долженіи недѣли и долѣе.

Примѣт. Первая тинктура и послѣдній
 эликсиръ суть не иное что, какъ Elixir pro-
 prietatis dulce et Elixir Vitrioli Mynsichti, до-
 вольно извѣстные Врачамъ.

Кромѣ *Бремзера*, многіе Вѣнскіе Врачи
 испытали дѣйствіе Шабертова масла съ боль-
 шимъ успѣхомъ (Lengsfeld, Geischlöger, Di-
 anuene, Benedic). Равнымъ образомъ и въ дру-
 гихъ государствахъ Европы видѣли опъ него
 значительную пользу. У насъ въ Россіи въ
 обѣихъ столицахъ и въ нѣкоторыхъ провин-
 ціяхъ употребляли его также не безъ поль-
 зы. За 6 лѣтъ предъ симъ имѣлъ я случай
 давать сіе масло многимъ больнымъ, спра-
 давшимъ глистами, съ желаемымъ успѣхомъ.
 Опъ малыхъ приѣмовъ, предписываемыхъ по
 каплямъ и припомъ на короткое время, не

льзя ожидать никакой пользы. Если больные не могутъ приниматьъ вдругъ по 2 чайныхъ ложки, то надлежитъ даватьъ по одной; но если и при семъ приемъ будутъ чувствовать раздраженіе въ кишечномъ каналѣ, то должно предписатьъ сначала 10 капель три раза въ день, потомъ ежедневно прибавлять по 2 капли, пока въ состояніи будутъ приниматьъ 20, 30 и болѣе за каждый приемъ. По свидѣтельству нѣкоторыхъ Врачей, можно изгнать глисты малыми приемами масла; но въ такомъ случаѣ надлежитъ продолжать употребленіе нѣсколько недѣль и даже мѣсяцовъ.

Приемъ Шабертова масла.

Шабертово масло дается само по себѣ съ глоткомъ чистой воды, мяснаго бульона, оршада или съ другими слизистыми средствами. Изъ него не приготавливаются сложные препараты и оно не дается въ смѣшеніи съ другими средствами. Впрочемъ, кажется, можно было бы предписывать сіе масло въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ видѣ каши и болюсовъ, соединяя оное съ другими прошивуглистными лѣкарствами. Приемъ Шаберто-

на масла опредѣляется возрастомъ, поломъ и сложениемъ больного. Маленькимъ дѣтямъ, отъ 2 до 4-хъ лѣтъ, всего лучше давать отъ 4-хъ до 6-ти капель. Женщинамъ сначала давать по 10-ти капель и поспешно увеличивать 2-мя или 4-мя каплями ежедневно, и если не будетъ никакихъ припадковъ, то можно поступить по предписанію *Бремзера* и предписать одну или двѣ чайныхъ ложки, два или три раза въ сутки. Мужчинамъ можно начать съ одной и увеличить до двухъ чайныхъ ложекъ, два или три раза въ день, наблюдая за предосторожностями, о коихъ выше говорено.

О безвредности *Шабертова* масла можно судить по употребленію его многими особами, спровадившими отъ глистовъ, равно и по приведенному *Бремзери* одному случаю съ кухаркою, которая по легкомыслію, желая избавиться скорѣе отъ глистовъ, приняла сего масла спикляночку въ одну унцію за одинъ пріемъ и не чувствовала никакихъ послѣ того припадковъ. Но сей случай не можетъ служить примѣромъ для другихъ: ибо *Бремзеръ* и прочіе Врачи нерѣдко отъ

употребленія за одинъ разъ 2-хъ чайныхъ ложекъ масла замѣчали у особъ чувствительныхъ и раздражительныхъ боль въ животѣ, судороги и трудное испусценіе мочи и многіе другіе припадки; почему Врачъ долженъ употреблять сіе средство съ большою осторожностію и болѣе обращать вниманіе на теченіе болѣзни и сопряженіе самой болѣзни съ другими.

Примѣчаніе. Дѣйствіе сего лѣкарства, безъ сомнѣнія, зависить отъ терпентиннаго масла, сколько прославленнаго пропихъ глистовъ. Американскіе Врачи съ нѣкотораго времени начали предписывать пропиху глистовъ скипидаръ опіумно въ большомъ количествѣ. Они даютъ больному отъ одной до двухъ споловыхъ ложекъ и даже отъ 2-хъ до 3-хъ унцій на одинъ приемъ. Сколь ни полезно сіе лѣкарство отъ глистовъ, однакожь сколько большіе приемы (2 и 3 унціи) производили воспаленіе кишекъ, потекъ и мочевыхъ путей; почему и не слѣдуетъ предписывать оное въ такомъ количествѣ, но можно ограничиться одною споловою ложкою; каковъ приемъ не можетъ оснанивъ

✱

по себѣ худыхъ послѣдствій, какъ сіе под-
тверждаютъ опыты, учиненные многими
иностранными (Ozann, Romner, Кнох, Klapp,
Gibby), равно какъ и общественными Вра-
чами.

Опытъ О. Ромнера.

Этотъ опытъ былъ

сдѣланъ въ 1800 году

сдѣланъ докторомъ О. Ромнеромъ

въ 1800 году въ Берлинѣ

на 1000 человекъ

онъ разделилъ ихъ на

два общества, въ одно изъ коихъ

вошелъ докторъ Ромнеръ и въ другое

вошелъ докторъ Кнохъ

и въ первое общество вошелъ

докторъ Ромнеръ и въ второе

вошелъ докторъ Кнохъ и въ первое

вошелъ докторъ Ромнеръ и въ второе

вошелъ докторъ Кнохъ

и въ первое общество вошелъ

докторъ Ромнеръ

и въ второе общество

IV.

Извѣстеніе изъ сочиненія: Reports of Medical Cases, selected with a view of illustrating the symptoms and cure of Diseases by a reference to Morbid Anatomie (Наблюденія, избранныя для объясненія припадковъ и лѣченія болѣзней, съ уваженіемъ Патологической Анатоміи) by R. Bright. London. 1827.

Водяная. Болѣзненные явленія, находимыя въ пѣлахъ умершихъ послѣ водяной, такъ многоразличны, что во многихъ случаяхъ трудно рѣшить, что было причиною и что слѣдствіемъ болѣзни; но явленія сіи пѣмъ болѣе достойны вниманія, что изслѣдованіе ихъ взаимнаго отношенія послужитъ къ правильнѣйшему опредѣленію лѣченія. Обыкновеннѣйшую причину водяной болѣзни составляетъ расстройство кровообращенія, причи-

известное болѣзнями сердца (NB), печени, опухолями и другими органическими измѣненіями. Сія причина явственна открывается по смерти, верѣдко и при жизни; но разнообразность явленій представляеть еще обширный предметъ для изслѣдованія. Въ другихъ случаяхъ находились разные измѣненія брюшины, достаточныя для того, чтобы болѣзни ея помѣстились въ числѣ причинъ водяной. До сего мало обращали вниманія на состояніе почекъ, кошорыя у спирадавшихъ водяною иногда представляють органическія измѣненія, шотнѣйшее изслѣдованіе коихъ важно для рѣшенія: составляютъ ли сіи измѣненія причину или слѣдствіе болѣзни. У шѣхъ больныхъ, коихъ почки по смерти найдены измѣненными, сочинитель болѣею частію замѣтилъ измѣненное отдѣленіе мочи; она содержала много бѣловатого вещества и отъ жару свороживалась. Это составляетъ важный признакъ для распознаванія; поелику въ паковыхъ случаяхъ печень, болѣею частію, была совершенно здорова, а съ другой стороны въ водяной, зависѣвшей отъ болѣзни печени, ни почки по смерти не представляли болѣзненнаго измѣненія, ни моча при жиз-

ни не спвороживалась онъ жара; напро-
тивъ того сочинилъ доселѣ еще не видѣль
ниодного случая водяной съ спвороживающею-
ся мочею, въ которомъ по смерти онъ не
нашелъ бы явспвенныхъ слѣдовъ спраданія
почекъ. При подкожной водяной (апазагса),
происшедшей онъ прѣспуды либо онъ не-
воздержности, сочинилъ всегда находилъ
спвороживающуюся мочу, только въ разной
степени. Если мочу держалъ въ ложкѣ надъ
свѣчею, то она, прежде чѣмъ начнеть кипѣть,
по краямъ мушится, иногда принимаетъ
только опаловый цвѣтъ, а въ другихъ слу-
чаяхъ дѣлается совсѣмъ млековидною, скоро
появляюпся въ ней клочки и она спворожива-
ется, только въ разной степени, такъ
что иногда едва примѣшны бываютъ клочки,
а иногда вся моча походитъ на спворожив-
шееся молоко. Иногда на поверхности мочи
образуется тонкая пѣна, оспающаяся и по
совершенномъ охлажденіи жидкости. Въ рѣд-
кихъ случаяхъ (сочинилъ видѣлъ одинъ или
два раза) моча принимаетъ видъ спудени,
будто бы рыбій клей былъ распворенъ въ водѣ.
У таковыхъ больныхъ сочинилъ замѣнилъ
расположеніе къ кровавому мочеиспражненію.

У людей, уже долго спрадавшихъ подкожною водяною, худосочныхъ, пощихъ, большею частію ведшихъ неправильную жизнь и употреблявшихъ въ излишесствѣ спиртные напитки, бѣлковатыя часпи мочи спвороживались, какъ обыкновенно, въ клочки и маленькій комокъ, но вся испытываемая жидкость не принимала млечнаго виду, а клочки были буроваты и опрубямъ подобны. Въ сихъ случаяхъ моча иногда содержала много солей, постоявши долѣе, мутилась; но опъ жару, гораздо меньшаго, нежели какой попребень для спвороженія оной, опяшь дѣлалась свѣплой.

Во всѣхъ шѣхъ случаяхъ, въ коихъ моча спвороживалась, почки, казалось, много участвовали въ происхожденіи водяной; и какъ опправление ихъ, такъ и спроеніе было болѣе разспроено, нежели обыкновенно принимаютъ. Въ послѣднихъ случаяхъ всегда находились значительныя органическія измѣненія; а въ первыхъ, особливо недавнихъ, почки были наполнены кровью; въ смѣшанныхъ случаяхъ, ш. е., въ коихъ болѣзнь произошла еще недавно, но при неправильномъ образѣ жиз-

ни также находились органическія измѣненія.

Желая показать своимъ слушателямъ различіе мочи створоживающейся отъ неспвороживающейся, сочинитель велѣлъ принести мочу одного больного, несправдавшего водяною, кошорая однакожъ, къ удивленію его, также створожилась. При изслѣдованіи оказалось, что больной сей, мальчикъ 14-ти лѣтъ, блѣдный, худосочный, спрадавшій заваломъ печени, съ подозрѣніемъ хроническаго недуга сердца, прежде испражнялъ кровавую мочу. По смерти сего больного, воспослѣдовавшей отъ воспаления сердца и подреберной плевры, почки найдены, какъ сочинитель предсказалъ, значительно разспроенными, съ бѣлыми крапинками и бугорками.

Въ слѣдствіе вскрытія умершихъ сочинитель принимаетъ три болѣзненныя состоянія почекъ, сопровождающія водяною и испражнение створоживающійся мочи. Первый изъ таковыхъ недуговъ почекъ, судя по явленіямъ, состоить только въ слабости сихъ органовъ; почки теряютъ свою крѣпкость, снаружи цвѣта желтаго съ крапинками; корковое существо ихъ по разрѣзѣ представ-

ляетъ ровный, желповатый сѣрымъ оп-
 ливающій цвѣтъ; мякотное существо свѣт-
 лѣе обыкновеннаго; величина почекъ не пе-
 ремѣнялась. Сіе состояніе иногда встрѣ-
 чается у слабыхъ людей въ хроническихъ
 болѣзняхъ безъ водянистыхъ накопленій; со-
 чинитель однажды видѣлъ его при поносѣ и
 чахоткѣ, а въ другой разъ при опухоли жен-
 скихъ яичниковъ. Въ первомъ случаѣ спво-
 роженіе мочи было слабое, а во второмъ на
 него не обратили вниманія. Съ усиленіемъ
 сего состоянія спроеніе почекъ измѣняется;
 онѣ мѣстами опшвердѣвають, кровообраще-
 ніе въ нихъ дѣлается неровнымъ, поверх-
 ность бугорковатою, съ блѣдными возвыше-
 ніями, и впрыснутая въ артерію жидкость
 не проникаетъ въ окрѣпости. Сіе состоя-
 ніе сочинитель находилъ при водяной со спво-
 роживающеюся мочою. Во второмъ состояніи
 все корковое существо перемѣняется въ
 зернистую массу, бываетъ какъ бы напол-
 нено болѣзненнымъ шемнобѣлымъ веще-
 ствомъ, которое въ низшей степени сего
 состоянія представляется на подобіе пес-
 чинокъ, а въ высшей степени все корковое
 существо наполнено онымъ, и почка уже сна-

ружи представляеть возвышенія и бывають больше обыкновеннаго. Въ прѣпьемъ состояніи почка на осязаніе жестка, представляеть множество желтоватыхъ, красныхъ или пурпуровыхъ возвышеній, величиною въ булавочную головку. Существо почки хрящеваго, менѣе чѣмъ въ прежнемъ видѣ наполнено зернистымъ веществомъ. Состоянія сіи большею частію переходятъ одно въ другое. Иногда почки бывають необыкновенно мягки.

Воспаленіе сыворопочныхъ оболочекъ часто, но не всегда, сопровождается водяною болѣзнью, вообще опасно и должно быть лѣчено испражненіями крови.

Изъ слабительныхъ сочинитель особенно похваляетъ *supertart. potassæ*; если желудокъ не можетъ переносить одного, *cum jalappa* и небольшимъ количествомъ инбиря; изъ мочегонныхъ наипаче *scilla marit. cum succo spiss. hyosc. n.* и малые приемы опиѣ. *Digitalis* р. иногда оказывалась неэффективной. Счастливио окончившіеся случаи всѣ излѣчены безъ рпуши, копорая въ другихъ случаяхъ препятствовала хорошему дѣйствию другихъ средствъ; кромѣ того она у спраждающихъ водяною скоро производитъ сильное

слюнопеченіе и даже померпвѣніе. Нѣкоторыхъ больныхъ, у которыхъ, судя по пульсу и біенію сердца, сочинитель предполагалъ слабость почекъ, онъ излѣчилъ хининомъ съ морскимъ лукомъ; въ сихъ же случаяхъ, ему кажется, было бы полезно употребить *уват урсі*, какъ крѣпительное средство.

Болѣзни легкихъ. Слизистая оболочка, существо легкихъ и подреберная плева такъ тѣсно между собою соединены, что во многихъ случаяхъ воспаленіе одного сообщается другимъ, и ни при жизни изъ припадковъ, ни по смерти изъ явленій не лѣзя точно опредѣлить, откуда оно началось.

Въ началѣ воспаленія слизистой оболочки легкихъ (высипающей вѣшви дыхательнаго горла) у молодыхъ людей кровопусканіе весьма полезно; но у пожилыхъ людей, у которыхъ болѣзнь каждую зиму возвращается въ бѣльшей степени, всякая потеря крови опасна: поелику она причиняетъ упадокъ силъ и чрезъ то затрудняетъ изверженіе слизи, обильно отдѣляющейся.

Воспаленіе легкихъ весьма рѣдко переходитъ въ померпвѣніе (*gangraena*), которое

большою частію, кромѣ воспаленной части, проспирается и на другія. Исходъ сей болѣе свойственъ воспаленію существа легкихъ, нежели воспаленію слизистой оболочки. Иногда предшествовавшее воспаленіе бываетъ кратковременное и малопримѣтное, и только внезапный упадокъ силъ показываетъ опасный исходъ онаго. Померпвѣніе иногда объемлетъ все легкое, иногда одну долю, а иногда только часть онаго, и примѣтна бываетъ линія, отдѣляющая здоровыя части отъ померпвѣлыхъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ померпвѣніе бываетъ слѣдствіемъ нагноенія, прекратившаго доступъ крови къ померпвѣлой части. Если померпвѣніе находится въ сообщеніи съ вѣтвями дыхательнаго горла, то запахъ дыханія служитъ вѣрнѣйшимъ признакомъ онаго.

Разспроеніе существа легкихъ представляется наипаче въ двухъ видахъ, которые можно бы почесть за совершенно различныя болѣзненные состоянія, если бы они не находились вмѣстѣ въ одно время. Иногда часть легкихъ, различной величины, дѣлается плотною, хрящеватою, темнѣшаго цвѣта и кажется почти прозрачною;

мало помалу въ ней появляются желтоватые пятна; она размягчается, переходитъ въ нагноеніе, гной пролагаетъ себѣ путь въ вѣтви дыхательнаго горла и извергается. Опъ продолжающагося нагноенія въ спѣнкахъ полоски она увеличивается. Въ другихъ случаяхъ въ легкихъ находится множество зернышекъ, величиною въ мелкую дробь, болѣе или менѣе наполняющихъ все существо легкихъ. Видъ легкихъ присемъ мало измѣняется; только сжимая легкія, можно чувствовать оныя зернышки. Мало помалу зернышки сія увеличиваются (до горошины) и въ срединѣ ихъ начинается нагноеніе; часто они соединяются между собою и окружаютъ часть здороваго легкаго, которое скоро оптвердѣваетъ, принимаетъ голубоватый цвѣтъ, дѣлается полупрозрачнымъ, переходитъ въ нагноеніе и образуетъ полость, окруженную упомянутыми железистыми шѣлами.

Засореніе железъ у чахоточныхъ, даже незлопушныхъ, случается наипаче въ железахъ вѣтвей дыхательнаго горла и брыжечныхъ. Первые дѣлаются темнѣе цвѣтомъ, крѣпче, увеличиваются, рѣдко переходятъ въ

нагноеніе, а чаще въ нихъ опдѣляется зем-
листая масса. Спращаніе брыжеечныхъ же-
лезъ, кажется, непосредственно происхо-
дитъ отъ раздраженія, причиняемаго воспа-
леніемъ слизистой оболочки кишекъ, копо-
рое часто наспушаетъ очень скоро и обна-
руживается чрезъ неправильное испражненіе
низомъ, по временамъ появляющимся поносомъ,
необыкновенно чистымъ, блестящимъ язы-
комъ и мошеницею, и въ послѣдствіи чрезъ
неукротимый поносъ ускоряетъ смерть. Опу-
холь железъ большею частію соотвѣтствуетъ
раздраженію слизистой оболочки кишекъ;
близъ язвъ, образовавшихся въ сей оболочкѣ,
железы распухаютъ наиболѣе и склонны къ
нагноенію. Сіе спращаніе брыжеечныхъ же-
лезъ ускоряетъ изнуреніе чахотныхъ, вѣро-
ятно, препятствуя прохожденію пищева-
тельного сока; по крайней мѣрѣ сочинитель нахо-
дилъ во многихъ случаяхъ млечные сосуды
распннутые пищевательнымъ сокомъ.

Спращаніе слизистой оболочки кишекъ, со-
провождающее чахотку, по смерти представ-
ляется въ двухъ видахъ. Въ низшей сте-
пени оно состоитъ только въ раздраженіи
кишечнаго канала, обнаруживающемся боль-

шимъ развишемъ кровеносныхъ сосудовъ, или безчисленнымъ множествомъ самыхъ маленькихъ черныхъ пятенъ, отъ коихъ части, болѣе другихъ ими покрытыя, получаютъ сѣроватый цвѣтъ. Въ высшей степени сраданія кишекъ происходятъ язвы, иногда въ двенадцатиперстной кишкѣ, чаще въ тонкихъ кишкахъ, а наичаще на заслоночкахъ и по всей ободочной кишкѣ.

У.

НАРУЖНОЕ УПОТРЕБЛЕНІЕ СЕЛИ- ТРОКИСЛАГО СЕРЕБРА.

1. Извлеченіе изъ сочиненія Доктора Броуна.

Мозоли. Давленіе составляетъ единствен-
ную причину сихъ беспокоящихъ наростовъ,
равно какъ и того, что онѣ иногда перехо-
дятъ въ язвы. Мозоли большею частію про-
исходятъ отъ нѣжныхъ сапоговъ или башма-
ковъ, и пошому наиболѣе модники и модницы
отъ нихъ страдаютъ. Люди тяжелые, особли-
во если они много ходятъ, подвергаются
сему непріятному недугу, даже и тогда, ко-
гда носятъ просторную обувь.

Мозоль есть не иное что, какъ нѣсколь-
ко слоевъ ополстѣвшей кожицы. Отъ дав-
ленія обуви она вжимается въ кожу, при-
чиняетъ раздраженіе и воспаленіе оной. Изъ

лѣчишь мозоли непрудно, и онѣ сами прошли бы, если бы причина оныхъ была удалена; но иногда щегольство, а иногда необходимость пому препятствуютъ. Посему нужно изобрѣсти средство къ удаленію сихъ безпокойныхъ наростовъ при продолжающейся причинѣ оныхъ. Слѣдующій способъ кажется мнѣ самымъ лучшимъ. Нужно, лежа спать, мочить ногу въ теплой водѣ, пока мозоль значительно размякнетъ, потомъ срѣзать ее ножичкомъ, только не до крови; наконецъ мѣсто мозоли хорошенько прижечь адскимъ камнемъ, смоченнымъ водою или, что гораздо лучше, слюною. Прижиганіе должно проспираться нѣсколько за окружность мозоли и быть такъ сильно, чтобы мѣсто мозоли, отъ приставшаго селитроокислаго серебра, скоро сдѣлалось темносѣрымъ, а иногда и совсѣмъ чернымъ. Вреда отъ чрезмѣрнаго прижиганія, особливо на самой мозоли, быть не можетъ. Прижженное мѣсто покрыть хлопчатною бумагою и надѣть чулокъ, дабы бумага не сдвинулась съ своего мѣста. Она должна лежать до тѣхъ поръ, пока оспаится болѣзненная чувствительность.

Черезъ 2-3 недѣли прижженная часть опадаетъ и мѣсто мозоли оспаеется гладкимъ и здоровымъ. Иногда мозоль такимъ образомъ пропадаетъ навсегда; но если и появился снова, то ее опять можно согнать тѣмъ же способомъ.

Язвы въ горлѣ, во рту и на языкѣ.
Можетъ быть излишне говорить о хорошемъ дѣйствіи селитроокислаго серебра на венерическія язвы въ горлѣ; но по всей справедливости, оно есть лучшее въ такихъ случаяхъ средство, если будетъ употреблено въ полномъ видѣ, а растворенное въ водѣ оно не такъ дѣйствительно.

Въ печеніи нѣсколькихъ лѣтъ имѣлъ я много больныхъ язвами языка. Они были взрослые и большею частию золотушного и левкофлегматического тѣлоложенія. Язвы занимали разныя части сего органа; нѣкоторыя находились при его основаніи. Онѣ имѣли видъ молошницы (aphtha); нѣкоторыя были очень глубоки, только нешироки и края ихъ были воспалены. Многія продолжались уже нѣсколько мѣсяцовъ и проливоспали разнымъ употребленнымъ средствамъ.

✱

Опредѣленной причины не лзя было сыскашь никакой, кромѣ особеннаго пѣлосложенія и расспройсва пищеварительныхъ органовъ.

Всѣ они въ нѣсколько дней излѣчены наружнымъ упопрѣбленіемъ адскаго камня.

Самый худшій случай язвъ языка, какой я только видѣлъ, повспрѣчался мнѣ недавно. Язвы произошли опѣ неоспорожнаго упопрѣбленія рпуши, при особенномъ пѣлосложеніи. Языкъ былъ покрытъ язвами по обѣимъ споронамъ, опѣ одного конца до другаго и значительнао распухъ. Больная не могла ни ѣспѣ, ни высунушь языка изорпа, ни говоришь. Сіе соспояніе продолжалось уже при недѣли; больная упопрѣбила разныя средспва, но съ малою пользою. Вся поверхность язвъ была хорошенъко пошерпа адскимъ камнемъ, и чрезъ супки видѣ ихъ значительнао поправилсъ. Прижиганіе было повпоряемо ежедневно, и чрезъ чепыре дня опухоль языка уменьшилась и больная могла его высунушь изорпа; чрезъ восемь или десять дней болѣзнъ излѣчена совершенно.

Селипрокислое серебро можно упопрѣблять при язвахъ во рпу во всякой спепени.

Какъ части бывають уже омочены слюною, по нужно только прикоснуться сухимъ адскимъ камнемъ къ поверхности язвы и шопчасъ его опнять. Если язва побѣлѣетъ, то болѣе прикасаться не нужно; въ противномъ случаѣ прижиганіе повторишь еще разъ или два, пока окажется упомянутое дѣйствіе. При малыхъ или глубокихъ язвахъ нужно конецъ камня заоспришь или сдѣлашь коническимъ, дабы онъ вѣрнѣе прикасался ко дну и бокамъ язвы.

Язвы сосковъ груди. Язвы сіи, какъ извѣстно, причиняють боль, часто бывають упорны и не только принуждають преждевременно опнять младенца отъ груди, но иногда оспавляютъ по себѣ заросствіе опверспій соска либо и совершенное истребленіе его. Обыкновенныя средства, похваляемыя въ такихъ случаяхъ, часто оспаются недѣйствительными, либо дѣйствіе ихъ бываетъ весьма медленное, и матери или кормилицы нерѣдко пренебрегаютъ предписанія Врача и употребляютъ домашнія средства.

Сія болѣзнь, по моимъ наблюденіямъ, можешь быть скоро излѣчена, не опнимая мла-

денца опть груди. Средство къ излѣченію ея составляетъ селипрокисное серебро. Недѣйствительность обыкновенныхъ средствъ и польза селипрокислаго серебра въ рожиспыхъ воспаленіяхъ и раздражиспелныхъ язвахъ роговой оболочки и другихъ часпей пѣла родили во мнѣ мысль употребить его и въ сихъ случаяхъ.

Нужно заоспренный и овлаженный кончикъ камня впускатъ въ прещины соска и попираютъ имъ язвы, находящіяся на соскѣ, такъ чптобы поверхность ихъ приняла сѣрой цвѣтъ.

Уже на другой день, въ одномъ случаѣ, чувспвительность уменьшилась. Въ сей и слѣдующій день прижиганіе было дѣлано дважды, поуспру и вечеромъ, а попомъ по одному разу. Въ печеніи семи дней прещина зажила, и язва заживала, такъ чпто сосаніе младенца причиняло лишь слабую боль. Прижиганіе было продолжаемо до заживленія соска и женщина во все это время кормила младенца грудью.

Коровій сосокъ, надѣтый на больный, ускоряетъ лѣченіе; но въ упомянутомъ случаѣ младенецъ никакъ не хопѣлъ его брать.

Если спраждающее мѣсто будетъ прижигваемо слегка, такъ что къ нему приспадется только малое количество селитроокислаго серебра: то оно соединяется съ кожей и теряетъ свою ѣдкость, и потому не причинитъ никакого вреда младенцу, хотя бы и попало въ маломъ количествѣ ему въ желудокъ.

Г. Б. употреблялъ селитроокислое серебро и при рыхлости десенъ съ кровошеченіемъ изъ оныхъ, даже въ застарѣлыхъ и упорныхъ случаяхъ, съ хорошимъ успѣхомъ.

При хроническомъ воспаленіи вѣкъ и роговой оболочки средство сіе оказалось также весьма дѣйствительнымъ. Оно удивительно способствуетъ возстановленію здоровой дѣятельности въ частяхъ, поврежденныхъ разными ранами, язвами и различнаго рода воспаленіями, а особливо разстроенныхъ болѣзненнымъ (худокачественнымъ?) воспаленіемъ; оно измѣняетъ качество воспаленія и превращаетъ его въ полезное, мѣньшею болью сопровождаемое.

Столь же полезно дѣйствіе сего средства при язвахъ и воспаленіяхъ слизистыхъ оболочекъ, какъ и при болѣзняхъ кожи.

Notizen von Froriep ххп. Bd. стр. 249.

2. *Употребленіе селитроокислаго серебра въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ глазъ.* J. Ріалла (Ryall).

Селитроокислое серебро употребляется для отвращенія и лѣченія многихъ весьма важныхъ болѣзней глазъ такъ часто, что Г-ну Ріаллу показалось нужнымъ почтѣе опредѣлить нѣ случаи, въ коихъ сіе средство дѣйствительно полезно, дабы чрезъ то вмѣстѣ отвратить вредъ, который можетъ произойти отъ неправильнаго употребленія онаго.

Язвы роговой оболочки. Въ Дублинѣ онѣ весьма часто встрѣчаются, особливо поверхностныя, между бѣдными, въ слѣдствіе хроническаго воспаленія глазъ, которое онѣ дѣлають весьма упорнымъ, наипаче при золотушномъ пѣлосложеніи. Пропиву сихъ поверхностныхъ язвъ оказался весьма дѣйствительнымъ растворъ двухъ гранъ *nitrat. argenti* въ одной унціи перегнанной воды. Когда язвы начнутъ подживатьъ, то коли-

чество селипрокислаго серебра надлежитъ увеличивать и можно перейти ко впрыскиванію сего распвора. При глубокихъ язвахъ роговой оболочки нужно къ язвѣ прикасаться киспочною, омоченною въ крѣпкій распворъ адскаго камня или употреблять его въ сухомъ видѣ, причемъ послѣ каждаго употребленія нужно впустить въ глазъ немного свѣжаго миндальнаго масла. По спаденіи, такимъ образомъ образовавшагося, спрупа продолжатъ употребленіе средспва до тѣхъ поръ, пока язва приметъ здоровый видъ. Тогда опять надобно перейти къ слабому распвору. Внутреннее употребленіе рпуши въ шаковыхъ случаяхъ обыкновенно не имѣетъ мѣста. Больные, спраждующіе язвами роговой оболочки, бываютъ по большей части нѣжнаго, слабаго тѣлосложенія и имъ нужна легкая, пишательная діета, ванны, легкія крѣпительныя лѣкарспва, здоровое жилище, свѣжій воздухъ, а не рпушныя средспва. Правда, вспрѣчаются случаи, въ коихъ употребленіе раздражающихъ средспвъ запрещается, наприм: при большой чувспвительности глазъ, изліяніи пасоки между пластинками роговой оболочки. Здѣсь сперва надлежитъ умень-

ишишь дѣятельность сосудовъ мѣспнымъ испражненіемъ крови, слабительнымъ и успокоивающими примочками; послѣ сего нужно прописать два раза въ день по пилюль изъ сладкой ртутти, сюръмы и опія, пока окажется легкое раздраженіе десенъ, либо припадки будутъ преодолены. Вкапливаніе настойки опія въ глаза, при нагноеніи роговой оболочки, сильно увеличиваетъ раздраженіе, нимало не возбуждая въ частяхъ дѣлительной дѣятельности. (Послѣднему противорѣчитъ наблюденіе другихъ Врачей).

Прыщи (pustula) соединительной оболочки. Прыщи сіи обыкновенно случаются при золотушномъ расположеніи. Ихъ склонность къ воспаленію уменьшается легкимъ прикосновеніемъ крѣпкаго раствора, а часто они вскорѣ совсѣмъ уничтожаются. Въспѣсъ съ шѣмъ по вечерамъ нужно употреблять слабую мазь изъ nitras hydrargyri.

Помертвѣніе роговой оболочки. Для скорѣйшаго отдѣленія помертвѣлыхъ частей Г. Ріалль нашелъ весьма полезнымъ растворъ осьми гранъ адскаго камня въ унціи перегнанной воды, впрыскивая его три или четыре раза въ помертвѣлыя части. Внутрь въ

тоже время весьма полезно давать *extr. cinchonae*, кошорый *G. Ріалль* съ хорошимъ успѣхомъ употреблялъ и у новорожденныхъ младенцовъ при совершенномъ померпвѣніи наружной пластинки роговой оболочки. Сѣрно-кислый хининъ при сихъ обстоятель-ствахъ дѣйствуесть также весьма хорошо.

Выпаденіе райка. Селипрокислое серебро при язвахъ роговой оболочки съ выпаденіемъ райка есть главное, если не единственное надежное средство. Прикосновеніе, нѣсколь-ко разъ въ день, заоспреннымъ камнемъ про-изводитъ превосходное дѣйствіе; оно скоро возбуждаетъ цѣлительную дѣятельность и образованіе новыхъ часпей, роговая оболочка опять дѣлается выпуклою, выпавшій раекъ втягивается, и если отверстіе находится не въ срединѣ роговой оболочки, то зрѣніе воз-становляется совершенно. Присемъ суще-ственную пользу оказываетъ экстрактъ кра-савицы (*belladonna*), испаренный до густоты сливокъ, если его раза два или три впи-раетъ въ бровь и въко.

Потемнѣніе роговой оболочки. Оно боль-шею частію есть слѣдствіе хроническаго воспаленія и обыкновенно зависить отъ излія-

нія спвороживающейся пасоки между пластинокъ роговой оболочки. Часпо припомъ спраждупть желѣзы вѣкъ. Здѣсь полезно сперва мѣстное испражнение крови, чрезъ припущеніе пиявиць ко внутрѣнной поверхности вѣкъ, и слабительныя. Уменьшивъ припеченіе къ глазу, нужно тонкозаосп-реннымъ адскимъ камнемъ очерпипть кругъ на твердой оболочкѣ (t. sclerotica) глаза вокругъ роговой, линіи на двѣ опть края послѣдней. По спаденіи спрупа нужно еще нѣсколько времени поддерживать нагноеніе и почаще впрыскивать въ глазъ распворъ (двухъ до шести гранъ на унцію воды) селипрокислаго серебра, а по вечерамъ сверхъ сего впирапть въ вѣки мазь изъ краснаго ршупнаго окисла. Въ нѣкоторыхъ упорнѣйшихъ случаяхъ сочинипель съ пользою употреблялъ распворъ уксусокислаго свинца; но вообще сіе средство не такъ дѣйспвипельно, какъ распворъ селипрокислаго серебра. Сѣрная кислопа, разведенная водою и сѣрнокислый хининъ, снаружи употребленные, также въ нѣкоторыхъ случаяхъ оказались весьма дѣйспвипельными.

При *бѣльмѣ* (albugo), въ воспалительномъ періодѣ, мѣстное кровопусканіе, сладкая ртуть, сурьма и опій болѣе споспѣшествуютъ всасыванію пасоки, нежели мѣстные возбуждающія средства; но по прекращеніи воспаленія крѣпкій растворъ селипрокислаго серебра (8 гранъ на унцію воды) оказываетъ хорошее дѣйствіе, при употребленіи слабой мази изъ краснаго окисла ртути.

Расширеніе роговой оболочки (staphyloma), происшедшее у младенцовъ отъ оспы или воспаленія глазъ (ophthalm. neonatorum), ограничивалось въ своемъ ходѣ и даже уменьшалось отъ произведенія адскимъ камнемъ язвъ на сей оболочкѣ и поддержанія оныхъ. После операціи, дѣлаемой при сей болѣзни, средство сіе споспѣшествуетъ скорому заживленію.

Шероховатость вѣкъ (granulationes palpebrarum) есть другое слѣдствіе продолжительнаго воспаленія глазъ, а наипаче шакъ называемаго Египетскаго. Сперва нужно соскоблить зернистые наросты ланцетомъ, а потомъ всю рану овлажить крѣпкимъ растворомъ селипрокислаго серебра, повторяя увлажненіе по спаденіи сгруппа до тѣхъ поръ,

пока наросты пропадутъ. Возвратъ наростовъ лучше всего опивается тонкимъ порошкомъ сѣрноокислой мѣди, напирая онымъ черезъ день или черезъ два внутреннюю поверхность вѣкъ. Присемъ нужно употреблять слабый растворъ того же средства или адскаго камня, а по вечерамъ unguent. merc. praecip. rubri. Tinct. muriat. ferri въ нѣкоторыхъ случаяхъ оказалась полезною.

Выворотъ вѣка (entropium). При выворотѣ вѣка, происшедшемъ отъ ополстѣнія и распухлости соединительной плевы вѣкъ, адскій камень составляетъ важное средство для уничтоженія шакowej опухоли и приведенія вѣка въ надлежащее положеніе. Иногда нужно, прежде употребленія адскаго средства, вырѣзать часть болѣзненно - измѣненной соединительной плевы. Однако при употребленіи селитроокислаго серебра надобно быть осторожнымъ, дабы чрезъ излишнее прижиганіе не произвели противоположнаго состоянія вѣка или заворота.

Encanthis, pterygium и другіе мясистые наросты твердой и роговой оболочекъ иногда нужно удалять чрезъ вырѣзываніе, а послѣ онаго необходимо употребленіе адскаго кам-

ня какъ для испребленія оспапковъ, пакъ и для отвращенія возврата недуга и для возбужденія плотращенія въ ранѣ. Въ другихъ случаяхъ одного сего средства достаточно для уничтоженія болѣзни.

Transactions of the Association of Fellows and Licentiates of the King and Queen's College of Physicians in Irland. Vol. v. 1828.

VI.

*О растяженіи связокъ, diastasis ligamentorum. Соч. А. Пеллетье, Главнаго Хирурга госпиталя въ Мансѣ (Mans) *).*

Въ сочиненіи Г-на Пеллетье слѣдующее показалось намъ достойнѣйшимъ вниманія.

Теченіе и періоды растяженія связокъ.

Сочинитель принимаетъ четыре періода сей болѣзни.

1-й періодъ. *Насильственное растяженіе тленосоединительныхъ связокъ.* Довольно сильная, но обыкновенно скоропреходящая боль; пѣсповатая опухоль около поврежденной части. Сей періодъ продолжается день, два, три или четыре, смотря по степени растяженія и пѣлосложенію человека.

2-й періодъ. *Острое воспаленіе растянутыхъ частей,* обыкновенно появляющееся меж-

*) *Revue médicale française et étrangère. Février, 1828.*

ду впорымъ и четвертымъ днемъ послѣ наслія, и припомъ большею частію по прекращеніи первой боли. Оно бываетъ разной степени жестокости и продолжается различно, по различію употребленныхъ средствъ.

3-й періодъ. *Переходъ острого воспаления въ хроническое.* Если поврежденіе, въ періодъ острого воспаления, будетъ лѣчено возбуждающими средствами и членъ не будетъ сохраненъ въ покой, то воспаленіе переходитъ въ хроническое, которое можетъ продолжаться нѣсколько лѣтъ.

4-й періодъ. *Жировидное измѣненіе бѣлыхъ воспаленныхъ частей.* Хроническое воспаленіе, поддерживаемое неправильнымъ лѣченіемъ, либо движеніемъ члена, постепенно распространяется на кляпчатую плеву, синовиальныя сумочки, надкостную плеву и на самыя кости и наконецъ образуется бѣлая опухоль соспава.

Лѣченіе

Въ 1-мъ періодъ а) *Покой* составляетъ первое и необходимое условіе, безъ котораго всѣ прочія средства останутся недействительными. б) *Холодные разбивающія примотки.* Таковыми почтиаеетъ сочинитель всѣ средства,

имѣющія способность уменьшать температуру частей, какъ то: снѣгъ, холодная ванна проч. Последняя однако, по мнѣнію сочинителя, можетъ имѣть худыя послѣдствія, чрезъ воспалительное противодѣйствіе, слѣдующее за ея употребленіемъ. Для отвращенія таковыхъ послѣдствій онъ совѣдуетъ температуру воды постепенно уменьшать до надлежащей степени, и потомъ ее опять непримѣнно возвышать, такъ чтобы при выходѣ изъ ванны вода имѣла температуру тѣла. в). *Стягивающія разбивающія средства.* Писатели приводятъ ихъ множеству; но Г-ну Пеллетье извѣстно только одно, дѣйствительно оказывающее хорошее дѣйствіе; это есть извѣстная Гулардова вода. г) *Разбивающія возбуждающія средства.* Алкоголь составляетъ основаніе почти всѣхъ сихъ средствъ; таковыя суть: камфорный и мыльный спиртъ, наспойка хины, опodelдокъ, бальзамъ Фіораванпи и проч. Сочинитель отвергаетъ всѣ сіи средства, какъ благопріятствующія развитію воспаления. д) *Прижатіе.* Сіе средство нѣкопорые предлагали для отвращенія опухоли; но оно, по наблюденіямъ Г-на Пеллетье, не удовлетворя-

есть шаковому намѣренію и даже можетъ возбудить худые припадки; припомъ уже одна боль, всегда сопряженная съ прижапіемъ повихнурыхъ часпей; скоро принуждаетъ оставить сіе средство. е) *Наркотическія средства* весьма соотвѣшствуютъ въ первыхъ минутахъ; они унимають боль и препятствуютъ распространенію воспаления. Опваръ опія или садоваго маку и наливка шафрану суть самыя лучшія сего рода средства. ж) *Мѣстныя испражненія крови*. Они нужны только при значительной опухоли у молодыхъ, крѣпкихъ людей, лимфатическаго или сангвиническаго темперамента. Въ такихъ случаяхъ пиявки нужно припускать въ большемъ количествѣ (по крайней мѣрѣ 40), въ распояніи на три или четыре дюйма отъ поврежденнаго мѣста. Если онъ будетъ припущенъ къ самому спраждающему мѣсту, то раздраженіе, причиняемое ихъ угрызеніемъ, присоединяется къ раздраженію отъ распяженія, отъ чего не только опухоль иногда чрезвычайно увеличивается, но и воспаление обнаруживается съ болъшею силою. з) *Слѣдующія припарки, примотки, ванны, паръ и прот.* Сія средства, употребленные послѣ

*

мѣспнаго испражненія крови, всегда оказываютъ полезное дѣйствіе. Упопребленныя прежде испражненія крови и весьма горячія, онѣ иногда увеличиваютъ опухоль, благопріятствуютъ развитію воспаленія и усиливаютъ боль.

Во 2-мъ періодѣ. Въ семь періодѣ помогаютъ средства только одного класса, исключительно противовоспалительныя: повпorenное припущеніе пѣвиць, смягчающія, наркотическія припарки. Припомѣ больной долженъ соблюдать легкую, умѣренную діету и воздерживаться отъ всего того, что можетъ раздражить желудокъ и кишки.

Въ 3-мъ періодѣ лѣченіе должно быть такое же, какъ и во впоромѣ, только измѣненное по состоянію воспаленія. Когда воспалительная дѣятельность совсѣмъ прошла и остается только пѣсповавшая припухлость, что можно съ пользою упопребить разбивающія средства, какъ то: сѣрныя ванны, кацельныя ванны изъ сѣрной воды, впиранія рнушной мази съ камфорою и умѣренное движеніе, причемъ составъ надлежитъ поддерживать повязкою, либо, если поврежденіе слу-

чипся на ногѣ, посредствомъ особеннаго сапога.

Въ 4-мъ періодѣ предложено множество средствъ, на прим: всѣ раздражающія кожу и разспроивающія клѣпчатую плеву, каковы суть: припарки съ амміакомъ, раздражающія вширанія, нарывающіе пластыри, прижиганіе, заволоки и проч.; но опъ сихъ средствъ не лзя не опасаться, чтобы произведенное ими раздраженіе не возбудило воспаленія въ соспавѣ и не ускорило органическаго разспройства, которое, можетъ быть, оспановилось въ своемъ ходѣ. Посему гораздо лучше, пока еще есть надежда къ исцѣленію, продолжатъ лѣченіе, какое показано въ прешьемъ періодѣ, измѣняя оное по обстоятельствомъ. Если плаковое лѣченіе оспанется бесполезнымъ, то болѣзнь можно почишатъ неизлѣчимою. Органическое разспроеніе усиливается, появляется нагноеніе, неизлѣчимые свищи и больной скоро и неизбѣжно приближается ко гробу, если опъяпіемъ члена заблаговременно не будутъ положены предѣлы болѣзни.

Опъяпіе слѣдуетъ предпринимать, когда болѣзнь произошла опъ мѣснаго поврежденія: ушиба, раненія, распяженія связокъ

состоява, когда болѣзнь не сопровождается лихорадкою, поносомъ или ночнымъ попомъ и наконецъ когда органы пищеваренія и дыханія находяпся въ хорошемъ состояніи. При прошивныхъ условіяхъ не льзя ожидать хорошаго успѣха отъ операціи.

VII.

С М Ъ С Ь.

1. Къ *Анатомии* *общихъ покрововъ*.

Уже *Готье* и *Дютроже* принимали шессть слоевъ въ *общихъ покровахъ*; *Андралъ*, сынъ, доказалъ это въ патологическомъ состояніи (при elephantiasis). Первый слой составляетъ corium, второй corpus papillare, третій, наружный слой corporis papillaris, четвертый цвѣтный, при разсмаприваніи сверху, сѣпеобразный слой, пятый роговидный и шестой кожа.

Medicin. Chirurg. Zeitung. 1828. Bd. 1.
стр. 183.

2. Рвотный камень какъ *противолихорадочное средство*.

Пейсонъ растворяетъ грань рвотнаго камня (tartaras stibii et potassae) въ осьми унціяхъ перегнанной воды и прибавляетъ ун-

цію зугупі diacadii, полунціи Аравійской каме-
ди и сполько же воды померанцовыхъ цвѣ-
повъ, и велишь упопреляшь во время пе-
ремежки: первой часъ одну ложку, впорой
двѣ, прешій при и такъ далѣе до упопреле-
ненія пищи. Средство сіе было испытано
съ пользою, кромѣ другихъ, и въ Испаніи Док-
торомъ *Валецолъ*, живущимъ въ такомъ мѣ-
стѣ, гдѣ лихорадки господствуютъ эндемиче-
ски. Въ простой прешедневной лихорадкѣ *Ва-
лецъ* даетъ, также во время перемежки, рас-
творъ чепырехъ гранъ морфія (Morph) и двухъ
гранъ рвопнаго камня въ кварпѣ (quartier)
опвара померанцовой корки, съ прибавленіемъ
ароматныхъ веществъ и сахара, начиная съ
одной споловой ложки и полпомъ чрезъ часъ
или два прибавляя по ложкѣ. Припомъ онъ
упопрелялъ и мазь, изъ скрупула рвопнаго
камня съ ложкою воды и унціею свиннаго
сала пригоповленную. Онъ велѣлъ впирашь
скрупулъ до полдрахмы сей мази, до пѣхъ
поръ, пока высохнешъ, чрезъ при или чепы-
ре часа, попеременно въ плеча, спину, брю-
хо, поясницу, бедра. Впираніе было прекра-
щаемо, коль скоро появлялись признаки вос-
паленія желудка или кишекъ (въ смыслѣ

Французской Физиологической Медицины). Одни впиранія скорѣе прерывають лихорадку, нежели распворъ; но за то она чаще возвращается. Иногда одно или два впиранія уже прерывали приступъ. *Мондецъ* совѣщаетъ сперва впираеть одну драхму мази, попомъ два раза по два скрупула, а слѣдующіе разы по одному скрупулу, и если первыя впиранія недоспапчны для прерванія болѣзни, то повторишь оныя въ другой разъ. Сіе средство, равно какъ и распворъ, имѣеть еще ту выгоду, что по прекращеніи лихорадки возбуждаеть или поддерживаеть попь. Въ случаяхъ, пребующихъ скорой помощи, *Валлецъ* сперва впираеть мазь, а попомъ употребляетъ обспоятельспвамъ соопвѣпствующія средства.

Magazin der Heilkunde; von Gerson. 10 er
Bd. стр. 153.

3. Дешевѣйшій способъ приготовить моксы.

Унцію селиспры распворишь въ шпофъ воды и распворомъ симъ напишаешь чистую вапу, которую, высушивъ, раздѣлишь на маленькіе кусочки и завернуешь въ бумажныя шрубочки, въ дюймъ длины и полдюйма ширины. Такимъ образомъ пригопвленныя мок-

сы горятъ медленно и поспепенно, если только будутъ содержимы въ сухоспи.

4. *Ворвань (?) Oleum jecinoris azelli.*

Средство сіе уже прежде было похваляемо какъ весьма полезное въ подагрѣ и застарѣломъ ревматизмѣ (*Персиваль, Малакарне, Консбурхъ*); новѣйшія наблюденія подтверждаютъ его дѣйствительность какъ въ сихъ болѣзняхъ, такъ и въ разныхъ видахъ золотухи и Англійской болѣзни (*rachitis*). Взрослымъ его даютъ по столовой, а дѣтямъ, смотря по возрасту, по чайной или по десертной ложкѣ, два раза въ день. Взрослые могутъ запивать горькимъ виномъ (*crematum amatum*), либо хорошимъ винограднымъ, а дѣтямъ, по причинѣ непріятнаго вкуса и запаха, нужно давать съ сиропомъ или медомъ. Голландскій Врачъ а *Роа* увѣряетъ, что дѣти, даже маленькіе, принимаютъ его само по себѣ. Употребленіе должно быть продолжительно, на прим: въ золотухѣ съ костоюдою надобно принимать его нѣсколько мѣсяцовъ. *Horn's Archiv für med. Erfahrung. 1824. Julius, August.*

Magazin der Heilkunde, von Gerson. 1828.

September. October.

5. Ялаппа какъ слабительное.

Извѣстный Дармштадтскій Докторъ Ведекиндо говоритъ о семъ споль употребительномъ средствѣ слѣдующее:

Поелику сабуръ (алое) слабитъ не прежде, какъ чрезъ десять часовъ, поелику Врачъ, прописывая слабительное, не всегда имѣетъ намѣреніе въ особенноти дѣйствовать на печень и увеличить ея отдѣленіе, и поелику геморроидальные и другіе припадки часто не позволяють употребить сабуръ для преодоленія привычнаго запора на низъ: по я вознамѣрился испытать надъ собою и надъ многими другими въ шакомъ случаѣ смолу ялаппы слѣдующимъ способомъ. Rec. Resinae jalappæ drachm. β. saponis med. drachm. jβ. amygdal. dulc. drachm. jj. m. exactiss. terendo, f. pil. gr. jj. Приемъ: отъ одной до двенадцати, поутру. Для меня довольно одной пилюли, для другихъ же большею частію поребно пять пилюль. Дѣйствіе оказывается чрезъ полтора или два часа; испражненіе бываетъ обыкновенное, только жиже и не имѣетъ особеннаго запаха, какъ послѣ алое, совершается безъ значительной боли и послѣ не ослабѣса никакого раздраженія. Вскорѣ по приня-

пѣи чувспвуется усиленное движеніе желудка, иногда съ легкою, скоропроходящею пошшою ; попомъ можно чувспвовать поспепенное увеличеніе дѣяпельности пошкихъ кишекъ, до начала пошпыхъ, гдѣ чувспвованіе сіе на нѣсколько времени оспанавливается. Наконецъ движеніе проходитъ пошпую кишку и переходитъ въ побужденіе къ испражненію.

Сіи явленія показываютъ явспвенно, что лаппа (корень дѣйспвуетъ пакже, какъ и смола) слабитъ, увеличивая движеніе всего кишечнаго канала и ошдѣленіе влагъ въ ономъ. Она соспавляетъ превосходное средство прошивъ привычнаго запора на низъ въ шѣхъ случахъ, въ коихъ онъ зависитъ ошъ недоспачнаго движенія пошкихъ кишекъ и слѣпой кишки.

Hufeland's Journal. 1828. Julius.

6. *Корка гранатоваго дерева противъ плоскихъ глистовъ.*

Корка корня гранатоваго дерева (cortex radicis punicae granati) уже съ давнихъ временъ употреблялась въ Восточной Индіи прошивъ плоскихъ глисповъ. Въ Европѣ она

сдѣлалась извѣстною въ семь отношеніи чрезъ Англійскаго Хирурга *Буханана*, долго жившаго въ Бенгалѣ. Послѣ того писалъ объ ней Англіійскій же Хирургъ *Бретонъ*, съ присоединеніемъ исторій болѣзней. Въ 1822-мъ году Португальскій Лейбъ-Медикъ *Б. А. Голлезъ*, коему наипаче обязаны мы опкрытіемъ солей хины, издалъ также небольшое о семь средствѣ сочиненьице, изъ коего представляется слѣдующее извлеченіе.

Г. Голлезъ бралъ двѣ унціи свѣжей корки, варилъ въ одномъ фунтѣ съ половиною воды до одного фунта (*Бретонъ* уваривалъ до половины) и давалъ сей опваръ больнымъ поуспру, на пощакъ, всякіе полчаса по двѣ или по три унціи. Иногда послѣ двухъ или трехъ приемовъ появляея пошнота, рвота, поносъ и проч., и тогда оспалокъ лучше оспавишь до 3-хъ часовъ послѣ обѣда. Если опъ одного фунта опвара, приняшаго такимъ образомъ, глиста не выйдеть въ печеніи дня, то лѣкарство повспоришь на другой день. Рѣдко глиста сопротивляея сему средству долѣе двоихъ сутокъ; если же это случится и больной чувспвуетъ пошноту и опвра-

щеніе къ лѣкарству, по лучше употребленіе оставить до другаго времени.

За недоспапкомъ свѣжей корки можно употреблять сухую, которая, по наблюденіямъ *Бретона*, еще сильнѣе свѣжей, такъ что двѣ унціи сухой корки въ дѣйствіи равняются премъ унціямъ сырой. *Бретонъ* давалъ корку и въ порошокъ, опъ 10-ти до 48-ми гранъ, съ водою; въ чепырехъ случаяхъ съ хорошимъ успѣхомъ; но *Гомезъ* въ одномъ случаѣ не видѣлъ опъ порошка такого дѣйствія. Послѣдній совѣтуесть давань его людемъ, немогущимъ принимавъ опвара и склоннымъ къ поносу, въ пилюляхъ съ оплапками и водою. Онъ также совѣтуесть, если глиста висипъ въ заднемъ проходѣ, послѣ пилюль изъ сей корки, давань слабительное, на примъ изъ ялаппы или каспороваго масла.

По наблюденіямъ Г-на *Гомеза* самое удобнѣйшее время для употребленія корки естъ то, когда выходятъ такъ названные задніе члены глисты; въ сіе время онъ почти всегда выгонялъ ее въ продолженіи супокъ или двохъ. Если же глиста вышла не вся, то дальнѣйшее употребленіе лѣкарства въ топъ разъ будетъ бесполезно, а надлежитъ обождасть,

пока снова начнутъ выходитьъ куски оной сами собою. Явленіе сіе объясняютъ онъ шѣмъ, что выходящіе задніе куски глисты суть старѣйшіе и отдѣляются опъ нее либо какъ совсѣмъ созрѣвшіе, или для размноженія рода. Сіе случается въ то время, когда больные наиболѣе претерпѣваютъ безпокойства опъ глистовъ.

Живые куски глисты, брошенные въ отваръ, оптвердѣвали, сжимались, искривлялись и скоро умирали, чего другія противуглистныя средства, даже скипидарный спиртъ, не производятъ.

Magazin der Heilkunde, von Gerson. Bd. 6.
стр. 427.

7. *Водяная позвоночнаго столба, излѣченная прокалываніемъ.*

Одна женщина принесла къ Профессору Бугжери, въ Падуѣ, двухлѣтняго младенца, у котораго опнялись ноги. При изслѣдованіи найдено раздвоеніе спиннаго столба въ поясницѣ; опухоль была прозрачная, зыблющаяся и болѣла при прижатіи. Матери совѣтовали ничего болѣе не предпринимать, какъ только защищать опухоль опъ наружныхъ

насилій. Нѣсколько времени спустя, женщина сія принесла своего ребенка къ Доктору *Бозетти* и сказала, что взрослая дочь ея, нося малюпку, нечаянно повредила опухоль, отъ чего выпекло много свѣплой жидкости, безъ всякаго послѣдствія. Опухоль была слабая. Докторъ *Бозетти* наложилъ легко сжимающую повязку; чрезъ нѣсколько дней опухоль опять сдѣлалась напряженною, хотя менѣе чѣмъ прежде. Руководствуясь слѣдствіемъ случайнаго поврежденія опухоли, *Бозетти* прокололъ ее иглою и выпустилъ не такъ много и менѣе чѣмъ прежде свѣплой жидкости. На другой день появилось легкое воспаленіе опухоли, отъ котораго покровы соединились съ низлежащими частями. Чрезъ нѣсколько времени нужно было еще разъ проколоть опухоль; только въ сей разъ истекала уже не водянистая, а густоватая жидкость (*lymph plastic* ?). При умѣренномъ прижиманіи, части постепенно укрѣплялись, такъ что черезъ годъ раздвоенное мѣсто позвоночнаго столба наполнилось хрящеватымъ веществомъ и дѣтя опять начало дѣйствовать нижними конечностями. Надъ

симъ мѣспомъ приложена свинцовая бляшка, укрѣпленная повязкою.

Послѣ того Докшоръ *Безетти* лѣчилъ еще одно дитя тѣмъ же способомъ и также съ хорошимъ успѣхомъ

Magazin der Heilkunde, von Gerfon. Sept.
Octob. 1828.

14. Превратное положеніе внутренностей.

При вскрытіи тѣла одной дѣвочки, чепырехъ съ половиною лѣтъ, умершей послѣ коклюша, найдено, кромѣ разстройства легкихъ и водяной окологердечія, слѣдующее положеніе грудныхъ и брюшныхъ внутренностей.

Правое легкое состояло изъ двухъ, а лѣвое изъ трехъ долей. Сердце хопя лежало на лѣвой сторонѣ, но ближе обыкновеннаго къ срединѣ тѣла, было здоровое; aorta thoracica лежала на правой сторонѣ позвоночнаго столба, и нисходя поспешенно приближались къ его срединѣ.

Пищепріемное горло проходило сквозь грудобрюшную преграду на правой сторонѣ; дно желудка и селезенка лежали въ правомъ подреберѣ. Большая доля печени лежала впра-

во, а малая вѣво. S гоманит находилось на мѣстѣ слѣпой и восходящей части ободочной кишки, гдѣ начиналась и прямая кишка. Впрочемъ брюшныя внутренности были въ здоровомъ состояніи. Почки, мочевой пузырь, малка и проч. были въ обыкновенномъ положеніи и не представляли ничего болѣзненного.

Дѣвочка сія, до опнятія опѣ груди, на десятомъ мѣсяцѣ, была вялопучная (fat flabby) и до прешьяго года довольно здоровая; на прешьемъ году спрадала кашлемъ, съ труднымъ дыханіемъ, и была лѣчиима пѣвками, шпанскими мушками и проч. Послѣ сего была опять здорова до Ноября 1827, когда занемогла коклюшемъ; умерла 6-го Февраля 1828.

Edinb. Med. and Surg. Journal. vol. 29.

15. *Настойка опія противъ полиповъ.*

Г. Геибереѣ, въ Христіаніи, съ пользою употребилъ настойку опія (tinctura opii simplex) при полипѣ въ ухѣ. Хирургическое удаленіе полипа былобы затруднительно и опасно; почему онъ рѣшился испытать дѣйствіе сего средства, прикладывая оное по-

средствомъ хлопчатой бумаги, такъ что она со всѣхъ сторонъ окружала полипа, и была безпрестанно содержана влажною. Черезъ недѣлю наростъ значительно уменьшился, а чрезъ три недѣли совсѣмъ исчезъ и слухъ возстановился.

Докторъ Райнеръ также похвалялъ настойку опія для уничтоженія полиповъ, (Mediz chir. Zeitung. 1821. Bd. 3 стр. 60). Magazin der Heilkunde, v. Gerson. Sept October. 1828.

16. *Лѣченіе нароста, называемаго lupus.*

Г. Ки (Key) въ печеніи чепырехъ недѣль излѣчилъ паковой наростъ, на крылѣ носа, у женщины двадцати лѣтъ, впрочемъ здоровой, слѣдующимъ средствомъ.

Rp. Unqv. mercur. $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$, camphoræ $\mathfrak{z}\text{j}$,
Spirit. terebinth. $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$. Adipis suillæ $\mathfrak{z}\text{ij}\beta$,
m. f. linimentum.

Мазь должна лежать безпрестанно. Внутрь больная принимала, при раза въ день, по скрупулу углекислаго желѣза.

тамъ же.

✱

17. Способъ оживлять новорожденныхъ младенцовъ. Доктора Блунделла.*

Чрезъ вдунаніе воздуха въ ротъ младенца, обыкновеннымъ способомъ, нельзя наполнить легкихъ воздухомъ столько, сколько нужно для произведенія искусственнаго дыханія, даже хотябы опверстіе горшани было опкрыто, въ ротъ младенца введеннымъ перстомъ, и пищепріемное горло заперто чрезъ прижатіе дыхательнаго горла къ оному. Наполнить легкія воздухомъ до такой степени можно не иначе, какъ чрезъ маленькую прубочку, копорую, по моему мнѣнію, всякій акушеръ, идущій къ роженицѣ, долженъ имѣть съ собою. Трубочка сія дѣлается изъ серебра и вкладывается въ дыхательное горло младенца. Конецъ ея долженъ быть тупой, какъ у капешера, а по обоимъ бокамъ она должна имѣть продолговатыя, широкія опверстія, для свободнаго входа и выхода воздуха и слизи. Таковое устройство прубочки я предпочитаю всякому другому попому, что она не повредитъ нѣжной перепонки дыхательнаго горла. Трубочку я вкладываю слѣдующимъ способомъ. Я ввожу указательный перстъ

лѣвой руки до корня языка и въ горшанную
 прещину; беру прубочку въ правую руку,
 провожу ее, по вложенному въ ротъ перстну,
 до горшанной прещины и вкладываю въ
 оную, въ тоже самое время вынимаю перстъ
 изъ прещины. Послѣ сего изслѣдываю, по-
 пала ли прубочки въ горшанъ, а не въ пи-
 щепріемное горло. Когда прубочка находи-
 ся въ горшанѣ, то я беру младенца на руки,
 вдуваю ему въ легкія воздухъ и выгоняю
 его опшуда, сжимая рукою грудь и брюшко
 младенца. Сими способомъ лучше всего мо-
 жно произвести искусственное дыханіе. Про-
 долживъ искусственное дыханіе нѣсколько
 минуць, надобно осмопрѣть младенца и по-
 шупать пуповину, неокazujeаетъ ли она бі-
 енія? Изслѣдывать пуповину нужно близь са-
 маго брюшка; ибо иногда здѣсь замѣчается
 біеніе, на дюймъ далѣе совсѣмъ непримѣльное,
 пошому что артеріи такъ сжались, что въ
 нихъ неможесть проникнуть кровь. Нужно
 также осмапривать грудь, спорону сердца,
 лице, губы, не показывають ли онѣ призна-
 ковь жизни? замѣпивъ сіи признаки, нужно
 не много обождасть; пупъ младенець часпо
 самъ дѣлаетъ усиліе къ дыханію. Глубокій

вдохъ составляетъ первое движеніе дыханія. Спустя 20-30 секундъ слѣдуетъ другое движеніе дыханія. Когда сердце и пуповина начнутъ биться и дыханіе совершается чаще: то трубочка болѣе не нужна. Если же біеніе пуповины прекратится и непримѣнно никакого вдоха, то опять нужно начать искусственное дыханіе, и повторять сіи опыты столько разъ, сколько нужно, то предоставляя совершать дыханіе силамъ младенца, то производя оное искусственно.

Froriep's Notizen. Bd. xx, стр. 206.

VIII

ОФИЦІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ СЪ 1-ГО ІЮЛЯ ПО 1-Е СЕНТЯБРЯ 1899 ГОДА.

1-е. *Опредѣленіе Медицинскихъ чиновниковъ на высшія мѣста.*

Корпусными Штабъ-Докторами въ 6-й пѣхотный корпусъ, Дивизіонный Докторъ Бугскій Уланской Дивизіи, Коллежскій Совѣтникъ Гофманъ. *Дивизіонными Докторами*: во 2-ю Гренадерскую Дивизію, старшій Лѣкаръ Гренадерскаго Наслѣднаго Принца Прусскаго полка, Докторъ Коллежскій Ассесоръ Соколовскій; въ пѣхотныя Дивизіи: въ 8-ю, старшій Лѣкаръ 4-го Піонернаго баталіона, Штабъ-Лѣкаръ Надворный Совѣтникъ Фирсовъ, въ 4-ю, старшій Лѣкаръ 27 Егерскаго полка, Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Прозоровскій; въ 18-ю, старшій Лѣкаръ

35-го Егерьскаго полка, Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассессоръ Черкуновъ; въ 19-ю, старшій Лѣкаръ 38-го Егерьскаго полка, Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассессоръ Саговскій; въ Бугскую Уланскую Дивизію, старшій Лѣкаръ Селегинскаго пѣхошнаго полка, Штабъ - Лѣкаръ Коллежскій Ассессоръ Масальскій. *Старшими Медикомъ*: во 2-ю Кирасирскую Дивизію, Штабъ-Лѣкаръ Конноартиллерійской Но. 11 роты Коллежскій Ассессоръ Григоровичъ. *Старшими Лѣкарями*: въ 24-ю Артиллерійскую бригаду, Штабъ-Лѣкаръ Липовскаго піонернаго баталіона Краниковскій, въ Гренадерскій наслѣднаго Принца Прусскаго полка, Ординапоръ Новгородскаго Военнаго Госпиталя Штабъ-Лѣкаръ Вележевъ; въ Тульскій пѣхошный полкъ, Ординапоръ Рижской Военнаго Госпиталя Штабъ-Лѣкаръ Шуйскій; въ Вологодскій пѣхошный полкъ, Штабъ-Лѣкаръ 8-го Егерьскаго полка Буповскій; въ Бѣлевскій пѣхошный полкъ, Штабъ-Лѣкаръ Казанскаго Драгунскаго полка Левицкій.

2 Вновь поступившіе въ службу.

Изъ Санктпетербургской ИМПЕРАТОРСКОЙ Медико Хирургической Академіи Лѣка-

кари 2-го отдѣленія: Александръ Алексѣевъ, Александръ Гагель и 3-го отдѣленія Пётръ Глажевскій во 2-ю армию сверхъ комплекта. Изъ *Московского Отдѣленія*: Лѣкаръ 1-го, Федоръ Руанепъ во 2-ю армию сверхъ комплекта; Докторъ Медицины Степанъ Заводскій прикомандированъ къ лазарету Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полка; Лѣкаръ 2-го отдѣленія Прокофій Щеголевъ въ 3-й баталіонъ Владимірскаго пѣхотнаго полка. Изъ *Московского Университета*: Докторъ Медицины Иванъ Бѣлоусовъ; Лѣкари: 1-го отдѣленія Иванъ Васильевъ, Михайло Волковъ, Александръ Коропневъ, Василій Спарковъ, Николай Пётровъ, Василій Юшеновъ, Иванъ Лосевъ, Николай Филевскій, 2-го отдѣленія Ардаліонъ Курганскій и Павелъ Паціансовъ во 2-ю армию сверхъ комплекта; Владиміръ Апаназевичъ въ Архангелогородскій пѣхотный полкъ, 1-го отдѣленія Александръ Венсовичъ во 2-ю армию сверхъ комплекта, 2-го отдѣленія: Иванъ Розовъ въ Бѣлозерскій пѣхотный полкъ. Изъ *Казанскаго Университета*: Лѣкаръ 2-го отдѣленія Ливановъ во 2-ю армию сверхъ комплекта. Изъ *Харьковскаго Университета*: Лѣкари: 3-го отдѣленія Сте-

панъ Мигринъ, 2-го отдѣленія Яковъ Мѣд-
 новъ, 3-го отдѣленія Савва Гринъ во 2-ю
 армію сверхъ комплекта, 1-го отдѣленія:
 Иванъ Видинскій, Василій Непорожній и
 Иванъ Веребрюсовъ въ Одесскій Военный
 Госпиталь. Изъ *Вилenskaго Университета*:
 Докторъ Медицины Марцелій Малевичъ въ
 польскій Уланскій полкъ; Лѣкари 1-го отдѣ-
 ленія: Антонъ Милаховскій въ Капорскій пѣ-
 хошный полкъ, Осипъ Вадовскій въ Гусар-
 скій Генерала Графа Вишгешпейна полкъ,
 Маршынъ Спемпинскій въ Симбирскій пѣхош-
 ный полкъ; Доминикъ Федерлей въ 17 Егерь-
 скій полкъ, Ушинъ Сондецкій въ Казанскій
 пѣхошный полкъ; 2-го отдѣленія: Александръ
 Спаневичъ въ Сѣвскій пѣхошный полкъ; Ви-
 талисъ Каминскій въ 22-й Егерскій полкъ;
 3-го отдѣленія Францискъ Спанкевичъ въ
 Вишебскій пѣхошный полкъ, Осипъ Пепра-
 шкевичъ въ Селенгинскій пѣхошный полкъ.
 Веперинарные лѣкари: Ушинъ Мацѣевскій,
 Доминикъ Маковскій, Адамъ Орловскій, Мап-
 вей Смельскій, Антонъ Шпейнбергъ, Люд-
 вигъ Іозефовичъ, Павелъ Зборомирскій, Рай-
 мундъ Пепплингъ, Варфоломей Мордисъ и Ве-
 перинарный помощникъ 1-го отдѣленія Ка-

зимиръ Шашко во 2-ю армію сверхъ комплекта. *Изъ Отставныхъ*: Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассессоръ Федоръ Быковъ въ Фридригамскій Военный Госпиталь Ординапоромъ; Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Совѣтникъ Борись Цагель въ Санкшпетербургскій Сухопутный Госпиталь Ординапоромъ; Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Совѣтникъ Шпиндлеръ Дивизионнымъ Докпоромъ въ 13-ю пѣхотную Дивизию. *Изъ Вольнопрактикующихъ*: Иноспранный Докпоръ Медицины Николай Юденгозеръ въ Краіовскій Военно-временный Госпиталь Ординапоромъ; Иноспранные Докпоры Медицины и Хирургіи: Адольфъ Шмейсеръ и Максимиліанъ Гейне, лѣкари: Павелъ Тихомировъ и Дмипрій Милохоровъ во 2-ю армію сверхъ комплекта; Штабъ-Лѣкаръ Николай Смирновъ пудаже; Лѣкаръ Михайло Лопанинъ въ Санкшпетербургскій Сухопутный Госпиталь Ординапоромъ.

3. Производство въ чины званія.

Въ Штабъ-Лѣкари: Лѣкаръ 25-й Артиллерійской бригады Каменскій.

4. Награды.

За отлично-усердную службу Всемилошп-
вѣйше награждены *тинами Дѣйствительна-
го Статскаго Совѣтника*: Штабъ-Докторъ
Гвардейскаго Корпуса Штабскій Совѣтникъ
Бупиковъ; *Надворнаго Совѣтника* и прибав-
кою къ получаемому жалованью по 1000 ру-
блей въ годъ, Штабъ-Лѣкаръ Лейбъ-Гвардіи
Преображенскаго полка Коллежскій Ассессоръ
Енохинъ; *Коллежскаго Ассессора*: Ординаторъ
Варшавскаго Гвардейскаго Военно-Россійска-
го Госпиталѣ Штабъ - Лѣкаръ Савиновъ;
Уфимскаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкаръ
Блюсь; старшій Лѣкаръ Гельсингфорскаго Во-
еннаго Госпиталѣ Штабъ-Лѣкаръ Зольцманъ
и Ординаторъ Ольскаго Военнаго Госпиталѣ
Штабъ-Лѣкаръ Уланскій. *Орденами*: Св. Вла-
димира 3-й Степени: старшій Докторъ Ар-
тиллерійскаго Госпиталѣ Докторъ Медицины
и Хирургіи Штабскій Совѣтникъ Канель-
скій; тогоже *Ордена* 4-й степени: Ордина-
торъ Казанскаго Военнаго Госпиталѣ Штабъ-
Лѣкаръ Штабскій Совѣтникъ Рейхъ; Св.
Анны 2-й степени Императорскою короною
украшеннымъ, Старшій Докторъ С. Петер-
бургскаго Сухопутнаго Госпиталѣ Докторъ

Медицины и Хирургіи Штабскій Совѣтникъ Гиглеръ, пойдже степени безъ Императорской Короны: старшій Лѣкаръ Казанскаго Военнаго Госпиталѣя Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Совѣтникъ Андрѣевскій; 3-й степени: Лѣкаръ Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полка Смирновъ и 37-го Егерскаго полка Паньковскій. *Подарками:* Штабъ-Лѣкари: старшій Лѣкаръ 1-го учебнаго Карабинернаго полка Коллежскій Совѣтникъ Эльканъ; Ярославскаго пѣхопнаго полка Грузовъ, 26-го Егерскаго полка Вигилянскій, 29 Егерскаго полка Микуловскій, 30-го Егерскаго полка Зенкинъ; Тверскаго Драгунскаго полка Таваспъ, линейныхъ Сибирскихъ баталіоновъ No 13 и 14 Надворный Совѣтникъ Хоппенгауеръ, N. 11. Гленъ и Сибирскихъ Штапныхъ командъ Воскресенскій; Ветеринарные Лѣкари: Лимаревскаго Военно-конскаго завода Ивановъ и Лейбъ-Гвардіи Кирасирскаго полка Федулѣвъ. *Званіемъ Штабъ-Лѣкаря:* 6-й Артиллерійской бригады Лѣкаръ Боровскій и 34 Егерскаго полка лѣкаръ Орловъ.

5. Умершіе:

Ординапоры Военныхъ Госпиталей: Херсонскаго Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Совѣт-

никъ Постниковъ; С. Петербургскаго Сухо-
путнаго Госпиталѣ Шпабъ-Лѣкаръ Черняв-
скій; Букареспскаго Шпабъ-Лѣкаръ Савчен-
ковъ; Тульчинскаго Лѣкаръ Флоровъ; Браилов-
скаго Лѣкари Тимковскій и Чернявскій; Ба-
заржикскаго Лѣкаръ Крупскій; Моздокскаго Лѣ-
каръ Колоколовъ; Бузевскаго Докторъ Меди-
цины Фонъ Тиденъ; Варнскаго Докторъ Ме-
дицины Тоджіо, Лѣкари: Сальмановичъ и Гу-
баревъ; Архангельскаго Шпабъ-Лѣкаръ Клен-
ковъ; Севастопольскаго Шпабъ-Лѣкаръ Иня-
кинъ; Вознесенскаго Шпабъ-Лѣкаръ Пепровъ;
Ясскаго Шпабъ-Лѣкаръ Надворный Совѣт-
никъ Опшо Леманъ: Налицкаго Лѣкари: Тол-
мачевъ, Борнапный и Кржиминскій; Дина-
бургскаго Лѣкаръ Гельманъ; Рижскаго Шпабъ-
Лѣкаръ Коллежскій Совѣтникъ Насвѣповъ;
Слободзейскаго Лѣкари: Розовъ и Воскресен-
скій; Каларашскаго Лѣкари: Броизовъ и Бог-
дановскій; Бырлапскаго Лѣкаръ Куржинскій;
Айдосскаго старшій Лѣкаръ Докторъ Меди-
цины Леони и Ординапоръ Лѣкаръ Кодзь;
Измаильскаго старшій Лѣкаръ Шпабъ-Лѣкаръ
Надворный Совѣтникъ Михаловскій и Ор-
динапоръ Лѣкаръ Величко; Бѣльцкаго стар-
шій Лѣкаръ Шпабъ-Лѣкаръ Козловскій; Лѣ-

кари полковъ 32-го Егерскаго Семеновскій, 20-го Егерскаго Князевъ; Терскаго Казачьяго полка Николаевъ; состоявшій въ Опдѣльномъ Кавказскомъ Корпусѣ Соловьевъ; Уфимскаго пѣхотнаго полка Архангельскій; 22-го Егерскаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Янчуковскій, Гусарскаго Графа Випгенштейна полка Шпабъ-Лѣкаръ Корсакевичъ; 35-го Егерскаго полка Лѣкаръ Голиковъ; Сѣвскаго пѣхотнаго полка Шпабъ - Лѣкаръ Макаренко; Тифлискаго пѣхотнаго полка Лѣкаръ Неплоховъ; Дивизионный Докторъ 10-го пѣхотной Дивизіи Спалскій Совѣтникъ Андрѣевскій; пѣхотнаго Герцога Веллингтона полка Шпабъ-Лѣкаръ Селинь; Конно-Артиллерійской Н. 19-й роты Шпабъ-Лѣкаръ Миловзоровъ; 21-го Егерскаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Турбинъ; Лейбъ-Гвардіи Коннаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Якубовскій, Полтавскаго пѣхотнаго полка Лѣкаръ Волковъ; Каманскаго Гарнизоннаго полка Лѣкаръ Ивановъ; Войска Донскаго старшій Лѣкаръ Шпабъ-Лѣкаръ Бушманъ; 42-го Егерскаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Бубликовъ; Одесскаго пѣхотнаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Денничевскій; Конно - Ар-

пиллерійской Н. 6-й роты Лѣкаръ Чебопаревъ; 19 Егерьскаго полка Лѣкаръ Ненсбергъ; Дерптскаго Конно-Егерьскаго полка Лѣкаръ Поповъ; 7-го Піонернаго баталіона Лѣкаръ Авицкій; поселеннаго Гренадерскаго Его Величества Императора Австрійскаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Чикаревскій; Лейбъ-Гвардіи Егерьскаго полка Лѣкаръ Пешрашевскій; Лейбъ-Гвардіи Драгунскаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассессоръ Соловьевъ; подвижнаго Магазина Лѣкаръ Разумовскій; 4-го Бугскаго Уланскаго полка Лѣкаръ Поповъ; Азовскаго пѣхошнаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Назарьевъ; 3-го баталіона Одесскаго пѣхошнаго полка Лѣкаръ Сполповскій; Иркутскаго Гусарскаго полка Лѣкаръ Гассень-Миллеръ, и вешеринарный Лѣкаръ Каргапольскаго Драгунскаго полка Филашовъ.

ЛУЧШИЯ ИЗЪ НОВѢЙШИХЪ МЕДИ-
ЦИНСКИХЪ СОЧИНЕНІЙ.

46. J. Bernt's systematisches Handbuch der gerichtlichen Arzneykunde. 3 Auflage. Wien, 1828.

47. Briand et Brossen Manuel complet de medecine legale. Paris, 1828.

48. I. A. Buchner's Toxicologie. 2 Auflage, Nürnberg. 1827.

49. G. W. Stein's Lehre der Geburtshülfe, als neue Grundlage des Fachs. II Theile. Leipzig, 1827.

50. C. M. Clarké's Observations on those diseases of femals, which are attended by discharges. II Parts with plates. London, 1814-1821.

51. J. Davis Elements of operativ Medwifery. London. 1826. 4°

52. P. Dewees's Compendious system of Midewifery. Philadelphia, 1824.

53. P. Dewees's Treatise on the physical and medical treatement of children. 2. Edit. Philadelphia. 1826.

54. P. Dewees's Treatise on the diseases of femals illustrated by engravings. Philadelphia. 1826.

55. P. Dewees's on various subjects, connected with midwiferis. Philadelphia 1825.

56. L. F. Froriep's Handbuch der Geburtshülfe. 8. Auflage. Weimar, 1827.

57. Guerin de Mamers, Nouvelle Toxicologie. Paris, 1827.

58. M. Hall, Commentaries on some of the more important of the diseases of femals. London, 1827.

59. S. Lair, Nouvelle method de traitement des ulceres, ulcerations et engorgemens de l'uterus. 2. Edit. Paris, 1828.

60. M. Martini, Elemente di Polizia medica. 5. Vol. Tarino, 1825.

61. M. Martini Introduzione alla medica legale. 3. vol. Torino, 1826.

62. F. L. Meissner's Forschungen aus dem Gebiete der Geburtshülfe, Fravenzimmer-und Kinder-krankheiten. Leipzig, 1826.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ

ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

**МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ
ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА.**

~~~~~  
**Часть XIV N. 9.**  
~~~~~

Discere ne cessa: cura sapientia crescit:

Rara datur longo prudentia temporis usu.

Съсѣ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

**ВЪ ТИПОГРАФИИ МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.**

1829 ГОДА.

СОДЕРЖАНІЕ.

Стран.

- I. О заразныхъ болѣзняхъ вообще въ Медико-Полицейскомъ отношеніи 167.
 - II. О жизненныхъ припасахъ, какъ предметъ Медицинской Полиціи (*Продолженіе*) 217.
 - III. О лѣченіи оправленныхъ. (*Оконч.*) 266.
 - IV. О главныхъ способахъ лѣченія болѣзней 296.
 - V. Официальныя извѣстія съ 1-го Сентября по 1-е Ноября 1829 г. 308.
-

[illegible][illegible]

2. The second part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $\epsilon \rightarrow 0$. It is shown that the solutions of the system (1) converge to the solutions of the system (2) as $\epsilon \rightarrow 0$. The convergence is uniform on compact subsets of the domain D .

Journal of Management Studies, 20(6), 791-806.

— 1987 —

[illegible]

• • • • • (continued)

• 30g (average) per 100g of dry weight

— 1997 —

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

[illegible]

DOI: 10.1002/for

I.

О ЗАРАЗИТЕЛЬНЫХЪ БОЛѢЗНЯХЪ ВО- ОБЩЕ, ВЪ МЕДИКО-ПОЛИЦЕЙСКОМЪ ОТНОШЕНІИ.

*Сочиненіе Г. Главнаго по Арміи Медицин. Ин-
спектора Тайн. Сов. Баронета Я. В. Вилліс.*

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

*Свойства заразы, ея происхожденіе и рас-
пространеніе.*

§ 1. Не описывать каждую заразитель-
ную болѣзнь порознь, а только изложить
вкратцѣ то, что онѣ имѣютъ между собою
общаго и поколику сіе нужно въ Медико-
Полицейскомъ отношеніи, составляетъ глав-
ный предметъ моего занятія. Посему въ
статѣ сей намѣренъ я говорить: о свой-
ствѣ заразительныхъ болѣзней, условіяхъ,
благопріятствующихъ развитію и распро-

страненію ихъ и мѣрахъ, какія слѣдуетъ предпринимать при появленіи оныхъ.

Свойство заразныхъ болѣзней.

§ 2. Сущность каждой заразной болѣзни состоитъ въ собственномъ специфическомъ ядѣ (virus) или заразѣ, отъ которой она происходитъ и посредствомъ которой распространяется отъ одного субъекта къ другому, изъ города въ городъ и п. п. Но что такое это ядъ, эта тончайшая, невидимая заразная матерія, сего доселѣ не могли опредѣлить ни остроуміе Философовъ, ни эмпиризмъ япро-Химиковъ; словомъ, это есть вѣрная загадка Сфинксова, которую разгадать можетъ только другой Эдипъ.

Свойства заразы.

§ 3. 1. Извѣстно каждому, что зараза, первоначально развивающаяся въ человѣческомъ организмѣ, можетъ приспавать и къ другимъ веществамъ, сохраняя всю способность производить и распространять зараженіе. Симъ способомъ переносится она изъ одного государства въ другое, изъ города въ городъ и

ш. д., и посему-то первые подвергнувшіеся вліянію оной становящіяся источникомъ зараженія для другихъ.

2. Зараза приспаетъ особенно ко всѣмъ шѣламъ скважистымъ, ко всѣмъ матеріямъ шерстянымъ, шелковымъ, бумажнымъ и нишаннымъ, къ мѣхамъ и шкурѣ всѣхъ животныхъ, къ перьямъ, пуху, волосамъ, бумагѣ; наконецъ ко всѣмъ издѣліямъ изъ живописныхъ и расписныхъ веществъ, и къ симъ вещамъ, еще невыдѣланнымъ. Дерево, лакомъ покрытое, мѣталлы, лѣкарства, продовольственные припасы (?) неспособны удерживать заразу, развѣ будутъ они соединены съ какимъ нибудь веществомъ, принимающимъ оную, какъ то: съ шерстью, хлопчатною бумагою, холстиною, рогожами и проч., если на прим: они будутъ въ мѣшкахъ, куляхъ и т. п.; но ржавчина, покрывающая мѣталлы, особенно на монетахъ, дѣлаетъ ихъ подозрительными; распенія не сообщаютъ заразы, но она приспаетъ къ душистымъ цвѣтамъ, которые иногда были причиною гибельныхъ послѣдствій на Востоку; свѣжеиспеченный и неоспывшій еще

хдѣтъ также способенъ воспринимать и удерживать заразу *).

3. Нѣкоторыя заразы сообщаются только чрезъ непосредственное прикосновеніе къ больному или зараженной вещи (*contagia fixa*), а другія сообщаются и воздуху въ разной степени (*c. volatilia*).

4. Сильный холодъ, паковой же жаръ и кислоты уничтожаютъ заразу.

Примѣчаніе. Зимой господствуютъ заразительныя болѣзни по причинѣ теплоты, спертого воздуха и большого скопленія людей въ комнатахъ.

5. Болѣзни, производимыя заразою, обнаруживаются большею частію, кромѣ общихъ, особенными признаками (преимущественно на кожѣ и въ слизистыхъ оболочкахъ), не-вспрѣчающимися въ болѣзняхъ, происходящихъ отъ обыкновенныхъ причинъ.

Примѣчаніе. Сіе обстоятельство важно при изслѣдованіи больныхъ, для опредѣленія ихъ болѣзни.

6. Болѣзни, произведенныя нѣкоторыми (особливо лепучими) заразами, совершивъ свое

*) Подробнѣе о семъ излагается въ Карантинномъ Уставѣ.

печеніе, прекращающіяся сами собою и врачебныя средства мало оказываютъ на нихъ дѣйствія; другія заразительныя болѣзни правильнаго печенія не имѣютъ, сами собою не прекращающіяся, но излѣчивающіяся специфическими средствами.

7. Нѣкопорыя заразы только однажды поражаютъ человѣка въ жизни; по крайней мѣрѣ второе зараженіе ими случается рѣдко и бываетъ несовершенное; другія заражаютъ всякой разъ, когда человѣкъ имъ подвергается.

Учрежденіе карантиновъ.

§ 4. Свойство заразы переноситься, какъ сказано выше, во всей своей силѣ съ вещами, поварями и проч. изъ одного мѣста въ другое, было первымъ поводомъ къ учрежденію карантиновъ, копорыхъ цѣль посему есть препятствовать плаковому распространенію оной. Сорокодневный срокъ (*quarantaine*) назначенъ изъ опыта.

§ 5. Не надобно однако же думать, чтобы карантины, даже самыя строгіе, были вѣрно для государства оградой отъ заразы и ручались вполне за безопасность его

опъ оной, поелику даже самая чума, безъ всякаго сношенія съ Египтомъ, Турцією, Александрією и п. п. можесть развисья непосредственно въ самой Европѣ, особенно Южной полось ея при благопріятствующи́хъ шому обсто́ятельствахъ или условіяхъ. На сіе Медицинская Полиція должна обра́тити особенное свое вниманіе, дабы въ случа́ появленія заразы въ какомъ либо мѣстѣ не ограничива́ться одні́ми то́лько мѣрами для пресѣченія дальнѣйшаго хода оной, но стара́ться опкры́ть корень сего зла и, не медля, истреби́ть оный, пока не слишкомъ еще расплоди́лись его опрасли.

Условія, благопріятствующія развитію заразительныхъ болѣзней.

§ 5. Условія, благопріятствующія развитію заразительныхъ болѣзней, наипаче суть слѣдующія: нездоровыя, нечиспы́мъ воздухомъ наполненныя, рѣдко провѣтриваемыя мѣста, и припомъ слишкомъ пѣсныя по числу жителей; неопря́тность и нечистота всякаго рода, гнилыя, вредоносныя испаренія живопныхъ и распилительныхъ веществъ, скудная и нездоровая пища, какъ то: гнилая

рыба, мясо опгъ больного или истощеннаго
 скопа, или мясо, пронупое гнилоспїю, зап-
 хлая мука и ш. п.; вода худаго качеспва, непо-
 мѣрные пруды, предшеспвовавшїя болѣзни,
 особенное соспоянїе воздуха (*constitutio æeris*
epidemica), безпрестанная перемѣна погоды,
 особенно Южный вѣтеръ, болотныя повѣш-
 рія, раскапыванїе кладбищъ и проч. Посему-то
 гнилая заразительная горячка наичаще разви-
 вается въ госпиталяхъ, шемницахъ, на транс-
 портныхъ судахъ, въ бѣдныхъ избахъ и вообще
 шамъ, гдѣ воздухъ рѣдко или никогда почти не
 возобновляется: ибо опышомъ дознано, что
 испаренїя даже живыхъ тѣлъ, будучи заклю-
 чены въ тѣсномъ пространствѣ, произво-
 дятъ сію заразу. Не смотря на эшо одна-
 кожъ, заразительная болѣзнь не всегда об-
 наруживается въ томъ только мѣспѣ, гдѣ
 скопились гнилыя испаренїя или мїазмы, по-
 тому что если причина слишкомъ сильна,
 то она можетъ заразить и сосѣдственную
 атмосферу и развитъ въ ней шуже болѣзнь.
 Причиною одной злокачественной горячки
 было скопленїе нечистотъ за стѣнами го-
 рода, изъ котораго оныя вывозили. И сколько
 разъ горячка сія опустошала цѣлые города

и села, смежныя съ полемъ сраженія, отъ того, что мертвыя тѣла или вовсе покинуты были безъ погребенія, или только поверхностно были зарыты въ землю!

Какими путями входитъ зараза въ организмъ теловѣтескій?

§ 7. Въ человѣческій организмъ входитъ зараза чрезъ органы испаренія, преимущественно же чрезъ органы дыханія, т. е., она либо всасывается волосными сосудцами кожи, либо вдыхается съ воздухомъ, либо поглощается съ слюною; нѣкоторыя заразы поражаютъ мозгъ почти непосредственно чрезъ Шнейдерову носовую перепонку.

Какими образамъ распространяются заразительныя болѣзни?

§ 8. Заразительныя болѣзни могутъ распространяться:

1-е. Чрезъ непосредственное прикосновеніе здоровыхъ людей къ зараженнымъ.

2-е. Посредствомъ атмосферы, и

3-е. Посредствомъ вещей, къ которымъ прикасались больные, или которыя имъ принадлежали или вблизи ихъ находились.

§ 9. Прикосновеніе здоровыхъ къ зараженнымъ вообще опасно; но при нѣкоторыхъ обстоя-

пелльствахъ опасность сія увеличивается: такъ, по наблюденіямъ, зараза дѣйствуетъ сильнѣе въ то время, когда больной въ поту, или кончается.

Прикосновеніе испражнений больного, какъ естественныхъ, на прим: слюны, выдыхаемаго пара, такъ и болѣзненныхъ, на прим: гноя, заражаетъ сильнѣе, нежели самое прикосновеніе къ его тѣлу.

Тѣла умершихъ отъ заразительной болѣзни заразительны.

Примѣчаніе. Желаящіе вскрывать тѣла должны прежде ихъ обмыть въ растворѣ хлориновой извести или соды, и при вскрытіи осперегаться прикосновенія къ отдѣленнымъ влагамъ трупамъ.

§ 10. Воздухъ безспорно есть то средство, чрезъ которое наичаще распространяется зараза. На опытѣ замѣтили, что свободный, чистый и въ движеніи находящійся воздухъ, пропекающій между зараженнымъ и здоровымъ человекомъ, совершенно почти обезопасиваетъ сего послѣдняго отъ зараженія, и тѣ, которые держатъ себя въ извѣстномъ разстояніи отъ больного или не входя въ его комнату, не поражаются зара-

зою. Напротивъ того спершый воздухъ, нечистый и наполненный поспоронними гасами и гнилыми испареніями, соединяя, такъ сказать, больныхъ съ здоровыми, замѣняетъ непосредственное ихъ между собою соприкосновеніе, и въ семъ отношеніи онъ есть лучший проводникъ заразы. Посему-то въ госпиталяхъ и пѣсныхъ запершыхъ мѣспахъ и бѣдныхъ избахъ масса воздуха, оспаваясь долгое время безъ возобновленія, напипываетъ, такъ сказать, подобно морской губкѣ, испареніями, изъ живыхъ пѣлъ, изъ язвъ, испражнений и п. п. исходящими и спановишя заразительною. Много есть примѣровъ, что посѣщавшіе паковыя мѣспа получали заразительную горячку, опъ того только, что они подходили къ больному, хопя не прикасались ни къ нему, ни къ вещамъ, его окружающимъ.

Опытъ однакожъ показываетъ, что заразительная атмосфера распротраняется только на малое пространство вокругъ больного, не только при гнилой горячкѣ, но и при скарлатинѣ, оспѣ, гнилой жабѣ и при всѣхъ другихъ заразительныхъ болѣзняхъ. Пространство сіе заключаешя въ нѣсколь-

ких фушахъ. Впрочемъ вѣсперъ можетъ разносити заразу отъ одного мѣста до другаго и распространити такимъ образомъ болѣзнь. Многія наблюденія подтверждаютъ сію истину.

Степень развитія заразы или періодъ эпидеміи имѣетъ особенное вліяніе на состояніе атмосферы. Въ первомъ и послѣднемъ періодѣ, какъ понятно, воздухъ менѣе зараженъ и слѣдовательно менѣе опасенъ, нежели въ среднемъ періодѣ, когда уже много больныхъ, большой безпорядокъ въ домахъ, нечистота внутри и снаружи оныхъ. Въ это время воздухъ даже въ улицахъ, особенно пыльных, наполненъ заразою.

Вообще жаркое время, влажный и густой воздухъ, благопріятствуютъ распространенію заразы; холодное же время, напротивъ, тому препятствуютъ.

Испражненія, особенно весьма вонючія, удобно заражаютъ воздухъ, равно какъ дыханіе и испарина больного.

§ 11. Fomites или вещи, наполненные заразою, также способствуютъ распространенію заразительныхъ болѣзней. Вещи сіи, удаленныя отъ вліянія воздуха, на прим: площ-

но закупоренныя, скрывая въ себѣ, часто весьма долгое время, заразу, могутъ въ наибольшійшія мѣста заносить ее. И вообще онѣ гораздо болѣе способны сообщить зараженіе, и въ ужаснѣйшемъ его видѣ, нежели сами больные. На прим: человекъ, коснувшійся своимъ плащомъ до зараженныхъ пѣлъ, можетъ носить на себѣ заразу и сообщить оную другимъ, не зная о томъ, и самъ не заразившись ею. Другія животныя, на прим: собаки, кошки, даже домашнія птицы могутъ распространять заразу; мухи могутъ распространять заразу тѣмъ удобнѣе, что онѣ обыкновенно лѣзутъ къ веществамъ, наиболѣе заразительнымъ, каковы: супъ: изверженія больныхъ, язвы и проч.

§ 12. Зараза поражаетъ людей всякаго возраста, пола и тѣлосложенія; однако эпидемически свирѣпствующія заразительныя болѣзни въ семъ отношеніи иногда представляютъ примѣчательную разность, т. е., въ одной эпидеміи той же самой болѣзни болѣе спржадутъ люди крѣпкіе, а въ другой слабые, въ одной болѣе мужчины, а въ другой женщины и проч. Сверхъ сего наблюденія показали, что слѣдующія обстоятельства

вообще, такъ сказать, располагають къ воспріятію заразы.

1. Спрахъ заразы, уныніе, безпокойство душевное и вообще угнетающія спраси.

2. Большая чувспивительность всего тѣла, природная или болѣзненная, особливо соединенная съ полнокровіемъ.

3. Вліянія, слишкомъ ослабляющія крѣпость организма: непомѣрные шруды, продолжительное бдѣніе, излишнее употребленіе спиртныхъ напишковъ и подобныя.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О мѣрахъ, какія надлежитъ предпринимать при появленіи заразительныхъ болѣзней въ какомъ либо городѣ, селеніи или мѣстекѣ.

§ 12. Мѣры сія зависятъ отъ Медицинской и Военной или Гражданской Полиціи и вообще имѣють двоякую цѣль:

1-е. Предохранить людей здоровыхъ отъ зараженія.

2-е. Пресѣчь дальнѣйшее распространеніе заразы и совершенно испребить оную.

§ 13. Лучшія и надежнѣйшія предохранительныя средства отъ заразы состоятъ въ

сѣдующемъ: самое вѣрное—удалишься изъ неблагополучнаго мѣста, если обязанность службы тому не препятствуетъ *); а если сего не лѣзя сдѣлать, то не прикасаться къ больнымъ, ни къ ихъ вещамъ и не имѣть никакого сообщенія съ больными; соблюдать строгую чистоту и опрятность плѣла; окатываться холодною водою, или мыться водою соленою, либо водою съ уксусомъ, а еще лучше, купаться въ морской или рѣчной водѣ; чаще освѣжать воздухъ въ комнапахъ чрезъ провѣприваніе, разведеніе огня въ каминахъ, или посредствомъ куреній; содержать въ нихъ прохладную темперашуру, опвращать многоядство.

Сими средствами можно предохранить себя отъ зараженія, не только живя въ городѣ или селеніи, гдѣ свирѣпствуютъ заразительныя болѣзни, но и въ самомъ домѣ, въ которомъ есть уже одержимые заразою. Исторія почти всѣхъ заразительныхъ эпидемій, бывшихъ въ Европѣ, говоритъ въ пользу сего.

*) Само собою разумѣется, что вызжающіе изъ неблагополучнаго мѣста должны выполнить карантинныя постановленія.

Частныя предохранительныя мѣры, особенно для Вратей, фельдшеровъ, госпитальной прислуги и прот.

§ 14. Врачамъ, фельдшерамъ, госпитальной прислугѣ и всѣмъ шѣмъ, кошорые, по долгу званія своего, обязанностями службы, связямъ родственнымъ или по человеколюбію, должны наичаще обращаться съ больными зараженными, полезно будетъ наблюдать слѣдующія предосторожности:

Первая и главная изъ нихъ, по мнѣнію моему, есть высокое чувство своей обязанности и совершенное самоопроверженіе.

Fer facile quod fata ferunt; si ferre recusas, Ipsum te crucias, nec minus illa trahunt.

Посему занимаюсь своею обязанностию, какъ будто ничего не должно случиться.

2. Избѣгаешь, сколько можно, непосредственного соприкосновенія съ вѣспрѣчающимися на улицахъ людьми и сомнительными вещами.

3. Носишь одежду предохранительную: серпуки изъ вошанки или клеенки, безъ прорѣзовъ, кошорые бы плотно застегивались около шеи и рукъ; шаковые же плащи или шича-

тели и брюки, сапоги высмоленные или хорошо напищенные масломъ или дегтемъ, перчатки изъ клеенки же или вошанки; — при осмотрѣ лазареша покрывашъ и голову, ибо, какъ извѣстно, къ волосамъ весьма удобно приспаетъ зараза. Сія одежда имѣетъ то преимущество, что оную весьма легко обмывать водою и очищать опъ всѣхъ подозрительныхъ часпицъ, копорыя приспануть къ ней. Таковую одежду весьма рекомендуетъ Г. *Фалкнеръ*. Онъ самъ, его Помощники-Врачи и прислуга Мальпійскаго чумнаго лазареша носили оную во время свирѣпствовавшей шамъ 1813 года чумы. По окончаніи осмотра больныхъ они погружали свою одежду на нѣсколько часовъ въ воду, простую или соленую.

4. Не входить ни въ лазарешныя палаты, ни въ часпные дома, гдѣ лежатъ больные, пока не опворятъ въ нихъ оконъ и дверей и не очиспятъ воздуха куреніями; не садиться ни на постель больного, ни на мебель, въ его комнатѣ находящуюся, и не оставаться у него долѣе надлежащаго времени; не останавливаться въ дверяхъ сихъ

комнатъ, поелику воздухъ, напипанный заразою, шуда болѣе спремится.

5. Запрешить прислужникамъ, особливо большихъ лазареповъ, чптобы они въ комнатахъ больныхъ не держали своей пищи и не ѣли.

6. Не дѣлать упренныхъ посѣщеній больнымъ съ пощимъ желудкомъ; не щупать пульса и не допрогиваться до шѣла голыми руками, а если нужно, то надѣвать перчатки, напипанныя масломъ или клеенчатые и пошчасъ поштомъ обмывать ихъ холодною водою съ уксусомъ; не допрогиваться до плащя и другихъ вещей, принадлежащихъ больному или вблизи его находящихся.

7. Разговаривая съ больнымъ, спановиться къ нему такимъ образомъ, чптобы продувный вѣсперъ могъ опносить въ спорону зловредныя испаренія, и въ шакоемъ распояніи, чптобы не вдыхать воздуха, исходящаго изъ его легкихъ, ни его испарины.

8. При осмошрѣ больныхъ или разговорѣ съ ними держащъ предъ носомъ губку, напоенную крѣпкимъ уксусомъ, либо уксусомъ съ камфорнымъ спиртомъ, либо жидкимъ амміакомъ, или нюхаютъ *bouteille de désinfection*, либо распшоръ хлориновой извешти (*Chlorox*).

*

retum calcis); слюны не глотать, но выплевывать и носъ высмаркивать; по окончаніи осмотра вымывать руки водою съ уксусомъ и выполаскивать ротъ.

9. При возвращеніи въ кварширы послѣ осмотра больныхъ шопъ же часъ перемѣнить свое плащье и бѣлье и обмыть все шѣло, особенно руки, холодною водою съ уксусомъ. Плащье суконное вывѣсить на свѣжій воздухъ, а клеенчатое и изъ воцанки выпереть губкою, налитанною водою съ уксусомъ, или погрузить въ воду на нѣсколько часовъ, а бѣлье топчасъ опдасть вымыть въ щелокъ.

10. Воздерживаться опть излишества въ пищѣ и чувспенныхъ наслажденіяхъ, но и не изнурять себя слишкомъ спрогою діепою. Пища должна быть живопно-распипельнаго качества; немного вина съ водою; чашка или двѣ кофе; для привыкшихъ курить табакъ, шрубка.

11. Не обходить вдругъ много больныхъ и вообще не ходить до успалости; не проводить ночей безъ сна.

12. Соблюдать спрогою чистоту и опрятность шѣла; чаще окачиваться холодною

водою *), либо обливаясь водою соленою или водою съ уксусомъ, а и того лучше купаться въ морской или рѣчной водѣ. Вдали отъ моря и при недоспашкѣ воды для купанья, *Пирсонъ* совѣдуетъ мочить рубашку каждое утро въ холодномъ, пресыщенномъ растворѣ поваренной соли, и, выжавши оную, надѣвать на себя еще мокрую и холодную, съ пою только предосторожностію, чтобы производилъ въ слѣдъ за симъ нѣсколько времени умѣренное плѣдвигеніе; еще и того лучше мочить рубашку въ растворѣ хлориновой извести или древесномъ уксусѣ, и повторять это нѣсколько разъ въ день.

13. Поелику замѣчено, что водоносы и поргующіе масломъ въ Александріи, Тунисѣ, Конспантинополѣ и проч., во время свирѣпствующихъ тамъ заразительныхъ эпидемій, не подвергаются зараженію, то и сіе обстоятельство не оставилъ безъ вниманія, равно какъ и то, что обращавшіеся со смолою и торговавшіе пряносіями, также мапро-

*) Холодная вода есть не только предохранительное, но и терапевтическое средство противу заразы, особенно чумной.

сы, объявлявшіе корабли смоленою пенькою, во время чумы въ Лондонѣ избѣжали болѣзни.

14. Тѣмъ, которые не могутъ себя совершенно опдалить отъ дѣйствія заразы, *Ларрей* совѣщаетъ сдѣлать фонпанель, или поддерживать искусственныя раны посредствомъ нарывныхъ пластырей. Это одна-кожъ весьма сомнительно и, по мнѣнію моему, не только не предохраняетъ, но еще болѣе располагаетъ къ зараженію: ибо ослабляетъ процессъ плошопворенія и изнуряетъ жизненныя силы.

15. Умѣренная прогулка въ хорошую погоду упрямъ, или верховая ѣзда, безъ нарушенія карантинныхъ постановленій. Сидячая жизнь напротивъ располагаетъ организмъ къ воспріятію заразы.

Мѣры со стороны мѣстнаго Начальства при появленіи заразительной болѣзни.

§ 15. При появленіи заразительной болѣзни въ какомъ либо мѣстѣ мѣстное Начальство не медля должно предпринять спорогія мѣры для воспрепятствованія дальнѣйшему распространенію ея и для совершеннаго истребленія оной.

§ 16. Мѣры сіи должны быть различны,

смотря по степени и обширности распространения болѣзни, по ея качествамъ болѣе или менѣе опаснымъ, по числу больныхъ и мѣсту, гдѣ появилась зараза. Но вообще онѣ суть шроякаго рода: а) когда болѣзнь только что появилась и когда число больныхъ еще весьма мало; б) когда она распространялась на значительное пространство и свирѣпствуетъ во всей силѣ, причемъ число больныхъ слишкомъ значительно и с) когда болѣзнь прекращается.

Впрочемъ попеченіе Правительсва не должно ограничиваться однимъ занятіемъ о болѣзни; оно должно въ тоже время заботиться и о томъ, чтобы не изсякли источники, изъ которыхъ почерпаются необходимо нужные предметы и даже удобства жизни: ибо если когда, то особенно въ сіе время многіе принуждены бываютъ испытывать бѣдствія столь же ужасныя, какъ и самая болѣзнь: голодъ, опчужденіе, безпомощность и проч.

А. § 17. Какъ скоро дойдетъ до свѣденія, что въ какомъ либо домѣ оказался больной съ заразительною болѣзнію, то тотчасъ опрядишь шуда Военнаго или Гражданскаго Медика опыш-

наго, а и того лучше, гдѣ можно, назначить Коммисію изъ нѣсколькихъ опытныхъ Врачей (Commissione consultative) для освидѣтельствованія болѣзни, и, буде извѣстіе подтвердится (въ случаѣ сомнѣнія о заразительности и опасныхъ свойствахъ болѣзни, лучше почесъ ее за дѣйствительно опасную), то:

1. Отдѣлить здоровыхъ жильцовъ сего дома отъ больного и перевести ихъ въ карантинъ или временный госпиталь, бараки, палатки или другое мѣсто для наблюденія. Впрочемъ предоспавляется имъ на выборъ нанять для себя на свой счетъ удобный домъ, который одобрить Правительство, или итти въ назначенное мѣсто. Сихъ людей считать сомнительными и назначить для наблюденія за ними особаго Медика, который бы осматривалъ ихъ въ нагомъ состояніи два раза въ день, съ тѣмъ, что, если кто либо изъ нихъ заболѣетъ, тотчасъ отдѣлить его въ лазаретъ. Всякое сообщеніе съ ними постороннихъ лицъ прекращается на двадцать дней. Но этотъ срокъ увеличивать пятью днями всякой разъ, какъ только кто либо изъ числа ихъ заболѣетъ. Если по

прошествіи сего времени ни у кого изъ сомнительныхъ не обнаружился болѣе заразительной болѣзни, по ихъ освобожденію отъ наблюденія.

2. По выходѣ изъ дома людей здоровыхъ, больной оспашся въ ономъ, и не прежде можетъ выйти, какъ по прошествіи двадцати дней послѣ совершеннаго своего выздоровленія.

3. Для пользованія больныхъ назначить особаго Медика, который ежедневно долженъ подавать Начальству записки о состояніи оныхъ.

4. Въ каждомъ домѣ, гдѣ лежатъ больные, соблюдать возможную чистоту и опрятность; чаще освѣжать и очищать воздухъ извѣстными способами; равно очищать всѣ вещи, больному принадлежащія и вокругъ него находящіяся.

5. Всякой больной можетъ избрать для присмотра и хожденія за собою кого либо изъ членовъ своей фамиліи, или людей постороннихъ, если они на то согласятся. Въ противномъ случаѣ Начальство даетъ ему отъ себя людей для прислуги. Люди сіи не могутъ уже выйти изъ дому до шѣхъ поръ,

пока больной либовыздоровѣетъ, либо умретъ; послѣ чего они должны выдержашъ двадцатипдневный карантинъ и очищеніе по извѣстнымъ правиламъ.

6 Какъ Врачей, такъ и прислугу лучше опредѣлять по охотѣ, если найдутся таковые, припомъ пожилыхъ, флегматическаго темперамента, воздержной жизни, невѣрящихъ заразительности болѣзни, полагающихся на предопредѣленіе, перенесшихъ уже таковую болѣзнь.

7. Если обширность дома позволяетъ совершенно отдѣлить одну половину для больного, то остальныхъ членовъ фамиліи нѣтъ надобности выводить изъ онаго, съ тѣмъ только, чѣобы они совершенно отдѣлены были отъ больного, не имѣли никакого общенія съ городомъ или мѣстечкомъ, и чѣобы во всемъ исполняли приказанія Начальства. Если домъ построень въ нѣсколько этажей, то больного помѣстятъ въ верхнемъ.

8. У каждаго дома, гдѣ открылась заразительная болѣзнь, также у дома для наблюденія за сомнительными, поставятъ часового, дабы никто не могъ ни войти въ сіи дома, ни выйти изъ оныхъ.

9. Назначить особыхъ Коммисаровъ для доставленія въ дома сіи продовольствія, которое подавать въ окошка, посредствомъ особенныхъ вилокъ или лопатъ. Бѣднымъ же доставлять пищу отъ Правительства, на казенный или обывательскій счетъ.

10. Бѣдныхъ людей, вояжеровъ и чужестранцовъ, неимѣющихъ собственныхъ жилищъ, перевести въ особые Правительствомъ избранные дома либо въ лазареты, смотря пошому, дѣйствительно ли они больны, или только подозрѣваются въ зараженіи.

11. Дома, занимаемые больными и опредѣленные для наблюденія за сомнительными, по прекращеніи болѣзни, или по смерти больного, очищать по карантиннымъ правиламъ, о чемъ будетъ сказано ниже.

В. § 18. Если, не взирая на всѣ сіи предосторожности, болѣзнь усилился и распространился на значительное пространство, то надлежитъ предпринять новыя и дѣйствительныя мѣры, не только въ самомъ мѣстѣ, гдѣ свирѣпствуетъ зараза, но и въ мѣстахъ съ нимъ сосѣдственныхъ.

1. Мѣстное Начальство должно обнародовать, чрезъ печатное объявленіе, что въ

шакоть-шо городъ или селеніи или мѣстечкѣ оказалась заразительная болѣзнь, и что хотя всѣ нужные способы для воспрепятствования дальнѣйшему распространенію ея уже приняты, оно приглашаетъ однакожь и сосѣднія мѣста принять съ своей стороны надлежащія предосторожности, не прерывая впрочемъ обыкновенной своей торговли, поелику она спрогими мѣрами можетъ быть совершенно обезопасена, но напротивъ поощряетъ оную.

2. Городъ или мѣстечко раздѣлишь на кварталы или околотки.

3. Какъ самый городъ, такъ и неблагополучные кварталы, окружишь караульною цѣпью (cordon), подъ начальствомъ Офицера спрогаго и исполнительнаго; часовыхъ разставишь въ шакоть одинъ опъ другаго разстояніи, чтобы они могли удобно видѣть другъ друга и имѣть между собою сношенія.

4. Не позволяешь никому ни въѣзжать въ городъ, ни выѣзжать изъ онаго безъ медицинскаго свидѣтельства о его здоровьи, ни переходить изъ благополучнаго квартала въ неблагополучный, и на оборотъ, безъ свидѣтельства Квартальнаго Коммисара, не ходишь

въ чужіе дома, не принимаѣть ни опѣ кого никакихъ вещей.

5. Прекратиѣ публичныя собранія, за-крыѣ пѣапры, пракпиры, кофейныя дома, корчмы и ш. п., а равно училища и церкви; рынокъ перевести за городъ и содержать подъ надзоромъ мѣстной Полиціи; остано-витиѣ работу на фабрикахъ, заперетиѣ мага-зины съ шоварами и проч.

6. Назначиѣ особыхъ Коммисаровъ изъ благонадежныѣшихъ жителей, по числу жи-телей города, или по числу квартираловъ. Имъ поручаеиѣся опыскиватиѣ нуждающихся въ по-мощи, выдаватиѣ свидѣтельства о состояніи здоровья, наблюдаѣть за погребеніемъ шѣль, опправляѣть больныхъ въ лазареты, завѣды-ватиѣ продовольствіемъ квартирала *).

7. Опредѣлиѣ свѣдущихъ Врачей, кото-рые со всею шщательностью должны освѣ-

*) Касательно правилъ, какія нужно соблюдать при доставленіи продовольствія жителямъ оцѣпленнаго мѣста въ ихъ дома, смопри Пра-вила для жителей города Одессы, изданныя Новороссійскимъ и Бессарабскимъ Генераль-Гу-бернапоромъ Графомъ Воронцовымъ.

домляться и наблюдать за здоровьемъ каждаго кварпала; приспавить часовыхъ къ каждому неблагополучному дому; назначить фельдшеровъ, прислугу и особыхъ разнощиковъ, для разсылки по кварпалу необходимо нужныхъ для жишелей припасовъ и вещей; поспроить брички, телеги или дроги для опправленія больныхъ въ лазареты и для опвоза труповъ на кладбища.

Примѣчаніе. Сіи телеги должны быть покрыты лакомъ, либо высмолены, для того чпобы ихъ удобно можно было вымывать и очищать; проводники должны быть одѣшны въ предохранительное плащье.

8. Врачи, ихъ помощники, аптекари и всякъ, кто только узнаетъ о вновь опкрывшейся въ какомъ либо домѣ заразѣ, должны не медля извѣспить о томъ мѣстное Начальство.

9. Зараженныхъ опдѣлить въ особые временные лазареты, поспроенные внѣ города или мѣстечка, на возвышенномъ, но по направленію рѣки ниже города находящемся мѣстѣ, огражденные широкимъ и глубокимъ ровомъ и окруженные спрогимъ карауломъ, ко-

торый долженъ наблюдать, чтобы никто не имѣлъ никакого съ ними сообщенія.

10 Каждый лазаретъ долженъ состоять изъ трехъ отдѣленій: 1-е для одержимыхъ заразительною болѣзнію, 2-е для сомнительныхъ и 3-е для выздоравливающихъ. Между сими отдѣленіями не должно находиться никакого сообщенія. Каждое отдѣленіе должно имѣть свои: пріемную, ванный покой, прачешную, сушильню и цейхгаузъ, своихъ: Медика, Коммисара, вахтера, фельдшеровъ, служителей и проч., и должно быть снабжено доспапочнымъ количествомъ воды, ушаповъ, бочекъ, ведеръ, шакъ и п. п., съ тѣмъ, чтобы больныхъ во всякое время можно было обмыть и очистить.

11. Определенные въ лазаретъ чиновники и другіе люди не должны имѣть никакого непосредственнаго сношенія съ другими жителями, ни выходить за ограду лазарета.

12. Посему мѣсто, назначаемое для лазарета, должно быть такъ пространно, чтобы, кромѣ необходимыхъ вышесказанныхъ отдѣленій онаго, было доспапочно для жилища и для прогулки определенныхъ въ оныя людей.

13. Прибывающихъ въ лазаретъ больныхъ свидѣтельствуютъ дежурный Лѣкарь и назначаютъ въ отдѣленіе, куда кто слѣдуетъ.

14. Если во 2 или 3-мъ отдѣленіи лазарета кто либо окажется больнымъ заразою, поспѣшь перевести его въ 1-е отдѣленіе, поспѣшь его и вещи, ему принадлежащія, очиститъ надлежащимъ образомъ, а палашу провѣтришь и окуришь.

15. При поступленіи въ лазаретъ обмывать больного холодною водою, либо водою соленою и надѣвать чистое бѣлье; такимъ же образомъ и при выходѣ изъ лазарета. Снятое съ прибывшаго больного платье нитяное и бумажное поспѣшь погружается въ ушатъ съ соленою водою, а суконное всполаскивается въ рѣкѣ и потомъ высушивается и провѣтривается на воздухъ; либо очищать вещи сіи посредствомъ жара, т. е., класть въ обыкновенныя печи, или развѣшивать въ сушильняхъ, при таковой температурѣ, чѣмъ онѣ только что не могли сгорѣть. Металлическія вещи: деньги, сабли, ружья и проч. опускаетъ въ уксусъ или щелокъ, или бросаетъ въ огонь на нѣсколько минутъ; ассигнаціи, шелковыя матеріи и т. п.

окуривать сѣрными парами, или парами изъ соединенія сѣры съ селипрою, порохоуъ и проч.

16. Тѣ дома, изъ копорыхъ поступили больные въ лазарешъ, считались, разумѣется, подозрительными и поступать съ ними и съ оставшимися жильцами, какъ выше сказано.

17. Имѣть передъ каждымъ неблагополучнымъ домомъ чаны съ водою, чптобы не только люди, но и каждая вещь проходила изъ дома чрезъ сію воду: ибо извѣстно, что зараза, разжиженная водою, теряетъ свою силу. Воду сію перемѣнять по крайней мѣрѣ два раза въ день.

18. Въ сихъ домахъ, равно и въ лазарешахъ, соблюдать совершенную чистоту и опрятность, особенно стараться объ освѣженіи воздуха чрезъ провѣприваніе оныхъ.

19. Излишнюю мебель и всѣ вещи, имѣющія способность напшываться заразоу или поршинъ воздухъ, должно вынести изъ комнатъ больныхъ въ такое мѣсто, гдѣбъ онѣ не могли вредить здоровымъ и очищать оныя, смотря по большему или мѣньшему о нихъ подозрѣнію, либо чрезъ провѣприваніе, либо чрезъ омываніе водою соленою, или раство-

ромъ хлориновой извести, либо посредствомъ возвышенной температуры, либо наконецъ посредствомъ окуриванія. Вещи же, для нихъ нужныя, содержащія въ полной чистотѣ и опрятности. Постельное бѣлье и рубашки перемѣнять непременно чаще, причемъ брать оныя щипцами и бросать въ чанъ съ водою, который потѣ же часъ выносить вонъ изъ комнаты. Испражненія и мочу выбрасывать въ особливый для сего ямы и засыпать негашеною известью, углемъ или просто землею; ямы таковыя каждый день вырывать вновь, а старые засыпать. Перевязочныя вещи, также бѣлье и плащье умершихъ, сжигать и пѣла погребать немедленно.

20. Вещи малоцѣнныя, одежду бѣдныхъ и самыя избы ихъ лучше сжигать, и все сіе вознаграждать на счетъ казны или на счетъ обывательскій, въ натурѣ или деньгами, какъ пожелають хозяева, по всей справедливости.

21. Назначить мѣсто для кладбища и строго смотрѣть за пѣмъ, чтобы могилы для погребенія умершихъ отъ заразительной болѣзни были не менѣе 7 фузовъ глубиною. Умершихъ погребать нагими, безъ гробовъ, либо въ гробахъ, ничѣмъ необитыхъ, и сперва

засыпать извѣстью, а попомъ землю; на кладбища ихъ оппюдь не носить, но возить въ опредѣленныхъ для сего пелегахъ.

22. Спараться о доставленіи на всѣ улицы достапочнаго количества воды, чищеніи колодезей и фонтановъ, чистотѣ на улицахъ и въ дворахъ. Лѣпомъ домашній скотъ: лошадей, коровъ, овецъ и проч. выгнать за городъ на пастбище, подъ особымъ надзоромъ, прогнавъ ихъ предварительно раза при черезъ рѣку и вымывъ имъ голову водою; осенью же или зимою запереть въ конюшняхъ, сараяхъ, хлѣвахъ и ш. п., и окуривать дымомъ отъ сожиганія свѣжесрубленнаго хвороста или соломы. Всѣхъ собакъ и кошекъ убивать: ибо онѣ могутъ сообщить заразу и посредствомъ своей шерсти, и посредствомъ различныхъ вещей, копорыя онѣ могутъ перепаскивать съ одного мѣста на другое; мухъ испреблять, особливо въ чумномъ лазаретѣ, подслащеннымъ растворомъ кобольповаго окисла, или другимъ способомъ.

Прилѣтаніе. Если въ томъ городѣ или мѣстечкѣ, гдѣ появилась зараза, расположено войско: полкъ, баталіонъ, эскадронъ и проч.: то въ лѣпнее время не медля вывести оное въ

✱

лагерь, на мѣста возвышенныя, здоровыя и не ближе чепырехъ верспъ отъ города, съ копорымъ прекрапишь всякое сообщеніе, или гораздо лучше, не смотря ни на время года, ни на погоду, перевести на другія кварпиры удаленнѣйшія, со всѣми предосторожностями, нужными въ семъ случаѣ.

С. ѳ. 19. Хотя изъ дневныхъ медицинскихъ рапортовъ, равно таковыхъ же донесеній Кварпальныхъ Коммисаровъ, мѣстное Начальство и увидишь, что смертность въ городѣ прекрапилась и ни въ одномъ кварпалѣ никого не оказалось съ заразительною болѣзнію; въ первые дни однакожь, по полученіи таковой радостной вѣсти, оно не должно прекращать своихъ дѣйствій: ибо зараза иногда упирается только на нѣсколько времени и потомъ снова появляется и съ новою жестокостію. Посему всѣ предосторожности, принятыя при самомъ появленіи заразы, надлежитъ продолжать и исполнять во всей ихъ силѣ и обширности по крайней мѣрѣ тридцать или сорокъ дней еще послѣ совершеннаго прекращенія оной. Между тѣмъ, въ продолженіи сего времени, Врачи и Кварпальные Коммисары обязаны удвоить свой надзоръ надъ ввѣ-

ренными имъ частями города. Всѣ дома, отъ огромныхъ палаць до грязной корчмы жидовской или бѣдной хижины нищаго, они ежедневно должны навѣщать и осматривать со всею спорогоспію, почностію и благоразуміемъ, дабы, если гдѣ откроется одна искра отъ минувшаго гибельнаго пожара, попушить ее въ поже мгновеніе, пока еще она не вспыхнула и не разлилась снова пламенною рѣкою опустошенія между жителями. Въ сіе же время дѣятельно занятыя очищеніемъ домовъ, гдѣ лежали больные-зараженные, равно вещей и поваровъ, которые тамъ находились. Если уже по испеченіи тридцатидневнаго или, гораздо вѣрнѣе, сорокодневнаго срока, при соблюденіи сказанныхъ мѣръ, не откроется никакихъ слѣдовъ заразы, то оцѣпление снять, городъ объявить благополучнымъ и дозволить жителямъ вспушить въ прежнія ихъ сношенія и обычные занятія.

Очищеніе солнителныхъ домовъ, вещей и товаровъ.

§ 20. Дома, гдѣ лежали больные, равно вещи, повары и прочіе предметы, въ оныхъ находящіеся, по способности ихъ восприни-

мать, удерживать и сообщать заразу, считая сомнительными, и не прежде отдавая въ распоряженіе хозяевъ, какъ очистиивши оныя надлежащимъ образомъ.

Различные способы очищенія.

§ 21. Изложеніе всѣхъ методовъ для испребленія заразы, даже въ одномъ историческомъ отношеніи, слишкомъ распространило бы предметъ мой, не прибавивъ къ оному въ сущности ничего занимательнаго, ни полезнаго. Посему намѣренъ я говорить о тѣхъ только методахъ, копорые открыты или по крайней мѣрѣ усовершенствованы въ новѣйшее время, обще приняты, испытаны и увѣнчаны счастливымъ успѣхомъ.

Три способа, по моему мнѣнію, и вѣрны и достаточны для сказаннаго очищенія, а именно: провѣприваніе на росѣ (sequestration), омываніе различными жидкостями и куренія нѣкоторыи минеральными кислотами и гасами. При маломъ подозрѣніи о заразѣ и при очищеніи такихъ вещей, копорыя слабо оную удерживающъ, достаточно первыхъ двухъ способовъ; а при бѣльшемъ сомнѣніи и при очищеніи вещей, копорыя сильно напивывающъ

ся заразою и долго оную удерживають, надлежитъ употребить всѣ при способа, попеременно.

Очищеніе домовъ производится слѣдующимъ образомъ: распворить окна и двери и оспавить такимъ образомъ на два или на три дни для освѣженія воздуха; попомъ полъ, спѣны, пополокъ, окна, двери, мебель, словомъ, все, что естъ шамъ деревяннаго, вымыть щелокомъ, либо соленою водою, или водою съ уксусомъ и снова въ продолженіи 24-хъ часовъ провѣтришь свѣжимъ воздухомъ, опкрывъ окна, двери и заслонки въ каминахъ и печахъ, а мебель и прочія вещи вынести на опкрытый воздухъ. Послѣ чего спѣны вновь ошкелупишь и выбѣлишь, а мебель покрывъ лакомъ.

Плашье, бѣлье постельное, споловое, рубашки, плапки, чулки и всѣ предметы, къ которымъ прикасался больной, которые находились въ его комнашѣ и особенно которые употреблялъ онъ, должно вымыть либо въ морской водѣ, либо въ рѣкѣ, либо въ нарочно приготоовленной водѣ соленой, либо въ водѣ съ уксусомъ, или наконецъ въ водѣ, насыщенной хлориномъ или хлориною из-

вестью либо содою, если только вещи не цвѣтныя, въ пропивномъ случаѣ онѣ поперяютъ свою краску; послѣ чего высушивать оныя на свободномъ воздухѣ. Въ нѣкопрыхъ Европейскихъ каранпинахъ замѣпили, что одного провѣшриванія на росѣ доспащочно для очищенія такихъ даже поваровъ, копорые привозятся изъ самыхъ неблагополучныхъ мѣспъ. Зимую вещи сіи вымораживають на снѣгу.

Металлическія вещи: деньги, сабли, ружья, пушки и п. п. обмывають водою съ уксусомъ или подвергають оныя на нѣсколько минушь дѣйспвію огня или жара раскаленныхъ углей въ обыкновенныхъ печахъ, или посредспвомъ жаровни.

Окуриваніе.

§ 22. Окуриваніе преимущественно прои-зводится дымомъ огъ сожиганія свѣжесрубленнаго дерева и соломы, дымомъ пороха, сѣрными парами, наконецъ минеральными кислотами, особенно селищреною и пресыщенною соляною или хлориномъ.

Сѣрными парами можно очищають всѣ вещи шерстяныя и суконныя, неимѣющія ли-нющихъ цвѣшовъ, ассигнаціи, парусину, шку-

ры живописныхъ, волосяныя матеріи, бумажныя, льняныя, нелиняющихъ цвѣтшвъ; дома съ ихъ приспособками, конюшни, сараи, погреба и проч.

Въ соединеніи съ селипрою сѣра дѣйствуетъ гораздо сильнѣе. Лучшее соединеніе сего рода есть слѣдующее: на семь частей сѣры берется одна часть селипры; оба вещества приводятся въ порошокъ, вмѣшались смѣшиваются и всыпаются въ маленькія глиняныя плошки, копоры спавяются либо въ желѣзную или чугунную посуду, или въ горячій песокъ, въ такомъ числѣ, копорое бы соопвѣтствовало обширности окуриваемаго покоя; попомъ смѣсь сія медленно сжигается посредствомъ бумажной свѣпильни, или прута, или раскаленныхъ углей. Этого способъ очищенія весьма дѣйствителенъ, простъ и дешевъ, но требуетъ большой осторожности при употребленіи; почему производства онаго никогда не повѣрялъ людямъ не свѣдущимъ.

Кислоты, хлоринъ.

§ 23. Кислотами можно очищать шѣже вещи, копорыя очищаются сѣрными парами;

только здѣсь надобно брать еще большую предосторожность на счетъ цвѣтныхъ матерій; для сего при окуркѣ развѣшивашь сіи матеріи такимъ образомъ, чѣобы пары кислотъ слегка только оныхъ касались.

Изъ кислотъ употребляютъ для куренія особенно селипреную и пресыщенную соляную кислоту, или, вѣрнѣе сказать, хлоринъ. Хотя хлоринъ по дѣйствию своему имѣеть безспорно преимущество предъ селипреною кислотою, но сію кислоту для очищенія воздуха надлежитъ предпочесть въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда изъ комнаты не лзя вывести больныхъ, или когда самому Врачу надобно находиться при сей операціи, поелику она менѣе раздражаетъ легкія.

Лучшіе способы очищенія посредствомъ куреній кислотами суть наипаче *Крюкшанка*, *Гитона де Морво* и *Смита*.

По способу *Крюкшанка* надлежитъ взять двѣ части марганцовой окиси, чепыре части обыкновенной столовой соли (солянокислой соды), одну часть воды и три части сѣрной кислоты. Превративши въ порошокъ марганецъ и соль и смѣшавши оныя между собою, всыпать въ небольшую колбу или дру-

гой какой либо хрустальный или каменный сосудъ, влишь воду, и попомъ съ перемежками прибавлять сѣрной кислотою столько, сколько нужно для отдѣленія хлорина. Такимъ образомъ развитіе сего газа можно поддерживать въ продолженіи цѣлаго дня.

Добываніе хлорина ex tempore по способу Гитона де Морво.

Въ чешырехъунцовую спклянку всыпать одинъ золотникъ или скрупуль серпой въ порошокъ марганцовой окиси и попомъ наполнишь оную до двухъ претей селипро-соляною кислотою (*acidum nitrico-muriaticum*). Развивающійся при семъ хлоринъ бываетъ соединенъ съ небольшимъ количествомъ селипрокислого газа и отъ того менѣе раздражаетъ легкія, нежели когда онъ отдѣляется въ свободномъ состояніи.

Другой способъ добыванія хлорина.

Для окуриванія комнаты, величиною въ 30 фушовъ, берутъ двѣ части марганцовой окиси, столько же поваренной соли, одну часть воды и три части сѣрной кислотою. Марганцовую окись и соль превращаютъ въ по-

рошокъ и вмѣспѣ смѣшиваются; потомъ унцію сего порошка всыпаютъ въ какой либо сосудъ, стеклянный или каменный спаканъ, или чайную чашку, наливаютъ десертную ложку воды и напоследокъ прибавляютъ $\frac{1}{2}$ чайной ложки сѣрной кислоты. Когда отдѣленіе хлорина кончилось, прибавляютъ снова тоже количество сѣрной кислоты и повторяютъ сіе три раза, до тѣхъ, п. е., поръ, пока полторы чайныхъ ложечки сей кислоты будетъ употреблено.

Способъ Смита.

Для отдѣленія селипреной кислоты въ газообразномъ состояніи берутъ равныя части совершенно сухой и превращенной въ порошокъ селипры и сѣрной кислоты. Сосудъ, въ которомъ помѣщается сія смѣсь, спавяетъ въ горячій песокъ.

Чтобы отдѣлять въ маломъ количествѣ и постепенно селипрокислый газъ, что необходимо при очищеніи воздуха въ комнатахъ, гдѣ лежатъ больные, надлежитъ къ полуунціи сѣрной кислоты прибавлять по немногу сухой и спершой въ порошокъ селипры, продолжая сіе до тѣхъ поръ, пока равное кис-

лотѣ количество сей соли употреблено будетъ. Операцию сію можно производить въ обыкновенной чайной чашкѣ или спаканѣ.

Окуриваніе домовъ.

§ 24. Если *провѣтриванія и омыванія* недоспапочно для очищенія домовъ, гдѣ лежали больные, госпиталей и прочихъ въ семь родѣ спроеній, если, ш. е., предполагаеися, что они напипаны въ сильной степени заразоу: то слѣдуетъ употребить претій способъ для очищенія оныхъ, ш. е., *окуриваніе*. Оно производится слѣдующимъ образомъ: въ помѣ домѣ, который намѣрены очищать, освѣжишь предварительио воздухъ чрезъ опвореніе на нѣсколько времени оконъ и дверей, которыя при началіи окуриванія всѣ зашворить, выключая одной двери. Когда сосуды съ курипелнымъ соспавомъ въ надлежащемъ числѣ и по надлежащимъ мѣспамъ будутъ разспавлены, поспѣшно удалишься и запереть за собою оспальную дверь. Такимъ образомъ окурку оспавишь на двадцать чепыре часа. Послѣ чего снова опворишь окна и двери и *провѣтривать* въ продолженіи двухъ или трехъ дней. Окуриваніе сіе повпоряетъ-

ся еще разъ или болѣе, смотря по большому или меньшему подозрѣнію о кроющейся заразѣ.

Хлориновая извѣсть и таковая же сода.

§ 25. Соединенія хлорина съ щелочными основаніями, въ томъ числѣ съ извѣстью и содою, извѣстны уже Химикамъ болѣе 50-ти лѣтъ, первоначально подъ названіемъ окислено-солянокислыхъ, а нынѣ подъ именемъ хлориновыхъ или хлористыхъ солей. Ближайшимъ знаніемъ состава или способа приготовления хлориновой извѣсти и таковой же соды, такъ же знаніемъ химическихъ свойствъ оныхъ обязаны мы: *Бертолету, Гадолину, Фуркруа, Вокелену*, особенно *Шеневиксу и Деви*. Врачами же употребляющія соли сіи какъ въ Медицинскомъ отношеніи для леченія нѣкоторыхъ болѣзней, такъ и въ Медицинско-Полицейскомъ для очищенія воздуха отъ гнилыхъ, вредныхъ, мiasmатическихъ испареній, отъ обращенія гнилости въ трупамъ и предохраненія отъ зараженій разнаго рода, преимущественно съ 1823 года, т. е., со времени появленія въ свѣтъ отъвѣтной диссертациі Парижскаго Аптекаря *Лабаррака* на предложенную Парижскимъ Обществомъ для поощренія опеческованной промышленности задачу

объ усовершенствованіи приготовленія спрунъ изъ кишекъ домашнихъ живошныхъ. Опыты, дѣланные Г-мъ *Лабарракомъ* въ моргѣ (*morgue*)* и въ большихъ госпиталяхъ Парижскихъ, въ полной мѣрѣ оправдали дѣйствіе сихъ солей и доказали безусловное ихъ превосходство надъ всѣми доселѣ извѣстными препаратами для разрушенія гнилыхъ испареній всякаго рода. Честъ введенія сихъ солей въ употребленіе въ Медицинскомъ и Медицинско-Полицейскомъ отношеніи принадлежить, кромѣ *Лабаррака*, *Біетту*, *Лефевру*, *Бришето*, *Реньярдю* и проч.

О хлориновой извести, пропивугнилоспныхъ свойствахъ оной и способъ ея приготовленія сообщено Рускимъ Врачамъ въ Военно-Медицинскомъ Журналѣ 1826 года часть VII N 3-й, съ приложеніемъ черщежа аппарата, нужнаго для приготовленія сего состава; а 1828 года въ части X N 2 и 3-й съ подробностію показаны разные случаи и болѣзни, въ томъ числѣ заразительныя и чумныя горячки (*febres pestilenciales*), въ коихъ средствѣ сие можетъ быть съ пользою

*) Мѣсто, гдѣ выспавляются въ Парижѣ трупы ушопшихъ, или вообще найденныхъ полиціею.

употребляемо. Сверхъ того въ Фармакографіи Г-на Профессора Императорской Медико-Хирургической Академіи *Нелюбина*, изданной въ 1827 году, описаны также: способъ приготовленія хлориновой соды, качества оной, дѣйствіе на плѣло человеческое или вообще на животную экономію и показаны болѣзни, въ копорыхъ соль сія можешь быть употребляема.

Въ 1827 году хлориновая извѣсть введена въ употребленіе въ Кавказскомъ Корпусѣ въ разныхъ госпиталяхъ, лазаретахъ и карантинныхъ на Турецкой границѣ заставкахъ, и сверхъ того снабжена Тифлисская казенная аптека полнымъ химическимъ приборомъ для войскъ, госпиталей и лазаретовъ, въ ономъ краю находящихся. Въ томъ же году симъ средствомъ были снабжены С. Пепербургскія и въ окрестностяхъ столицы находящіеся госпитали и лазареты; а 1828 года обѣ вышесказанныя соли, ш. е., хлориновая извѣсть и таковая же сода включены мною въ новые госпитальные каatalogи, какъ по Военно-сухопутному, такъ и по Морскому вѣдомствамъ, изъ коихъ первой и отправлено уже во 2-ю армію 350, а другой 130 фунтовъ.

Употребленіе хлориновыхъ препаратовъ.

§ 26. При всѣхъ заразительныхъ болѣзняхъ комнаты больныхъ надлежитъ опрыскивать растворомъ хлориновой извести два раза въ день, или чаще, если болѣзнь слишкомъ злокачественна или комнаты очень пѣсны. Можно оставлять и въ комнатѣ больного нѣкоторое количество сего раствора, прибавивъ къ нему немного квасцовъ, или въ шарелкѣ или въ другой какой либо посудѣ. Если очень много людей живетъ въ одномъ домѣ, или когда зараза слишкомъ быстро распространяется, то надобно симъ растворомъ опрыскивать и смежныя комнаты и самые коридоры. Врачи, фельдшера и даже прислуга должны всегда имѣть съ собою сплѣтничку съ сею жидкостью, и находясь около больного или разговаривая съ нимъ, нюхать оную, накапывая въ тоже время нѣсколько на полъ и кровать больного.

Бѣлье постельное, споловое, рубахи, подштанники, чулки, колпаки и прочія мягкія вещи, принадлежавшія и употреблявшіяся больными, одержимыми заразительными и прилипчивыми болѣзнями, намачивать въ рас-

пворѣ хлориновой извести и попомъ вымывать въ рѣчной водѣ; плащѣ же суконное, особенно цвѣтное: мундиръ, брюки, фраки, серпуки, шинели и проч. окуривать хлориновыми или другими въ §§ 21 и 22-мъ изложенными куреніями.

Приготовление хлориновой извести.

§ 27. Для приготовления раствора хлориновой извести (*solutio chlorureti calcis*) надлежитъ взять одну часть концентрированной извести (*chloruretum calcis concentratum*) и растворить въ тридцати частяхъ воды, следовательно полфунта сей соли на пятнадцать фунтовъ воды.

§ 28. Для воспрепятствования гніенію труповъ до погребенія оныхъ должно растворить одну часть концентрированной хлориновой извести въ сорока частяхъ воды и обливать симъ растворомъ мертвое тѣло, или опрыскивать оное чрезъ рѣшето или лейку, повторяя сіе два раза въ день, или чаще, смотря по температурѣ воздуха и степени гнилости. Если гнилость очень велика, или надобно долгое время беречь мертвое тѣло, тогда гораздо лучше обернуть оное въ сукно или

фланель, предварительно намоченная въ семь распворѣ и чаще перемѣнять оныя. Симиъ средствомъ совершенно уничтожились прупный смрадъ въ комнаѣ.

Хлориновая сода.

§ 29. Распворъ хлориновой соды (*olutio chlorureti oxydi sodii*) приготавливается такимъ же образомъ какъ распворъ хлориновой извести, и употребляется во всѣхъ шѣхъ случаяхъ и съ такимъ же успѣхомъ, какъ сей послѣдній.

Распворъ хлориновой соды употребляется преимущественно вдури. Онъ приготавливается изъ одной части сухой хлориновой соды, распворенной въ десяти частяхъ воды. *Примѣ:* отъ 5 до 10-ти капель каждые два часа въ какой либо микспурѣ или по 20-ти капель ушромъ и вечеромъ въ ячномъ или другомъ слизисномъ опварѣ.

Само собою разумѣется, что и при употребленіи сихъ солей, какъ предохранительныхъ средствъ отъ зараженія, не должно забывать о чиспошѣ, опрятности шѣла, обмываніи, провѣшриваніи комнаѣ и ш. п.

✱

Примѣчаніе. Поелику нѣсколько заразы-
тельныхъ болѣзней могутъ свирѣпствовать
въ одно и тоже время, то важное дѣло со
стороны Врача сдѣлать правильное опредѣ-
леніи каждой болѣзни, дабы не принять одной
за другую. Слѣдствія таковой ошибки по-
нятны. Особенно это надобно разумѣть о
гнилой горячкѣ и чумѣ. Чрезвычайно скорое
печеніе сей послѣдней (она убиваетъ иногда
больнаго въ нѣсколько часовъ: 12, 24 и 48,
прежде нежели появятся бубоны, антраксы
и карбункулы) отличаетъ ее отъ гнилой го-
рячки. Впрочемъ наши Врачи, имѣя въ ру-
кахъ своихъ Военно-Медицинскій Журналъ,
въ коемъ помѣщена спашья моя, напечатан-
ная сверхъ того двумя изданіями отдѣльно,
о распознаваніи, свойствѣ, причинахъ, пред-
сказаніи и лѣченіи чумы, безъ сомнѣнія, не
имѣютъ надобности въ дальнѣйшемъ поясне-
ніи сего предмета.

II.

О жизненных припасахъ, какъ предметъ Медицинской Полиціи.

(Продолженіе.)

Распознаваніе порчи и подмѣсей хлѣбной пищи.

Предметъ сей измѣняется по различію причинъ, отъ коихъ зависить самое измѣненіе въ качествѣ хлѣбныхъ зеренъ, хлѣбной муки и приготовляемаго изъ оныхъ хлѣба. Необходимо также для опкрытія всѣхъ подмѣсей и порчи хлѣбныхъ составовъ знаніе доброты и естественнаго качества оныхъ. Посему распознаваніе сіе основывается

Во первыхъ, на показаніи недоспапка естественныхъ качествъ. Къ хорошимъ же качествамъ относятся:

1. Въ хлѣбныхъ зернахъ.

а) Внѣшняя кожица зеренъ тонкая, въ ржаныхъ желтоватая, а въ пшеничныхъ желтая. Чѣмъ тонѣе сія кожица, тѣмъ лучше

зерна. Наилучшія посему зерна суть тѣ, чрезъ шелуху коихъ просвѣчиваетъ мучное вещество.

б) Совершенная зрѣлость, сухость и шведость зеренъ. Сіе узнается тѣмъ, что при высыпаніи зеренъ производятъ они примѣтный стукъ, между зубами распрескивающа и раскушенные представляютъ надлежащее количество и качество мучнаго вещества.

в) Надлежащая шажестъ и вѣсъ. По Австрійскому Положенію *) мѣрка (Metze) хорошихъ ржанныхъ зеренъ должна вѣсить не менѣе 76-ти фунтовъ: ибо въ противномъ случаѣ зерна имѣютъ болѣе шелухи, нежели мучнаго вещества, и пошому даютъ худую, непитапельную муку. Изъ одного ценшнера хорошихъ ржанныхъ зеренъ получается 95 фунтовъ муки и 3 фунта опрубей **). При семъ однако особенное вниманіе заслуживаютъ: почва земли, на которой выросли хлѣбныя зерна, качество погоды, время года, о чемъ упомянуто будетъ при пробѣ муки по вѣсу.

*) Isfordink. Пр. Соч. I. В. стр. 236. (§ 153).

**) Ehrhart. Прив. Соч. 2. Ч. стр. 389.

2) *Въ хлѣбной мукѣ.*

а) Равнообразный цвѣтъ, свойственный мукѣ вкусъ и запахъ.

б) Во рту, смѣшавшись со слюною, образуетъ кашицу или лепешку и на зубахъ не хруститъ.

в) Совершенная сухость, которая узнается изъ того, что мука, сдвленная въ рукѣ, высыпается опять легко и скоро.

г) Въ чистой водѣ растворяется совершенно и принимаетъ видъ пѣсы.

д) Надлежащій вѣсъ и тяжесть. Вообще полагаются, разумѣя старую Французскую мѣру, что кубическій дюймъ хорошей ржаной муки вѣситъ 86 гранъ, а пшеничной же дюймъ крупичатой муки 110 гранъ Алпеккарскихъ *). Для опредѣленія сего вѣса требуется способный сосудъ; но припомъ замѣтитъ нужно, что вѣсъ муки, подмѣшанной посторонними веществами, или крупно смолотой, увеличивзается, а качество въ пшеничной же мѣрѣ понижается. Извѣстно также, что мука, полученная изъ зеренъ, собранныхъ не въ одинъ годъ, а въ разные време-

*) Isfordink. Прив. Соч. 1. Ч. стр. 249—250.

на и въ разныхъ спранахъ, имѣетъ весьма различный вѣсъ, зависящій отъ бѣльшей или мѣньшей зрѣлости самыхъ зеренъ. Сухость или влажность воздушной атмосферы и времени года также участвуютъ въ измѣненіи вѣса муки. Посему-то проба муки по вѣсу въ одной спранѣ не можетъ служить для другой спраны, и проба одного года не можетъ служить для другого года. Чтобы пособить, по возможности, сему недоспадку, нужно взять равное количество чистой и подозрительной муки и свѣсить порознь въ обыкновенномъ спаканѣ. Если присемъ окажется весьма малая разниа въ вѣсѣ, то сіе не доказываетъ еще худыхъ качествъ муки.

3) *Въ самолюбъ хлѣбъ.*

а) Свѣжее и хорошее кислое тѣсто имѣетъ едва примѣтный запахъ. Касательно дрожжей, если капля оныхъ, пущенная въ кипячую воду, плаваютъ на поверхности воды, то сіе означаетъ хорошее качество дрожжей.

б) Испеченный хлѣбъ имѣетъ равномерный, добротъ взятой муки соотвѣтствующій цвѣтъ корки и мякнша, запахъ и вкусъ

непротивный. Если поспучашъ перстами въ нижнюю поверхность хлѣба, то слышится примѣтный звукъ.

в) Испеченный и оспывшій уже хлѣбъ, при давленіи и разрѣзываніи онаго, оказываесть надлежащую упругость, а при взвѣшиваніи должную тяжесть. Ноздреватость хорошо испеченнаго хлѣба опличается тѣмъ, что въ мякишѣ замѣчаются многочисленные дырочки или клѣшочки, имѣющія одинаковую, равномерную, неизлишнюю величину. Въсь хорошо выпеченнаго хлѣба всегда соотвѣтствуетъ величинѣ его. Мякишъ его не крошится, но также не имѣесть примѣтной клейкости. Сдѣланное перстами вдавленіе въ мякишѣ поспѣхъ исчезаетъ.

г. Если сперешъ одну часть такого хлѣба съ 20-ю частями перегнанной воды, охладить сію смѣсь и дать ей опспояться, то на днѣ сосуда, по слипшіи жидкости, не замѣчается твердаго осадка.

д) Хорошіе сухари узнаются изъ того, что когда бросають ихъ на полъ, то они разламываются и изломъ имѣють кристалловидный. Если сія проба дѣлается надъ сухаремъ свѣжеиспеченнымъ, то въ изломѣ его

бываетъ еще нѣсколько влажности, которая однакожъ при надлежащемъ, чрезъ 14 дней, провѣшриваніи сухарей совершенно шеряется.

Во вторыхъ, на показаніи присущствія постороннихъ качествъ. Къ худымъ качествамъ относятся

1) Въ хлѣбныхъ зернахъ.

а) Черно или буро-фіолетовый цвѣтъ нѣкоторыхъ зеренъ, означающій присущствіе рожковъ; внутренность зеренъ наполненная, вмѣсто мучнаго вещества, вонючею пылью и означающая головню, какъ по уже упомянуто при вычисленіи болѣзней хлѣбныхъ зеренъ. Оржавинъ можно заключать по весьма малому вѣсу хлѣбныхъ зеренъ.

б) Поросшія, заплѣлыя зерна, кромѣ пропивнаго, заплѣлаго запаха, будучи раскушены съ концовъ, представляютъ либо большій или меньшій недостатокъ мучнаго вещества, какъ по бываетъ въ поросшихъ зернахъ, либо одну только золу, какъ по бываетъ въ лежалыхъ, заплѣлыхъ зернахъ. Сверхъ того, ежели сырой хлѣбъ перевозится въ мѣшкахъ, то поросшія зерна представляютъ

ся въ видѣ роспковъ, подобныхъ мѣховому пуху.

в) Насѣкомыя между хлѣбными зернами узнаются съ перваго взгляду. Если на верхнемъ слоѣ зеренъ, долго хранимыхъ, примѣчается весною блестящая кожица, то симъ означаетъ присущіе бѣлаго червя.

г) Поспоронія вещества, сѣмена ядовитыхъ расеній, смѣшанныя съ хлѣбными зернами, равно также примѣсь песку, земли, оплечаются опъ хлѣбныхъ зеренъ весьма явственно своимъ видомъ.

2) Въ хлѣбной муцѣ.

а) Черноватый, бурый, или буро-фіолетовый цвѣтъ муки, зависящій опъ головни, или рожковъ, либо правяныхъ сѣмянъ, смолопыхъ вмѣстѣ съ хлѣбными зернами.

б) Дабы увѣришься въ томъ, что мука пригопвлена изъ шѣхъ хлѣбныхъ зеренъ, которыя поступили въ мѣльницу, то, по совѣту *Исфординка* *), нужно взять для пробы изъ каждаго мѣшка нѣкопору чась зеренъ и хранишь оную подъ печашью; по-

*) Прив. Соч. I. Ч. стр. 249. (§. 139).

помъ, въ случаѣ подозрѣнія, мелешся сія часть подъ спрогимъ присмопромъ, пекутся изъ оной хлѣбы и сравниваюцца съ хлѣбами, пригопвленными изъ подозрительной муки. Если же симъ способомъ не возможно увѣрился въ подмѣси хорошей муки худою, или даже ячменною, гороховою, или другою мукою: то нужно изъ обоихъ видовъ муки произвествъ возгонку спирта. Крѣпость и количество сего спирта покажутъ разницу въ качествахъ той и другой муки. Другой для сего способъ есть проба по вѣсу, или сравненіе специфическаго вѣса каждаго сорта муки. Впрочемъ весьма значительное различіе въ вѣсѣ предполагаетъ, большею частию, примѣсъ къ мукамъ постороннихъ тяжелыхъ веществъ: извести, мѣлу, свинцовыхъ бѣлилъ, песку и проч. Наконецъ измѣненный запахъ (гороховый и проч.) и вкусъ (щелочный и проч.) муки показываютъ также весьма значительную примѣсъ постороннихъ веществъ. Въ семъ послѣднемъ случаѣ, если часть муки положить въ стаканъ, налить водою, болтать и потомъ оставить въ покой: то на поверхности воды образуется грязная желтобурая слизъ съ пѣною, доказывающая при-

мѣсь гороховой, бобовой муки, или же смо-
лопыхъ корней и корокъ древесныхъ. Въ
Провіантскихъ Регулахъ *) о семъ сказано
слѣдующее: „Буде же подрядный или обще-
„спвенно купленный, также и по перевозкѣ
„водою и сухимъ путемъ провіантъ приве-
„зень будеть, то оный пробовать нарочно
„для того сдѣланными желѣзными совками,
„опуская ихъ внутрь кулей, шокмо безъ по-
„врежденія оныхъ, и выпаскивая смопрѣшь,
„во всемъ ли то, какъ выше показано и въ
„договорахъ съ подрядчиками и продавцами
„предписано будеть, въ дачу годно; а при-
„шомъ мука ржаная не мѣшаналь съ какою
„другою, яко то съ овсяною и ячною, крупа
„овсяная съ ячною и гречневою и нѣтъ ли
„шущь другихъ какихъ примѣсовъ; а сверхъ
„того въ ячменной крупѣ наблюдать, не
„смѣшеноль съ оною ржанныхъ крупъ. А по-
„неже того ни чрезъ какую пробу узнашь,
„ниже въ скорости усмопрѣшь будеть не
„возможно, какъ чрезъ вареніе каши: того
„ради для надежнѣйшей пробы варить кашу,

*) Что наблюдать при приѣмѣ подряднаго и изъ
магазинновъ привезеннаго провіанта. Пров. Рег.
стр. 118. П. 3.

„и оную употребляя, чрезъ вкусъ разбирать“
и ш. д.

в) Мука, подмѣшанная пескомъ, хруспитъ между зубами. Если пакую муку развеспи водою, то присутствіе песку толчасъ откроется тѣмъ, что вещество сіе, тяжелое и нераспворяющееся въ водѣ, осядетъ на днѣ сосуда. Опъ прибавленія сѣрной и селипреной кислотъ осадокъ сей весьма мало распворяется и тѣмъ ясно показывается свойство голышевой земли.

г) Примѣсь гипса узнается чрезъ то, когда два унца муки варятся нѣсколько минуть въ одномъ фунтѣ перегнанной воды. Присемъ мука распускается въ водѣ, а гипсъ осядетъ на дно. Процѣдивши жидкость, должно осадокъ варить въ достаточномъ для распворенія его количествѣ перегнанной воды. Полномъ процѣженный сей опваръ смѣшивается съ баритовою водою, опъ чего произойдетъ бѣлый осадокъ (*sulphas barytae*), нераспворяющійся ни въ водѣ, ни въ селипреной кислотѣ. Если вмѣсто баритовой воды прибавитъ щавелекислый амміакъ (*oxalas ammoniae*), то произойдетъ бѣлый осадокъ (*oxalas calcis*), распворяющійся въ селипре-

ной кислотѣ и превращающійся въ живую извѣсть при накаливаніи въ пилглѣ до красноты.

Однако примѣсь къ мукѣ весьма малаго количества гипса симъ способомъ не опкрываеиъ. Въ такомъ случаѣ необходимо нужно мукѣ около получаса накаливать въ пилглѣ для того, чтобы оную разложишь и превратить въ золу. Опъ сего сѣрная кислота гипса разлагаеиъ и гипсъ превращаеиъ въ сѣрную извѣсть (*zolphuretum calcis*), которая опъ прибавленія селипреной кислоты потчасъ отдѣляетъ сѣроводородный газъ, причемъ извѣсть растворяеиъ въ селипреной кислотѣ. Сей растворъ (*nitras calcis*) процѣженный опъ прибавленія щавелекислаго амміака производишь бѣлый осадокъ (*oxalas calcis*).

д) Примѣсь мѣлу узнаеиъ чрезъ разведеніе муки въ кипячей водѣ, опъ чего мѣлъ, по нерасстворимости своей, опадаеиъ на дно и послѣ процѣженія получаеиъ въ порошкообразномъ видѣ. Порошокъ сей растворяеиъ съ шипѣніемъ въ селипреной кислотѣ. Растворъ сей (*nitras calcis*) опъ прибавленія щавелекислаго амміака производишь бѣлый

осадокъ, растворяющійся въ селипреной кислотѣ и превращающійся чрезъ накаливаніе въ пилгъ въ живую извѣсь.

е) Примѣсъ древесной золы узнается чрезъ наливаніе воды на муку, опъ чего на поверхности воды образуется грязная сѣрая плъна или пленка, а вода, особливо при значительномъ количествѣ золы, получаетъ щелочный вкусъ и погруженная въ оную лакмусовая бумага, окрашенная уже кислотою, получаетъ прежній свой синій цвѣтъ.

Примѣсъ золы изъ костей узнается чрезъ раствореніе муки въ кипячей водѣ, опъ чего дѣлается осадокъ, который, бывъ высушенъ, совершенно растворяется въ селипреной кислотѣ. Опъ прибавленія къ сему раствору малаго количества щавелевой кислоты дѣлается бѣлый осадокъ, такъ что въ растворѣ останеся только селипреная и фосфорная кислота; сія послѣдняя чрезъ выпариваніе превращается въ сухой, хощя и нечистый видъ.

ж) Мука подмоченная образуетъ шарики, имѣющіе зеленый или желтоватый цвѣтъ, съ весьма пропивнымъ заплхлымъ запахомъ.

з) Лежалая, испорченная мука имѣеть отвратительный запахъ и вкусъ и превращается припомъ въ гнилые шарики. При мѣньшей степени порчи печется для пробы одинъ хлѣбъ изъ шаковой муки, или же сравнивается количество и качество спирта, выгнаннаго изъ равныхъ частей здоровой и испорченной муки.

и) Насѣкомыя въ мукѣ узнаются, но весьма невѣрно, посредствомъ зрѣнія. Червячки сіи открываются въ разбитой мукѣ чрезъ весьма тонкія линіи, подобно какъ и земляные черви на свѣжей землѣ, или же какъ, разумѣя весьма увеличенный масштабъ, кучки кротовъ на поверхности земли. Бѣлый червь образуетъ въ мукѣ столь тонкую нитку, что нити ея не могутъ быть открыты посредствомъ зрѣнія. Посему онъ узнается болѣе по нѣкошорой блестящей бѣлизнѣ, употребляемой въ видѣ пятенъ на мукѣ.

і) Для открытія свинцовыхъ бѣлизъ (sub-carbonaz plumbi) въ мукѣ должно оную варить съ кипячею водою, чрезъ что бѣлила опадають на дно сосуда. Послѣ процѣженія остающійся бѣлый осадокъ растворяется съ шипѣніемъ въ селифреной кислотѣ. Рас-

пловоръ сей (*nitras plumbi*) опъ прибавленія щелочей, или же сѣрной либо соляной кислоты, производить бѣлый осадокъ; хроміекислый поппашъ (*chromias potassæ*) производить въ семь распворъ желтый осадокъ, а сѣроводородокислая соли (*hydrosulphates*) осаждаютъ оный чернымъ цвѣпомъ. Чрезъ накаливаніе въ закрытомъ пиглѣ шакого осадка получается металлическій свинецъ (*regulus plumbi*).

к) Висмутовья бѣлила (*subnitras bismuthi*), находящіяся въ мукѣ, чрезъ прибавленіе кипячей воды осаждаются на дно сосуда. Осадокъ сей опъ прибавленія крѣпкой сѣрной кислоты производить бѣлые пары (*varores acidî nitrici*), а въ селипреной кислотѣ растворяется, и если распворъ смѣшавъ мало помалу съ равнымъ количествомъ чистой воды, то дѣлается весьма бѣлый осадокъ (*oxydum bismuthi, blanc d'Espagne*). Наконецъ если сей осадокъ, кипячею водою въ мукѣ произведенный, съ угольнымъ порошкомъ около получаса накаливать въ пиглѣ, то получится металлическій висмутъ (*reg. bismuthi*).

л) Примѣсь попаша (subcarbonas potassæ) опкрывається слѣдующимъ образомъ: надлежитъ болтать нѣсколько времени муку съ перегнанною водою; послѣ 24-хъ часовъ слить жидкость, которая, по причинѣ распвореннаго въ ней попаша, зеленитъ фіалковый сиропъ, вскипаеть съ кислотами, а опъ прибавленія распвора солекислой плашины (hydrochloras platinæ) даеть свѣпложелтый осадокъ. Припомъ мука сія имѣеть щелочный вкусъ.

м) Для опкрыпія квасцовъ въ мукѣ нужно одну часть муки болтать съ 6-ю частями перегнанной воды; послѣ 24-хъ часовъ процѣживають жидкость, которая будеть имѣть легко спягивающій вкусъ и опъ прибавленія амміака, углекислаго попаша, солянокислаго барита производить бѣлый осадокъ. Другую часть жидкости выпаривають и чрезъ сіе получаютъ 8-миугольные кристаллы квасцовъ.

Если же кромѣ квасцовъ мука содержитъ и ялапный корень, то для опкрыпія сихъ подмѣсей мука взбалпывается съ алкогolemъ въ 36°. По испеченіи 30-36-ти часовъ сливается алкоголь, распворившій часть ялапной смолы и неизмѣнившій припомъ ни-

*

мало квасцовъ. Прсѣженная попомъ жидкость желтовапаго цвѣша получаетъ отъ прибавленія воды бѣлый осадокъ (gesina jalarrae). Либо чрезъ выпариваніе жидкости сей получается оспапокъ желпаго цвѣша и горькаго вкуса. Послѣ сего присутствіе квасцовъ открывається вышепредложеннымъ способомъ.

3) Въ саомѣ хлѣбѣ.

а) Старое кислое тѣсто издаетъ весьма сильный кислый запахъ и сообщаетъ испеченному хлѣбу непріятный, кислый вкусъ. Хлѣбъ такой весьма плохень; мякишъ его не имѣетъ дыречекъ или ноздреватости, а корка весьма водяниста. Касательна худыхъ дрожжей, капля оныхъ, пущенная въ кипячую воду, опускается на дно сосуда.

Тѣсто хлѣбное, приготовленное изъ ржаной муки или пшеничной, но припомъ подмѣшанной гороховою или бобовою мукою, имѣетъ, смотря по количеству примѣси, большую или меньшую бѣлизну, пыгучесть и пахнетъ бобами или горохомъ. Тоже замѣчается и въ хлѣбѣ. Если, говорить Эр-

гартъ *), мякишъ, опдѣленный отъ корки хлѣба, скоро засыхаетъ, или же ежели корка сама по себѣ отспаивъ отъ мякиша, то сіе значить, что къ ржаной мукѣ примѣшана ячменная.

б) Недопеченный хлѣбъ имѣетъ несоразмѣрную тяжесть и клейкость. Хлѣбъ, внутри пустой, съ малою частію мякиша, такъ же сжатый, сморщенный, твердый, влажный, лежалый, плесенью, червями покрытый, кислый,—все сіи порчи узнаются съ перваго взгляду, а также по запаху и вкусу.

в) Цвѣтъ хлѣба фіолетовый, бурый, темный зависить нерѣдко отъ рожковъ, головни и другихъ примѣсей. Сладковатое — приятный вкусъ хлѣба означаетъ примѣсь медавицы. Хлѣбъ, приготовленный изъ заплесневѣлой, испорченной муки, имѣетъ проливной вкусъ; если же хлѣбъ приготовленъ изъ муки, смѣшанной съ рожками, то фіолетовый составъ его распадается и крошится весьма удобно. Впрочемъ очевидно примѣси сего рода узнаются болѣе по дѣйствию своему, нежели по физическимъ и химическимъ знакамъ.

*) L. C. 2. B. S. 591.

г) Попашъ, примѣшиваемый, особливо кондиторами, къ здобнымъ хлѣбамъ, узнается нерѣдко по мыльному вкусу хлѣба, равно какъ хлѣбъ, содержащій въ себѣ песокъ, хрустиптъ между зубами. Для точнѣйшаго же опкрытія въ хлѣбѣ песку, гипса, мѣла, свинцовыхъ и висмутовыхъ бѣлилъ, углекислаго попаша, квасцовъ, ялапнаго корня, нужно мякишъ хлѣба, издробленный въ кусочки, настоятъ въ доспапочномъ количествѣ перегнанной воды около 24-хъ часовъ. Опъ сего гипсъ, попашъ углекислый, квасцы распворятсѣ, а песокъ, мѣлъ, свинцовыя и висмутовыя бѣлила осядутъ на дно. Посему процѣженные растворы должны быть подвергнуты испытаніямъ, каковыя при подмѣси муки для каждаго изъ сихъ веществъ въ особенноти назначены (см. спр. 226-228). Чпюжъ касается до осадка, то песокъ узнается по своимъ физическимъ и химическимъ качествамъ (спр. 226); мѣлъ же и бѣлилы свинцовыя и висмутовыя чрезъ приращеніе къ осадку нѣсколькихъ капель селифреной кислоты потчасъ опкрываются чрезъ шипѣніе или бѣлыя пары (см. спр. 227 - 229 и 230) и чрезъ накаливаніе,

д) Зола древесная и зола изъ костей опкрываются въ хлѣбъ также, какъ и въ мукъ (спр. 228).

е) Сухари подмоченные, разѣденные червями, смѣшанные съ кусками глины или кирпичей, испорченные, узнаются съ перваго взгляду и чрезъ разламываніе оныхъ.

ж) Если хлѣбъ содержитъ въ себѣ свинецъ или мѣдь отъ того, что кислое вещество хранилось въ посудѣ изъ сихъ металловъ: то надлежитъ таковой хлѣбъ смѣшивать съ прѣжними (по вѣсу) воды, смѣшанной съ перегнаннымъ уксусомъ. По прошествіи одного часа растворъ процѣживается и испаривается такъ, какъ водяной растворъ уксусокислого свинца или уксусокислой мѣди. Поэтому для опкрытія свинца прибавляется къ сему раствору по каплямъ Ганьеманова проба (*Aqua hydrosulphurata acidula. Ph. C. R.*); отъ сего произойдетъ темный осадокъ. Но чтобы опредѣлить количество примѣшаннаго свинца, нужно значительную часть таковаго хлѣба накаливать, крѣпко и долго, въ закрытомъ шиглѣ; чрезъ сіе получится свинецъ въ металлическомъ своемъ видѣ (*regulus plumbi*).

Такимъ же образомъ открывається и мѣдъ, съ тою только разницею, что для открыванія мѣди употребляется обыкновенно водяной растворъ амміака (*solutio aquosa ammoniacae*), отъ котораго въ семь случаевъ дѣлается голубой осадокъ. Если бы чрезъ накаливаніе хлѣба не возможно было открыть чистой или металлической мѣди потому, что она находится здѣсь въ весьма маломъ количествѣ: то нужно прибавить къ накаленной смѣси селитреную кислоту; отъ сего произойдетъ селитроокислая мѣдъ, которая удобно растворяется въ водѣ и отъ прибавленія амміака получаетъ извѣстный голубой осадокъ,

З Е Л Е Н Ь.

Виды порчи и подмѣсей зелени. Виды сіи суть безчисленны, какъ по множеству самой зелени, такъ и по разнообразію причинъ порчи и подмѣси. Разумѣя употребительнѣйшую, почти необходимую въ нашихъ справкахъ зелень, главнѣйшіе виды порчи и подмѣсей ея заключающія вообще въ слѣдующихъ шрехъ:

- 1) Болѣзненное состояніе зелени.
- 2) Незрѣлость и перезрѣлость зелени.
- 3) Смѣшеніе ядомой зелени съ вредными веществами.

Причины порчи и подлѣсвой зелени. Причины сіи, сообразно съ вышесказаннымъ, имѣють проякое начало, а именно:

1) Подобно хлѣбнымъ распеніямъ, зелень подвергается болѣзнямъ или еще во время прозябанія своего, или уже во время храненія ея для домашнихъ и торговыхъ расходовъ. Къ первымъ принадлежатъ: блѣдная немочь, водяная болѣзнь, сухопка, зарожденіе насѣкомыхъ и червей, омертвѣніе, изъязвленіе, накипь. Къ послѣднимъ относящся: заплѣснѣвая, заплѣлая, гнилая зелень.

Блѣдная немочь (*Chlorosis*) обнаруживается появленіемъ на зелени блѣдной краски и зависить опъ недоспащочнаго вліянія свѣла и теплоты; чрезъ что накаплиется кислородъ въ распеніяхъ. Посему распенія, прозябающія въ темныхъ подземельныхъ мѣстахъ, обыкновенно подвергаются блѣдной немочи; посему и листки, вырастающіе изъ корней, хранимыхъ въ погребахъ, всегда бы-

вають блѣдны. Часто болѣзнь сію причиняють насѣкомыя, и тогда она неизлѣчима.

Водяная болѣзнь (*Cachexia hydropica*) происходитъ отъ того, когда растение всасываетъ въ себя весьма много воды; послѣ чего наступаетъ гнилость. Совершенно развившаяся болѣзнь сія всегда почти неизлѣчима.

Сухопка (*Atrophia*) зависитъ отъ недостаточнаго питанія, или чрезмѣрнаго цвѣтенія. Насѣкомыя также бываютъ причиною сей почти неизлѣчимой болѣзни.

Зарожденіе насѣкомыхъ и червей (*Phthyrasis et Helminthiasis*) обнаруживается тѣмъ, что цѣлое растение покрывается только насѣкомыми, каковы сушь: правяная шля (*Arhis*), червечникъ (*Cossus*. L.), паукъ; или же листья плода либо корень растенія разѣдаются личинками насѣкомыхъ.

Омертвѣніе (*Sphacelus*) состоитъ либо въ чернотѣ и засухлости листовъ, даже цѣлаго растенія (*sphacelus siccus*), либо въ появленіи гнилой сукровицы, которою наполняются части растенія (*sphacelus humidus*). Съ одной стороны чрезмѣрный холодъ и жаръ, а съ другой весьма водянистая, жирная почва

и внѣшнія насилія причиняють сію неисцѣлимую болѣзнь.

Изъязвленіе (Exulceratio) есть такое болѣзненное состояніе, когда изъ разстпроенной части распенія выпекаетъ ѣдка я жидкость. Подобно язвамъ у животнохъ, болѣзнь сія происходитъ либо отъ внушренняго худосочія, либо отъ внѣшнихъ насилій, укушенія насѣкомыхъ и проч. Если присемъ цѣлое распеніе имѣетъ сочные зеленые листы и зрѣлые плоды, то, за исключеніемъ больнаго мѣста, можно оное употреблять въ пищу безъ вреда. При проливныхъ обстоятельствахъ вредъ дѣлается очевиднымъ.

Накипь (Crusta) есть появленіе на распеніяхъ либо бѣловатой слизистой оболочки, имѣющей видъ муки (*crusta farinosa*), либо налетъ сей состоитъ изъ клейкаго, прозрачнаго, сладкаго сока (*crusta mellita*), бывающаго на распеніяхъ особливо въ жаркое время. Причиною перваго вида накипи бывають частію мелкія распенія, частію же правая пня, покрывающая листы распенія бѣлою слизью. Второй родъ накипи есть сокъ, опдѣленный изъ желѣзки правой пни *).

*) Von den Mitteln und Wegen die mannichfalti-

Кромѣ сего падаютъ на расшенія вмѣстѣ съ росой вредныя ядовитыя вещества, особливо въ сосѣдствѣ горныхъ заводовъ и также фабрикъ, изъ коихъ испускается много сѣрно и солянокислыхъ паровъ и газовъ. По опытамъ Единбургскихъ Профессоровъ *Крайстинсона* и *Торнера* *), газы сіи производятъ увяданіе листовъ, какое обыкновенно слѣдуетъ только осенью. Одна десятипысячная часть сихъ газовъ произвела сказанное дѣйствіе въ продолженіе 48-ми часовъ.

Заплѣснѣвая, заплѣлая, гнилая зелень есть только различная степень одного и того же болѣзненнаго измѣненія, именно, броженія. Несоразмѣрность въ температурѣ и влажность принадлежатъ конечно къ главнѣйшимъ причинамъ сего измѣненія свѣже-собранный зелени, точно такъ, какъ и порча всѣхъ вообще припасовъ, скорѣе же всего мясныхъ, зависить отъ сихъ же самыхъ все-

gen Verfälschungen sämtlicher Lebensmittel zu erkennen etc. von Jos. Wilh. Knoblauch. Ersten Theils 2-te Abtheilung. Leipzig. 1810. стр. 591 - 592. (§ 22).

*) The Edinburgh Medical and Surgical Journal. N XCIII. October. 1827. 1. T.

общихъ вліяній (см. спаш. о живоїной пищѣ). Чрезмѣрный холодъ дѣйствуетъ на свѣжесобранную зелень весьма вреднымъ образомъ; едва распавшая зелень такая мгновенно переходитъ въ совершенную гнилость; напротивъ того равномерная теплота удерживаетъ зелень отъ гніенія. Опытъ показалъ, что виноградныя ягоды, сливы и другіе подобные плоды, погруженные въ колодезь, оставались цѣлыя мѣсяцы неиспорченными. Извѣстно далѣе, что сочные корни и плоды (яблоки, груши, сливы и проч.), содержащіе въ себѣ много водянистыхъ частей, шѣмъ скорѣе и удобнѣе гніють, чѣмъ большее оныхъ количество складывается въ одну кучу, чѣмъ болѣе слѣдственно раздавливаются они взаимно и согрѣваются. Картофель, рѣпа, морковь и другіе подобные корни, очищенные отъ земли и мочекъ, оцарапанные, порѣзанные, перяють чрезъ испарину свои влаги и портятся. Съ другой однакожь спорны удаленіе зелени отъ всеобщихъ вліяній можетъ также при извѣстныхъ обстоятельствахъ содѣйствовать, болѣе или менѣе, къ ея порчѣ. Такъ сочные корни и плоды, хранимыя въ сухомъ мѣстѣ, перяють свою

свѣжестъ, морщатся и дѣлаются вялыми. И пакъ въ семъ отношеніи зелень весьма опличается опъ мяса и другихъ припасовъ.

2) Незрѣлая зелень не содержитъ еще въ себѣ надлежащаго количества питательныхъ частей, а перезрѣлая лишена уже оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не лзя ожидать здоровой пищи, которая при семъ условіи можетъ даже причинить очевидный вредъ. Такъ увѣряютъ, что пасернаковъ корень и селлери, находясь въ перезрѣломъ состояніи, или состарѣвшись, получаютъ ядовитое свойство *). Напрошивъ того незрѣлый карпфель нѣкоторые Врачи **) почитаютъ вреднымъ, а другіе ***) находятъ оный только менѣе питательнымъ. Бекманъ ****) старался даже доказать, что молодой карпфель болѣе удобоваримъ, нежели старый. Съ мнѣніемъ Бекмана соглашаются: Гейль, Регфельдъ, Геккеръ и Бремеръ *****).

*) Wildbebg. Прив. соч. стр. 70. *Прилѣж.*

**) Idem. Прив. соч.

***) Bernt. Прив. соч. I. В. стр. 297. (§ 757).

****) Physik. oekonom. Bibliothek. В. 19. стр. 68.

*****) Horn's Archiv f. med. Erfahrung. В. 7.

Послѣ каршофеля, незрѣлые плоды, употребляемые въ пищу, причиняють величайшій вредъ и бывають иногда причиною важныхъ болѣзней; однакожъ не безъ исключенія. Зеленые огурцы, примѣрно говоря, составляютъ здоровую, питательную, даже лакомую пищу; напропивъ того зрѣлые, а шѣмъ болѣе перезрѣлые огурцы шеряють много своей доброты. Сверхъ сего многія часпи распеній, особливо спручки, шелуха, стебли, листья и большіе корни, будучи еще и неперезрѣлыми, а шолько совершенно созрѣвшими, получають швердое, деревянистое качество. По сей-то причинѣ нѣкоторые писатели *) принимаютъ, въ Медико-Полицейскомъ смыслѣ, зрѣлость зелени совершенную **), дѣйствительную (*maturitas absoluta*) и относительную (*maturitas relativa*), разумѣя подъ именемъ послѣдней такое состоя-

*) Knoblauch. Прив. соч. I. Т. 2-te Abth. стр. 599 - 603.

**) Зрѣлостію называется, говоритъ *Несѣ ф. Эзенбекѣ*, окончательное произведение плодоваго отправления. v. Handbuch der Botanik v. C. G. Nees von Esenbeck. 2-ter Band. Nürnberg. 1821. стр. 472. (§ 162).

ніе, когда незрѣлая часть растенія составляетъ исключительно здоровую или, по крайней мѣрѣ, удобоваримую пищу. Поелику же, какъ само собою явствуетъ, границы между зрѣлостію зелени совершенною и опносительною весьма неопредѣлительны: по, руководствуясь опытомъ, утвердительно сказать можно только слѣдующее:

а) Ядомые корни растеній, производящихъ сѣмена и слѣдственно созрѣвающихъ не прежде двухъ или нѣсколькихъ лѣтъ, доставляютъ здоровую пищу въ незрѣломъ своемъ состояніи. Напримѣръ того ядомые корни растеній, производящихъ цвѣты и сѣмена въ теченіи перваго года, составляютъ здоровую пищу не прежде, какъ по совершенномъ созрѣніи самыхъ сѣмянъ. Морковный, свѣкольный, пастернаковый, рѣпный, рѣдечный и пепрушечный корни принадлежатъ къ первому разряду; а къ послѣднему преимущественно относится картофель.

б) Ядомые стебли растеній или части оныхъ составляютъ здоровую пищу въ самой только молодости своей.

в) Ядомые листья растеній питательны

и здоровы во всякое время, особенно же прежде совершенной своей зрѣлости.

г) Что принадлежитъ до ядомыхъ плодовъ, то прежде окончанія зрѣлости ихъ паппельны и здоровы супъ одни только шелушные плоды и огурцы.

3). Смѣшеніе ядомой зелени съ вредными веществами зависить отъ двухъ весьма важныхъ причинъ, а именно: отъ самаго собиранія распеній и отъ различнаго обработыванія или храненія собранныхъ уже распительныхъ веществъ.

Касательно самаго собиранія, многія ядомыя распенія внѣшнимъ видомъ своимъ сходствуютъ съ ядовитыми, изъ чего и явствуетъ удобность смѣшенія ядомыхъ съ ядовитыми, равно какъ и пагубное употребленіе послѣднихъ вмѣсто первыхъ.

Къ ядовитымъ распеніямъ, цѣлымъ или частямъ оныхъ, весьма сходнымъ по виду своему съ ядовитыми, принадлежатъ преимущественно слѣдующія:

а) Корень пастернаковый (*radix pastinacae sativae*).

Съ корнемъ симъ сходны: корень болиголова пшениснаго (*rad. conii maculati*), омела

ядовитаго (rad. cicutaе virosae), белены (rad. hyoscyami nigri), волкогуба рѣповиднаго или голубаго (rad. aconiti napelli), волкогуба желтаго (rad. aconiti lycoctoni).

б) Трава петрушечная (herba apii petroselini).

Съ сею травою сходствуютъ: права болиголова пятнистаго, омега ядовитаго, собачьей петрушки или малаго омега (herba aethusae cuparii), кервеля одуряющаго (herba cherophylli temulenti), кервеля луковистаго (h. cherophylli bulbosi).

в) Трава салатная (h. lactusae sativae).

Съ оною сходна права салата ядовитаго (h. lactusae virosae).

г) Спручки или сѣменники гороховые (legumina pisi sativi), чечевичные (leg. ervi lentis), Турецкихъ бобовъ (leg. phaseoli vulgaris).

Съ ними сходны сѣменники гороховаго деревца (legumina ervi ervillae), гороховника или горошка (leg. lathyri cicerae), мышьяго или бараньяго гороха (leg. ciceris arietini).

д) Ягоды вишень (bassae pruni cerasi).

Съ ними сходны ягоды красавицы или сонной одури (bassae atropae belladonae).

е). Ягоды брусники (*baccæ vaccini vitis idææ*).

Съ ними сходспвуютъ ягоды полокнянки (*baccæ arbuti uvæ ursi*).

ж) Сѣмена укропныя (*semina anethi foeniculi*).

Съ ними сходспвуютъ сѣмена белены (*sem. hyoscyami nigri*).

з) Сѣмена чернушки (*semina nigellæ sativæ*).

Съ ними сходны сѣмена дурмана (*sem. daturæ stramonii*).

и) Сыроѣжка (*agaricus caesareus*).

Съ оною сходспвуетъ мухоморъ (*agaricus muscarius*).

і) Печерица или шампиньонъ (*agaricus campestris*).

Съ оною сходспвуетъ поганка луковиспая (*agaricus bulbosus*).

к) Рыжикъ (*agaricus deliciosus*).

Съ нимъ сходспвуетъ поганка моровая (*agaricus pescator*) и также мухоморъ.

л) Волуй, волуекъ (*agaricus russula*).

Съ онымъ сходспвуетъ поганка рвошная (*agaricus emeticus*).



и) Сморокѣ, ядомый, выродиственный, великій (*phallus esculentus, patula, gigas*).

Съ ними сходствуютъ сморокѣ удовидный (*phallus impudicus*).

я) Трюфель, яспвенный, бѣлый, сѣрый, пахучій, лѣтній (*Tuber cibarium, album, griseum, moschatum, aestivum*).

Съ ними сходствуютъ: дождевикъ многообразный, бородавчатый, звѣздачатый (*lycoperdon proteus, verrucosum, stellatum*).

Обработываніе и храненіе собранной уже зелени даетъ поводъ къ вреднымъ подмѣсамъ, если для сего употребляется небрежно выжуженная мѣдная посуда, также свинцовая, нечистая оловянная, или же глиняная посуда, худо вымуравленная. Кромѣ сей подмѣси, зависящей большею частію отъ неосторожности и невѣденія, иногда продавцы нарочно кипящая уксусъ въ мѣдной посудѣ нечистой и попомъ въ жидкости сей намачиваютъ зелень для доставленія ей красиваго зелено-пурпурнаго цвѣта. Таковой умышленной, очевидно ядовитой подмѣси подвержены наиболѣе зеленые огурцы, бобы, зеленый горохъ, каперсы и другіе подобные плоды.

Предотвращеніе порчи и подмѣсей зелени.

Основываясь на удаленіи причинъ порчи и различныхъ поводовъ къ подмѣсамъ зелени, предотвращеніе сіе пребуесть въ отношеніи къ болѣзнямъ зелени, дабы почва земли, на коей прозябаесть зелень, имѣла надлежащее качество, дабы самое распеніе спояло въ благопріятномъ мѣспѣ. Для испребленія насѣкомыхъ въ зелени предложены разные способы, не всегда впрочемъ успѣшныя и безвредныя. Дабы сады и огороды доставляли безвредную зелень, то прежде всего пребуется, чтобы оныя находились въ совершенномъ удаленіи отъ горныхъ заводовъ и пакихъ фабрикъ, въ копорыхъ развивающіяся вредныя газы, сѣрно и соляно-кислыя пары; полученную же изъ пакихъ мѣспъ зелень нужно тщательнѣе вымывать, снимая кожуцу съ плодовъ и проч.

Чрезъ частое осматриваніе зеленыхъ рядовъ и погребовъ, наполненныхъ въ извѣстные времена года овощами и плодами, чрезъ соблюденіе въ сихъ мѣспахъ чистоты и чрезъ благоразумное раскладываніе зелени и плодовъ опивращаются отъ сихъ веществъ болѣзненныя измѣненія и гнилость. Впрочемъ,

поелику по вышесказанному порча зелени не всегда предопвращается совершеннымъ удаленіемъ вліяній теплоты и влажности; поелику также безвредное сохраненіе свѣже-собранной зелени весьма важно не только въ домашнемъ, но и въ торговомъ отношеніи: то изъ сего явствуетъ, что способы сбереженія зелени по самому различію обстоятельствъ суть и многочисленны и разнообразны.

Большая часть свѣже-собранной зелени употребляется поспѣху. Чѣмъ скорѣе сіе дѣлается, тѣмъ лучше. Если же свѣже-собранныя зелень не вдругъ употребляется, то, дабы она не потеряла душистости своей, полезно оную хранишь безъ предварительнаго обмыванія въ водѣ и каждый видъ зелени содержа въ отдѣльно, а не въ соприкосновеніи. Парей и селлери, находясь въ одной корзинѣ съ цвѣтною капустою, поршнятъ доброту послѣдней *). Сочные корни, плоды и травы полезно хранишь въ мѣспахъ про-

*) Сынъ Отечества. 1828. N 21 и 22. Сентябрь и Октябрь. стр. 114-115 и слѣд. О питательныхъ веществахъ и ихъ сбереженіи—изъ Dictionnaire portatif de Chimie etc. Paris. 1824. Перевелъ С. Усовъ.

хладныхъ, пѣнисныхъ и сырыхъ, не назначать для сего такихъ зернистыхъ и коспяныхъ плодовъ, которые собраны въ сырую, мокрую погоду, или шопчасъ послѣ сильнаго дождя, не скоплять правянистую зелень въ большія связки, но припомъ и не раскладывать порознь, а пучками; иначе зелень сія въ первомъ случаѣ задрѣваетъ, а въ послѣднемъ дрябнетъ и морщитъ. Поелику испареніе естественныхъ влагъ сберегаемой зелени можетъ также быть причиною порчи ея, то нужно для долгаго сбереженія выбирать зелень нераздавленную, неоцарапанную или изъязвленную, не снимать съ корней земли, не срывать волоконъ, и дабы, особливо коренья, не поросли, срѣзывать стебель повыше корня. Нѣжные плоды, собранные въ надлежащее время, особливо смородину, вишни, сливы, предложено сберегать въ закупоренныхъ бутылкахъ, поставленныхъ въ землю вверхъ дномъ. Виноградные грозды сохраняющіяся въ связкахъ чрезъ замазываніе стебельнаго опрѣза воскомъ, чрезъ зарываніе въ песокъ, опруби, опилки, просо, чрезъ погруженіе въ воду. Г. Анперъ *) предлагаетъ особенный способъ

*) Привед. ч. Сына Отечества, стр. 122-123.

сбереженія не только зелени, но и всѣхъ вообще припасовъ животныхъ и распительныхъ, самыхъ даже яспвѣ, какъ о семъ упомянуто въ спавѣ о животной пицѣ.

Дальнѣйшіе способы сбереженія зелени отъ порчи суть: обливаніе сахарнымъ сиропомъ или обсахариваніе, употребляемое особенно кондиторами, равно также обливаніе соками распеній, слизистыми и спуденистыми похлебками, сушеніе, соленіе, моченіе въ уксусѣ или другихъ стягивающихъ спиртныхъ жидкостяхъ. Цѣль при семъ есть очевидно таже, какъ и при искусственномъ сбереженія мяса; а потому предохранительныя мѣры, касательно всеобщихъ при семъ вліяній, посуды, чистоты соспавовъ, суть въ обоихъ случаяхъ однѣ и тѣже (см. спавью о животной пицѣ).

Дабы продажная зелень имѣла всегда надлежащую степень зрѣлости, нужно, чтобы привозимая въ города зелень осматриваема была присяжными свѣдущими правовѣдами и чтобы вещества сіи не продавались за городскими заспавами, а только на рынкахъ. Продавцы картофеля обязаны имѣть свидѣтельство въ томъ, что они выкопали картофель

иногда, когда съмынные коробочки его совершенно уже образовались и права начала сохнуть. По увѣренію нѣкоторыхъ, вредность молодого картофеля опнимаеяся тѣмъ, если предъ вареніемъ намочить оный въ водѣ и во время варенія прибавлять нѣсколько разъ свѣжую воду. Сіе однако пребуеъ еще подшверженія.

Для отпращенія печальныхъ слѣдствій, причиняемыхъ смѣшеніемъ ядомой зелени съ вредными веществами во время самого ея собиранія, могло бы конечно служить испребленіе дикораспущихъ ядовитыхъ растеній; но поелику многія изъ нихъ суть цѣлительныя средства, то ни испребленіе ихъ, ни разведеніе въ однихъ только врачебныхъ садахъ, какъ то нѣкоторые предлагають, не можетъ принести пользы, тѣмъ болѣе, что въ семъ послѣднемъ случаѣ теряють они цѣлительную свою силу. Посему Врачебно-Полицейскіе писатели совѣтують испреблять такія только ядовитыя травы, которыя вовсе безполезны. Равнымъ образомъ продажу ядомыхъ грибовъ совѣтують позволять не иначе, какъ послѣ строгаго оныхъ осмотра, или же, какъ то въ нѣкоторыхъ спра-

нахъ положено, дозволишь продажу однихъ только шампіоновъ, пружелей и мергелей, а прочіе всѣ запрешить. Порошокъ изъ шампіоновъ, продаваемый въ нѣкоторыхъ странахъ для соусовъ, фрикассе и другихъ яствъ, принадлежитъ очевидно къ непозволительнымъ припасамъ, потому что онъ легко можетъ состоять изъ смѣси ядовитыхъ грибовъ, трудно либо и вовсе нераспознаваемыхъ въ видѣ порошка.

Наконецъ, касательно смѣшенія зелени съ вредными веществами во время обработыванія и храненія ея, нужно, какъ то уже изъ вышесказаннаго явствуетъ, не допускать продажи такихъ огурцовъ, каперцовъ и другихъ плодовъ, которыми продавцы доставляютъ зеленый цвѣтъ чрезъ наспиваніе въ уксусъ, варенномъ въ мѣдной нелуженной посудѣ.

Распознаваніе порчи и подмѣсей зелени.

Сіе распознаваніе, основываясь на причинахъ самой порчи и подмѣсей, тѣмъ труднѣе, чѣмъ болѣе измѣненъ естественный видъ зелени. Оно требуетъ преимущественно Ботаническихъ знаковъ, иногда же и Хи-

мических дѣйствій и состоишь, по принятому нами порядку,

Во первыхъ, въ показаніи недостатка естественныхъ качествъ. Качества здоровой, хорошей и чистой зелени суть:

а) Цвѣтъ, запахъ, вкусъ естественный, свойственный каждому виду и роду зелени.

б) Естественная температура, плотность и цѣлость существа зелени.

в) Картофель, выкопанный въ то время, когда сѣменные коробочки сего растенія совершенно уже образовались и права начала вянуть, имѣеть надлежащую крѣпость, плотность и равнообразный цвѣтъ внутренняго своего существа; при свареніи удерживаетъ собственный вкусъ и запахъ; сваренный легко распускается въ водѣ.

г) Корень пастернаковый имѣеть фигуру веретенообразную, раздѣленъ на многія вѣтви, длиненъ и бѣлъ, запаха пріятнаго, прянаго.

д) Травя пепрушечная имѣеть особенный пріятный запахъ и вкусъ, листья двуперистые, гладкіе, зеленые, съ блескомъ, кругловатые, глубоко вырѣзанные.

е) Травя салатная имѣеть пріятно-горь-

коватый вкусъ; листы на краяхъ безъ выемокъ или зубцовъ; поверхность ихъ гладкая.

ж) Спручки или сѣменники гороховые имѣютъ продолговато-сдавленный видъ и заключаютъ въ себѣ сферическія сѣмена зеленоваго-бѣлаго цвѣта.

з) Сѣменники чечевичные имѣютъ ромбическое очертаніе и заключаютъ въ себѣ округло-выпуклыя сѣмена, бураго цвѣта.

и) Сѣменники бобовые имѣютъ значительную ширину, всякое положеніе и заключаютъ въ себѣ сѣмена широкія, вальковидныя, частію почкамъ подобныя, разноцвѣтныя.

і) Ягоды вишень имѣютъ краснобурый цвѣтъ, круглое очертаніе, гладкій видъ и въ срединѣ мясистаго своего состава содержатъ кругловатую косточку (drupe).

к) Ягоды брусники имѣютъ красный цвѣтъ и сладковатый вкусъ, внутри раздѣлены на чешыре или пять перегородокъ, наполненныхъ многочисленными сѣменами.

л) Сѣмена укропныя суть лицевато-продолговатые, съ одной стороны плоскія, съ другой выпуклыя, полосатые; цвѣтъ ихъ блѣдный, вкусъ сладковато-пряный, запахъ также пряный.

и) Съмена чернушки суть малыя, лице-кругловатыя, почти прегранныя, нѣсколько сдавленные, морщиновато-жесткія, снаружи черныя, внутри бѣло-зеленоватыя, запаха ароматическаго, вкуса нѣсколько жгучаго.

н) Сыроѣжка принадлежитъ къ листовымъ грибамъ (*fungi lamellati*); въ молодости своей представляется въ видѣ бѣлоснѣжнаго лицеобразнаго пузыря, по разрывѣ коего является попомъ желтая, личному желтку подобная шляпка (*pileus*), плоская, съ раздвоеннымъ или надрѣзнымъ краемъ. Лепестки (*lamellae*) полстыя, желтоватыя. Спволю или ножка (*stipes*) также желтая, плотная, снабженная широкимъ перепончатымъ кольцомъ. У древнихъ Римлянъ сыроѣжка считалась главою грибовъ (*princeps fungorum, boletus*). *).

„*Argentum et aurum facile est lanamque togamque.*“

„*Mittere, Boletos mittere difficile est*“ **).

о) Печерица или шампиньонъ есть ли-

*) *Traité sur les champignons comestibles etc. par C. H. Persoon. Paris. 1819. стр. 174—175.*

**) *M. Valer. Martialis Epigrammata. Accurante Schrevelio. Lugdani Batavorum. 1656. стр. 722. Lib. III. Epigr. XLVIII.*

сповапый грибъ, копорый въ молодости своей имѣеть шляпку шаровидную, грязно-бѣлую, попомъ плоскую, нерѣдко шарелковидную, иногда чешуистую; лепески въ молодости свѣтло-красныя, попомъ бурныя или черноватыя; спволъ опороченъ перепончатымъ кольцомъ, круглымъ или полукруглымъ; запахъ пріятный, сокъ сладковатый.

п) Рыжикъ есть листоватый грибъ; шляпка его круглая, съ загнутыми внутрь краями, на срединѣ вдавленная, цвѣта грязно-желтаго, съ желтобурыми полосами, идущими отъ средины къ краю; лепески свѣтло-желтыя; спволъ коропкій, пѣнистый, по срединѣ тонкій, къ корню толстый, внутри плотный; изъ разломленнаго гриба сего выступаетъ желто-шафраннаго цвѣта сокъ.

р) Волуй, волуекъ есть также листоватый грибъ; шляпка нѣсколько выпуклая, зернистая, красно-розовая; лепески неровныя, бѣлыя; спволъ плотный, красно-розовый; запахъ слабый грибной, вкусъ сладковатый.

с) Сморчокъ ядомый, выродистый, великій, состоитъ въ молодости своей въ перепонкѣ или пузырьѣ, по разрывѣ коего является шляпка въ видѣ жолудя, яица или кону-

са, покрытая слизью, въ коей плавають сѣмена, и снабженная впадинами или ячейками; споль проспранными иногда, что можно въ оныя вложить персть; внутренняя поверхность шляпки гладка, а наружная опоясана полспыми жилами; спволя полспый, длинный, при корнѣ неправильно вдавленный.

п) Труфели, яспвенный, бѣлый, сѣрый, пахучій, лѣпнѣй, сущь кругловатая хрящевидная шишка, съ сѣпчатообразною поверхностью; онѣ лежатъ въ землѣ и не имѣютъ спволя; запахъ ихъ особенный, по которому свиньи и собаки находятъ гнѣздо сихъ грибовъ.

Во вторыхъ, трезъ показаніе присутствія постороннихъ или худыхъ качествъ. Качества больной, испорченной, нечиспой зелени сущь:

а) Цвѣтъ, запахъ и вкусъ несвойспвенный посторонній.

б) Измѣненіе въ еспественной пемпературѣ, плотности и цѣлости всего существа зелени.

в) Картофель имѣетъ въ срединѣ существа своего мягкое, жидкое, кашицѣ подобное зерно или почку и песпроватый цвѣтъ;

при вареніи дѣлается жиробразнымъ, получаетъ острый вкусъ и пропивный запахъ; сваренный прудно распускается въ водѣ.

г) Корень болиголова пясинисаго имѣеть умѣренную толщину, морщиноватъ, почти верепенообразный, мочковатый, желтобѣлый и губчатый; запахъ сначала пастернаковый, но при преніи перспами оказывается запахъ кошечьей мочи или мышьяго помета.

д) Корень омега ядовитаго шишковатъ, часпо очень великъ, полый, ячеистый; содержишь въ ячейкахъ острый сокъ, который на отккрытомъ воздухѣ дѣлается желтоокраснымъ, а осенью желтѣеть. Корень сей опоясанъ 6 или 6-ю кольцами, имѣющими впадинки; изъ сихъ колецъ выходятъ длинныя ниши и волоски; запахъ подходитъ къ селлерейному, но пропивный, тошнопу возбуждающій.

е) Корень белены длинень, толстъ, морщиноватъ, цвѣта бураго, внутри бѣлаго.

ж) Корень рѣповиднаго или голубаго волкогуба состоишь изъ многихъ малыхъ рѣпообразныхъ, волокнистыхъ шишекъ бураго цвѣта; вкусъ острый.

з) Корень желчнаго волкогуба сходень съ корнемъ голубаго волкогуба.

и) Трава болиголова пятнистаго имѣеть запахъ сходный съ корневымъ; листья черно-зеленые, или же въ молодости зелено-желтые, внизу проперистые, вверху двуперистые, блестящіе, листочки ланцетовидные, съ зубчатымъ краемъ.

і) Трава омега ядовитаго имѣеть запахъ корня, листья перистые, вырѣзанные подобно очиненному перу; каждый листочекъ имѣеть ланцетовидную фигуру съ шилообразно-вырѣзаннымъ краемъ.

к) Трава собачьей пепрушки, спершая между пальцами, издаеть чесночный запахъ; листья большіе, двуперистые, тонкіе и раздѣленные на три листочка, подобные листочкамъ омега ядовитаго, но величиною меныше и съ гладкими краями.

л) Трава кербеля, одуряющаго и луковистаго, имѣеть острый, жгучій вкусъ и пропивной запахъ; листья проекратно раздѣляющіяся на малые тонкіе листочки и покрыты слегка тонкими волосками.

м) Трава садаша ядовитаго имѣеть острый, жгучій вкусъ; листья зубчатые; поверхность листовъ покрыта шипами или колючками.

н) Спручки горохового деревца имѣютъ ромбоическое очерпаніе, полный или выпуклый видъ и содержатъ въ себѣ много сѣмянъ, плотно напирających кнаружи.

в) Сѣменники гороховника суть плоскіе, широковапо-сдавленные, яцевидно продолговатые; поверхность ихъ жолобовата; внутри содержатся угловатые сѣмена.

п) Сѣменники бараньяго гороха имѣютъ выпуклый видъ, ромбоическое очерпаніе и заключаютъ въ себѣ два сѣмена, подобныя частію бараньей головѣ.

р) Ягоды красавицы зрѣлыя имѣютъ черный цвѣтъ, круглое очерпаніе, блестящій видъ, сочный составъ и внутри раздѣлены перегородкою гнѣздышка, наполненнаго многими зернами, имѣющими очерпаніе почекъ.

с) Ягоды шолокнянки имѣютъ красный цвѣтъ, сферическое очерпаніе и внутри раздѣлены на пять перегородокъ; въ каждой изъ этихъ перегородокъ заключается одно твердое сѣмя оливковаго цвѣта.

ш) Сѣмена белены имѣютъ черный цвѣтъ, очерпаніе почекъ, запахъ противный, одуряющій.

у) Съмена дурмана имѣютъ цвѣтъ и видъ чернушечныхъ сѣмянъ, но опличаются болѣею величиною и шириною, не имѣютъ прянаго, чернушкѣ свойственнаго запаха; иногда же и вовсе лишены запаха.

ф) Мухоморъ принадлежитъ къ дисповатымъ грибамъ; шляпка въ молодости плоская, пошомъ вдавленная, цвѣта блестящаго, желпокраснаго, усьяна жемчужно-бѣлыми бородавками. Такой же цвѣтъ замѣчается на лепеспкахъ и спволѣ, копорый пришомъ бугриспъ и опоясанъ перепончатымъ широкимъ кольцомъ; запахъ опгваннпшелный, вкусъ оспрый.

х) Поганка луковиспая еспъ дисповатый грибъ; шляпка въ молодости выпуклая, пошомъ плоская, по срединѣ вдавленная, бѣлая, имѣющая на внуспренней поверхности много лепеспковъ, всегда бѣлыхъ; спволъ бугриспый, внизу шонѣ, опоясанъ широкимъ перепончатымъ кольцомъ.

ц) Поганка моровая еспъ дисповатый грибъ; шляпка бурая съ конценсприческими по срединѣ полосами; лепеспки блѣдно-голубые, спволъ сплошный; изъ раздавленнаго гриба се-го показывается бѣловатый сокъ.

*

ч) Поганка рвотная есть листоватый грибъ; шляпка плоская, красно-красная, съ раздвоеннымъ краемъ и бѣлыми лепестками, которые гораздо длиннѣе, нежели лепестки водюя; спволь вверху бѣлъ, внизу красно-розовый; сокъ его острый.

ш) Сиортокъ удивительный подобенъ, какъ изъ названія видно, частію мужескому уду; шляпка зеленоватая, конусообразная, снизу гладкая, сверху покрыта съпчатыми сливающимися ячейками, по краямъ разрѣзана, а на верхушкѣ продырявлена; спволь бѣловатый, дырыстый, подобно рѣшешу; имѣетъ острый и пронизательный проливный запахъ.

щ) Дождевикъ разнообразный, бородавчатый, звѣздчатый, представляется въ видѣ большихъ кожевидныхъ пузырей, которые, распрескиваясь, образуютъ пыльное облако; лежатъ на поверхности земли, съ коею соединяются чрезъ слабкія волокны.

ъ) Вообще, по замѣчанію Гмелина*), подозрительны грибы, имѣющие непріятный видъ и цвѣтъ темный, черносиній, зеленый, пе-

*) Allgemeine Geschichte der Pflanzengifte, entworfen v. j. Fr. Gmelin. 2-te Aufl. Nürnberg. 1803. стр. 634—635.

спрый, запахъ гнилой, спволь полый, значительную клейкость, — грибы скоро гниющие, при вареніи пвердѣющіе и сообщающіе варимому съ оными луку черный цвѣтъ. Гораций *) такъ же посему говоритъ:

„Pratensibus optima fungis

„Natura est; aliis male creditur.“

Признаки сіи, очевидно, невѣрны (примѣромъ и доказательствомъ служатъ сморчокъ ядомый, рыжикъ и проч.) и описаніе ихъ не есть доказательство безвредности гриба; чѣмъ большее однако же число шаковыхъ признаковъ въ одномъ и томъ же грибѣ находится, тѣмъ онъ подозрительнѣе становится.

ы) Если зелень подмѣшана мѣдью, то нужно погрузить лезвее ножа въ разсолъ зелени; опъ сего лезвее ножа покрывается красною пленкою, соспавляющею чистую мѣдь. Можно такъ же облить шаковую зелень кипячею водою и къ процѣженной жидкости прибавлять по каплямъ водяной растворъ амміака; опъ сего произойдетъ голубой осадокъ — извѣстный признакъ мѣди.

[Будетъ продолженіе].

*) Quinti Horatii Flacci Opera in usum Sereniss. Delphin, Londinensis editio undecima. Sat. L. II. Sat. 4. vers. 20—21. (стр. 470).

II.

О ЛѢЧЕНІИ ОТРАВЛЕННЫХЪ.

[*Окончаніе*].

II. *Уничтоженіе или притупленіе яда, оставшагося въ тѣлѣ отравленной особы.* Если изверженіе яда изъ шѣла не воспослѣдовало и всѣ усилія къ сему со стороны природы и искусства остались тщетными: то должно прибѣгнуть къ средствамъ, разрушающимъ или притупляющимъ ядъ, оставшійся въ шѣлѣ. Выполненіе сего показанія сопряжено съ великими затрудненіями, потому что уничтоженіе, разрушеніе яда, оставшагося въ шѣлѣ, не всегда соспоишь во власпи призваннаго на помощь Врача; а притупленіе яда само по себѣ есть только лѣченіе припадковъ отравленія и слѣдственно весьма ненадежное пособіе. Совершенно разрушивъ проглоченный ядъ могутъ только

такія вещества (пропивудія—antidota chemica—въ спрогомъ смыслѣ), которыя, 1) будучи употреблены въ большемъ количествѣ, не причиняють никакого вреда; 2) при перашурѣ, свойственной человѣческому плъу, и даже при низшей, дѣйствуютъ на ядъ, какъ въ жидкомъ, такъ и плотномъ его состояніи; 3) дѣйствіе свое обнаруживаютъ скоро; 4) имѣють способность соединяться съ ядомъ, смѣшаннымъ со всѣми веществами, какія только могутъ содержаться въ желудкѣ; 5) наконецъ, дѣйствуя на ядъ, они снимають отъ него всѣ убійственныя качества. Но не упоминая уже о томъ, что такъ называемыя пропивудія не всегда одарены всѣми сказанными качествами, вещества сіи, имѣя даже всѣ потребныя свойства, уничтожаютъ ядъ, а не отравленіе, разлагають по химическимъ законамъ ядовитое вещество, но не могутъ уничтожить произведеннаго уже симъ веществомъ вредоноснаго дѣйствія и слѣдственно прекращають дальнѣйшее только дѣйствіе яда, а посему съ великою пользою могутъ быть употреблены и дѣйствительно употребляются при оправленіи ядами, *болѣе медленно дѣйствующими* (ven.

fixa, mineralia, acris, styptica). Напротив того при оправлении ядами проникательными, быспро разливающимися, шакъ сказашъ, по всему шѣлу (ven. penetrantia, diffusa, plura vegetabilia, animalia), не смотря на всѣ равныя обстоятельство со стороны количества и качества приняшаго яда, шѣло-сложенья, возраста, привычки оправленной особы, — дѣйствіе прошивудій естъ весьма ограниченное и шѣмъ ограниченнѣе, чѣмъ проникательнѣе самый ядъ. По сей причинѣ число химическихъ прошивудій весьма еще не велико; всеобщія же прошивудія (antidota universalia), отккрытіемъ коихъ столько занимались Врачи и писатели прежнихъ времени, вовсе не существуяшъ. Въ новѣйшія времена, по многократнымъ опытамъ и наблюденіямъ Врачей, одни изъ нижеслѣдующихъ веществъ признаны прошивудіями, а другія болѣе заслуживаюшъ названіе средствъ, при-шупляющихъ убійственную силу яда. Такимъ образомъ употребляютъ нынѣ

Противъ кислотъ: пережженная магнезія (противъ сѣрной кислоты особливо углекислая магнезія), смѣшанная съ водою. При недоспащкѣ магнезіи растворъ мыла въ водѣ.

При недоспапкѣ обоихъ сихъ веществъ мѣль, раковыя жерновки, кораллы, перлы, пережженный оленій рогъ, въ видѣ порошка или съ водою. Спавяпся также промывашельныя, смѣшанныя съ сими веществами. Каля и напръ, какъ раздражающія вещества, здѣсь вредны.

Противъ щелогей и извести: укусъ и лимонный сокъ. При недоспапкѣ обоихъ сихъ веществъ дають пипъ много воды.

Противъ тяжелоzeма: распворъ въ водѣ сѣрнокислаго напра или сѣрнокислой магнезии. При недоспапкѣ сихъ веществъ колодезная вода, содержащая въ себѣ гипсъ.

Противъ селитры: вода съ сахаромъ.

Противъ нашатыря: прищупленіе яда чрезъ слизисшыя, водянисшыя пипія.

Противъ фосфора: поже, чпо прошивъ кислоть (спр. 268).

Противъ іода: жидкій кисель, пригопвленный изъ каршофельной муки, или крахмалъ съ молокомъ. При недоспапкѣ сихъ веществъ пшеничная мука, разведенная молокомъ.

Противъ ртутныхъ составовъ: яичный бѣлокъ, распущенный въ водѣ. Бѣлокъ одного

яйца уничтожаетъ ядовитость четырехъ грановъ сулемы. При недоспапкѣ сего вещества дается молоко. *Таддеи* *) предпочитаетъ расщипельный клей. *Сунделинъ* **) предлагаетъ при недоспапкѣ яичнаго бѣлка давать оправленному свѣжевыпущенную кровь какого либо живошного.

Противъ мышьячныхъ составовъ: вода съ сахаромъ, сама по себѣ, или смѣшанная съ извеспковою водою. *Уисгольмъ* ***) особенно похваляетъ сахарный сиропъ. Однакожъ сахаръ въ семь случаевъ, равно и при оправленіи мѣдью, не есть *antidotum chemicum*. Д. *Дулькъ* смѣшалъ 2 унца сахарнаго сиропа съ $\frac{1}{4}$ грана мышьячнаго водянаго расщивора. По истеченіи цѣлаго года въ сей смѣси открытъ былъ (per reagentia) мышьякъ. Опытъ воды, нипитанной сѣроводороднымъ

*) Gazette de santé No IX. 25 Mars. 1822. I. Taddei Recherches chimiques et médicales sur un nouvel antidote contre le sublimé corrosif et les autres préparations veneneuses du mercure. Paris. 1822.

**) Handbuch der medizinischen Chemie—v. K. Sundelin. Berlin. 1823. стр. 56.

***) Berl. jahrb. für die Pharmacie—v. Stoltze u. Meissner. 28-ter jahrgang. Erste Abtheilung. 1826.

гасомъ, тогда только можно ожидать нѣ-
которой помощи, когда проглотенъ мышьяч-
ный растворъ, а не порошокъ сего яда *).
Масляныя и жирныя вещества усиливаютъ
ядовитую силу мышьяка и пошому весьма
вредны **).

Противъ мѣдныхъ составовъ: яичный бѣ-
локъ. Даютъ также и сахаръ; о дѣйствіи
его сказано выше (спр. 270).

Противъ сурьмяныхъ составовъ: отваръ
чернильныхъ орѣшковъ, отваръ хины. При
недоспапкѣ сихъ веществъ отваръ дубовой
или ивовой коры.

Противъ оловянныхъ составовъ: молоко,
теплая вода, слизистое питье.

*Противъ висмутовыхъ, золотыхъ, цинко-
выхъ составовъ:* поже, что противъ мышь-
яка (спр. 270).

Противъ адскаго камня: растворъ нова-
ренной соли въ водѣ.

Противъ свинцовыхъ составовъ: поже,
что противъ шяжелозема (спр. 269) ***).

*) A. Dictionary of Chemistry—by A. Ure. Lon-
don. 1821. Art. Acid arsenious.

**) Orfila, Ure, Sundelin—въ привед. сочин.

***) По опытамъ Гг. Дюма и Мильна Эдварда

Противъ сѣрной пегени: вода съ уксусомъ или лимоннымъ сокомъ.

Противъ острыхъ растительныхъ ядовъ: припухленіе яда водянистыми и слизистыми пипіями. Похваляютъ совершенно свѣжій плодъ *Fevilleæ cordifoliæ* *). Сѣверо-Американскіе Врачи употребляли съ пользою пропивъ сихъ ядовъ мыльную горечавку (*Gentiana verna*) **).

Противъ испанскихъ мухъ: камфора съ слизистыми пипіями.

(Frozier's Notiz. 16-ter B. No I. стр. 15—16), желѣзо есть пропивудіе мепаллическихъ солей. Они основываютъ сіе на безвредности мѣди, свинца и другихъ мепалловъ, находящихся въ корольковомъ видѣ (*status regulinus*) и на свойствѣ желѣза разлагать соли сихъ мепалловъ и возстановлять ихъ. Доселѣ однако только отравленіе мѣдною ярью, уксусокислою мѣдью, сѣрнокислою мѣдью и сулемою излѣчено было помощію сего средства. Можетъ быть и при другихъ мепаллическихъ соляхъ оно окажется дѣйствительнымъ.

*) *Annales philosophiques pour le mois de Mai.* 1820.

**) *Medical Repository.* 1826. Vol. IV.

Противъ растительныхъ наркотическихъ ядовъ: крѣпкая наспойка кофе. По изверженіи, бѣльшей часпи яда вода съ уксусомъ, или лимоннымъ сокомъ, или виннымъ камнемъ (*cremor tartari*), давая попеременно кислое сіе пишье и кофе *). Промывашельное *e foliis sennae cum sale Glauberi*.

Противъ синильной кислоты: крѣпкая наспойка кофе, и попомъ чрезъ полчаса шерпеншинное масло, смѣшанное съ наспойкою кофе. По наблюденіямъ *Эгера* **), синильная кислота, бывъ проглощена, дѣйствуетъ на опдаленные органы, именно, на нервную систему и убиваетъ прекращеніемъ процесса окисленія крови. Посему искусственное вдунаніе въ легкія воздуха, содержащаго въ себѣ много кислотофора, еспъ, по мнѣнію *Эгера*, пропивуядіе сего яда. Если однакожь ядъ

*) По опытамъ славнаго Профессора *Орфили*, кислая пиція, употребленная послѣ испражненія бѣльшей часпи оглушающаго яда, составляютъ весьма полезное средство (Привед. соч. Т. II. стр. 230—234).

**) *Archiv für Anatomie u. Physiologie. Herausg. v. Fr. Meckel. Jahrgang 1826. 1—4-tes Heft. No 11. April—Juni.*

сей успѣлъ уже уничтожить жизненность крови, то никакое химическое средство не возвратитъ жизни. Джонъ Муррай *) далъ кролику значительный пріемъ синильнокислаго амміака и живописное сіе не имѣло никакихъ припадковъ. По опытамъ Дюжю **), углекислый амміакъ, растворенный въ водѣ, принадлежитъ къ лучшимъ прошивудіямъ синильной кислоты.

Противъ грибовъ, — какъ остро-осмунто-ирихъ лдовъ: промывательныя e foliis ven-
næ cum sale Glauberi; слабительное ex oleo
ricini. По очищеніи первыхъ пушей, питье
изъ померанцовой воды съ эфиромъ, Гофмано-
выми каплями и сиропомъ. Необходимы также
слизистыя и водянистыя пиція. Г. Бул-
ліардъ ***) совѣдуетъ давать нѣсколько ка-
пель (10—12) сѣрнаго эфира съ виномъ, по
предварительномъ очищеніи первыхъ пушей.

*) v. Froriep's Notizen—12-ter B. (No 250).
стр. 16—19.

**) Archiv. génér. de Med. Froriep's Not. 15-ter
B. No 2. стр. 32.

***) Traité sur les champignons comestibles—par
C. H. Persoon. Paris. 1819. стр. 174.

1'. Дрюжб *) похваляють смѣсь изъ деревяннаго масла и угольнаго порошка.

Противъ остро-оглушающихъ ядовъ, именно, противъ тилибухи, рыбнаго сѣмени, калфоры, Uras tieute, Uras antiar, Tiscunaz, Wougalî: питье изъ воды съ эфиромъ, шерпеннинымъ масломъ и сахаромъ. Индѣйцы, говорятъ Ватертонъ **), увѣряють, что животныя, убитыя посредствомъ спиртъ, намазанныхъ ядомъ Wougalî, могутъ быть спасены чрезъ вдуваніе воздуха въ ихъ легкія. Но прежде всего должно извлечь спиртъ изъ раны, положить сжимающую повязку надъ раненымъ мѣстомъ и прижечь самую рану.

Противъ табаку, сонной одури, дурмана, наперсточной травы, олеандра, руты, омега большаго и малаго, куколя, манцинеллеваго дерева: по очищеніи первыхъ путей кислая пища. Нѣкоторыя совѣщуютъ, при оправленіи особливо наперсточною травой, давать эфиръ или амміакъ.

Противъ рожковъ (secale cornutum): по

*) v. Froriep's Not. 23-ter B. No 6. стр. 96.

**) Travels in South-America—by Waterton. London. 1825.

очищеніи первыхъ путей успокоивающія средства (*Decoctum carit. parav. etc.*) и кислыя пипіія.

Противъ спиртныхъ напитковъ: по очищеніи первыхъ путей кислыя пипіія; примачиваніе живоша и головы уксусомъ. По наблюденіямъ *Севала* *), опьяненіе прекращается шопчасъ, какъ скоро алкоголь удаляется изъ крови. Сіе бываетъ скорѣе или медленнѣе, смотря по сильнѣйшему или слабѣйшему испаренію кожи. Масло Прованское, замѣчаетъ *Севаль*, препятствуетъ всасыванію алкоголя, а лепучая щелочь, особливо же уксусокислый амміакъ, способствуетъ испаренію алкоголя чрезъ кожу. Другіе для сего похваляютъ спаканъ сахарной воды, куда прибавляютъ 25—30 капель Миндерерова спирта.

Противъ укушенія ядовитыми змѣями: по сдѣланіи надъ раною перевязки и по испражненіи крови изъ раны прижигаютъ сію послѣднюю раскаленнымъ желѣзомъ, адскимъ или ѣдкимъ камнемъ, либо прикладываютъ

*) *Révue médicale Francaise et étrangère et Journal de Clinique de l'Hôtel Dieu et de la Charité etc. Paris. 1826.*

сюрмяное или купоросное масло. Иногда для успѣшнѣйшаго прижиганія нужно бываетъ расширеніе ядовитой раны. На окололежащія часпи кладется смѣсь изъ Прованскаго масла и жидкаго амміака; симъ же соспавомъ, либо смѣсью лянтарнаго масла съ амміакомъ (Aqua Luciae) напирается опрaвленнѣй членъ. Внутрь даютъ настойку бузиновыхъ цвѣтѣвъ или померанцовую воду, съ нѣсколькими каплями ammoniae liquidae. Можно также дать рюмку хорошаго винограднаго вина. Г. Костеръ *) прививалъ змѣиный ядъ многимъ животнымъ и по сдѣланіи надъ ядовитою ранюю надлежащей перевязки выпрыскивалъ смѣсь изъ равныхъ частей воды и хлороваго натра (Chloruretum sodae), равно обмывалъ сею смѣсью ядовитую рану, съ наилучшимъ успѣхомъ. Ни одно изъ сихъ животныхъ не получило признаковъ опрaвленія. Впрочемъ онъ совѣдуетъ при томъ употреблять и другія средства, признанныя полезными послѣ укушенія ядовитыми змѣями, и особливо никогда не забывать перевязыванія опрaвленнаго члена. Осипъ - Индскій Врачъ

*) v. Froriep's Notiz. 23-ter B. No 2. стр. 27.

Г. Боттерѣ *) употребилъ съ успѣхомъ слѣдующій способъ: приложивъ сжимающую повязку надъ ядовитою ранюю, даетъ внутрь одну драхму жидкаго лавдана (*Laudanum liquid. Sydenh.*), одинъ унцъ водки съ двумя или тремя унцами теплой воды, прибавивъ къ сему сахару и нѣсколько мясной эссенціи. Сообразно съ жестокостію припадковъ, средство сіе повторяется до того, пока кругообращеніе крови не сдѣлается живѣе, а поверхность тѣла теплѣе. Для ускоренія сего дѣйствія оправленный удерживается въ движеніи. Два или три приѣма сказаннаго лѣкарства доспаютчны для спасенія жизни оправленному. Въ случаяхъ болѣе жестокихъ нужны кромѣ того сильныя возбуждающія средства. Для сего кладутъ оправленнаго вблизи большаго огня, прутъ ему шею, грудь и конечности смѣсью *ex Laudano liqu. Sydenh., ammonia et aethere sulphurico* и вливаютъ по возможности жидкость сію въ ротъ. Какъ скоро оправленный получитъ опять употребленіе ногъ, то водятъ его по комнатамъ и почаще даютъ внутрь сказанное лѣ-

*) Вышеприв. *Transact. of. the medic. Society of Calcutta.*

карспво. Сямъ способомъ изъ 20-ти особъ выдѣчены 18, не смолря на шо, что онѣ явились къ Г-ну *Боттеру* черезъ пять минутъ послѣ укушенія. Присемъ Г. *Боттеръ* замѣчаетъ, что амміакъ, предложенный *Вилліамсомъ*, нимало здѣсь не пособляетъ и легко воспаляетъ глотку *). Американцы употребляютъ противъ укушенія ядовитыми змѣями расценіе *Mikania Guaso* **). Они пьютъ 1—2 ложки сока сего расценія, и сдѣлавъ себѣ на груди и перспяхъ 5—6 ранъ, выпускаютъ въ оныя сей сокъ. Послѣ сего они могутъ, какъ увѣряютъ, безвредно брать въ руки ядовитыхъ змѣй; если же бывають укушены, то одно пошираніе ядовитой раны листьями *Mikaniae Guaso* доспапочно для испребленія яда. Похваляли шакже бѣлый мышьякъ, какъ внушреннее лѣкарспво послѣ укушенія ядо-

*) Замѣчено, что крѣпкій нашатырный спиртъ, подносимый часто во время обморока къ ноздрямъ, причиняетъ нерѣдко сильное воспаленіе дыхапельнаго горла (ang. membranacea, croup).

**) *Plantes equinoxiales* — par Mm. Humboldt et Bonpland. T. 11. стр. 84. T. 105. Orfila. Прив. соч. T. 11. стр. 533—536.

выпыми змѣями *); однакожь новѣйшія наблюденія не подтверждаютъ сего. Другое средство, похваляемое въ Америкѣ противъ укушенія: *Crotali horridi*, есть расшеніе—*Prenanthes altissima* **). На свѣжую ядовитую рану кладется исполченная шкура сего расшенія; если же обнаружилось уже повсемѣстное дѣйствіе яда, то дается внутрь крѣпкая настойка (*infusum saturatum* в. *concentratum*) сего расшенія.

Противъ ужаленія скорпионоли: къ ранѣ прикладывается смягчительная припарка, окрошенная 10—12-ю каплями жидкаго амміака. Костеръ совѣщаетъ употреблять вышесказаннымъ образомъ (спр. 277) *Chloruretum sodae*. Втирають также *Aquam Luciae* и обмываютъ ею ужаленное мѣсто. Внутрь тоже, чтоо противъ укушенія змѣями. Перевязка и другія средства, употребляемыя противъ укушенія ядовитыми змѣями, шѣмъ нужнѣе бывають здѣсь, чѣмъ жарче климатъ, въ кошоромъ случилось сіе оправленіе.

*) *Medico-chirurgical Transactions. Vol. II. Orfila*—прив. соч.

**) *New-York medical and physical Journal. Januar. 1826.*

Противъ ужаленія тарантулою, осою, пгелюю, паукомъ, комаромъ: въ легчайшихъ случаяхъ рана обмывается холодною водою и втирается въ оную миндальное масло съ жидкимъ амміакомъ. При значительныхъ припадкахъ *) дается внутрь бузиновая наспойка или померанцовая вода, съ нѣсколькими каплями жидкаго амміака. Если въ ужаленной части шѣла осталось самое жало, то нужно оное извлечь концемъ иглы или маленькими щипчиками, или вырѣзываніемъ вокругъ

*) Недавно описанъ примѣръ смертельнаго оправленія, причиненнаго ужаленіемъ великаго числа пчелъ (*Histoire des trois cas rares, par F. Richond Desbrus. Révue médicale. Froriep's Not. 19-ter B. No 17.*) И для Судебной Медицины важно рѣшеніе вопроса: человекъ, найденный мертвымъ около улья пчелъ, дѣйствительно ли умеръ отъ ужаленія сихъ насекомыхъ, или же отъ насильственной смерти, которую спарался убійца скрыть шѣмъ, что бросилъ пруть на жертву пчеламъ?—Даже послѣ ужаленія одной пчелы впоследствии въ одномъ случаѣ (*The medical Recorder. January. 1827*) столбнякъ (*tetanus*), который однакожь чрезъ полчаса самъ собою прекратился.

раны ножницами. Простѣйшее для сего средство соскоблить въ накапливаніи на ужаленное мѣсто малаго количества *tincturae cantharidum* *). Съ поднятіемъ кожи въ пузырь выходить и самое жало. Для обмыванія ужаленнаго мѣста похваляется также вода холодная, въ коей растворена поваренная соль. Равно обмывается ужаленный членъ холстиною, намоченною въ сей же жидкости.

Противъ отравленія животными, употребленными въ пищу: по очищеніи первыхъ пушей дается внутрь эфиръ и питье изъ воды съ уксусомъ или лимоннымъ сокомъ. Кернеръ **) и Кунъ ***) похваляютъ для внутренняго употребленія сѣрную печень (3—5 грана), разведенную въ значительномъ количествѣ воды.

*) London medical and physical Journal. January. 1827. стр. 88—89.

**) Das Fettgift oder die Fettsäure u. ihre Wirkungen auf den thierischen Organismus. v. I. Kerner. Stuttgart u. Tübingen, 1822. стр. 287—357.

***) C. G. u. O. B. Kühn's Versuche u. Beobachtungen ü. d. Kleesäure, das Wurst und das Fettgift. Leipzig. 1824.

III. *Прекращеніе послѣдствій отравленія.*

Послѣдствія отравленій, по различному свойству и количеству попавшаго въ шѣло человеческое яда, по шѣлосложенію, роду жизни, возрасту и привычкѣ, отравленнаго, бывающъ конечно весьма разнообразны *). Большею однако частію послѣдствія сіи обнаруживающіяся нѣко воспалительными, нѣко называемыми нервными припадками, съ расстройствомъ органической связи и смѣшенія частей, или безъ онаго. Посему при лѣченіи отравленій выполненіе предъяго или послѣдняго показанія пребудетъ всего чаще прошивувоспалительныхъ или успокоивающихъ средствъ, какъ наружныхъ, такъ и внутреннихъ. Нерѣдко также нужно бываетъ совмѣстное употребленіе того и другаго способа лѣченія, измѣняемаго сообразно съ каждымъ особеннымъ случаемъ. Такимъ образомъ

Послѣ отравленія кислотами: къ животу прикладывается холстина, смоченная теплымъ опваромъ, изъ смягчительныхъ средствъ

*) Въ одномъ случаѣ, замѣчаетъ Г. Жоли (Nouvelle Bibliotheque médicale. Tuillet. 1828), послѣ отравленія сонною одурью оказалась скарлатина со всѣми ея существенными признаками и припадками.

приготовленнымъ. Если же и самое прикосновение къ животу усиливаетъ боль, то оный овлажняется посредствомъ грецкой губки, смоченной сказаннымъ опваромъ. Уменьшивъ симъ чувствительность живота, припускаютъ къ нему пиявицы и дѣлается общее кровоупусканіе. Внутрь даются слизистыя пипія (*ex decocto althaeae, malvae, semin. lini, solutione g. Arabici*), спавляясь такія же промывательныя и запрещается всякая пища, даже супъ. При трудности въ глотаніи и воспаленіи въ глоткѣ приспавляются пиявицы къ шеѣ, и если, не смотря на сіе, судорожное или корчевое сжатіе челюстей или глотки препятствуетъ проглотченію лѣкарствъ, то оныя вливаются больному посредствомъ вышеупомянутого (спр. 67-69 части XIV No 1-го В. М. Ж.) насоса. Если же по прекращеніи воспалительныхъ припадковъ судороги и корчи не утихаютъ, то предлагаются успокоивающія пипія (*decoctum capit. parav., aqua melissae, vel theae infusum, cum laud. liquido Sydenh. et saccharo etc.*). Когда уже всѣ припадки миновались, то дается бульонъ изъ курицы или шеляпины, а при выздоровленіи овсяная или ячменная

кашица, жирные супы, картофельный кисель, рисовый опваръ, вода, въ коей намочена пережженная корка хлѣба. Не прежде, какъ чрезъ нѣсколько дней по выздоровленіи, назначается уже болѣе твердая пища, легковаримая и въ умѣренномъ количествѣ употребляемая; но отъ спиртныхъ напитковъ нужно долгое время воздерживаться.

Крѣпкія кислоты, касаясь наружныхъ частей шѣла, производятъ ожогу (*ambustura*), а пошому и пребуютъ средствъ, соопвѣшствующихъ сему поврежденію. Свинцовыя мази и извеспковая вода почитались и почитаются лучшими наружными средствами къ лѣченію ожоги. Недавно однакожь признано весьма благопворнымъ прикладываніе хлопчатой бумаги на обожженное мѣсто *). Средство сіе передано Европейцамъ Сѣверо-Американскими Врачами. Г. *Андерсонъ* многократными удачными опытами удостовѣрился, что первымъ дѣйствіемъ средства сего бываетъ быстрое прекращеніе боли и раздраженія, какое бы впрочемъ ни было состояніе раны,

*) *Revue Brittanique*. См. Московскій Телеграфъ, издаваемый Николаемъ Полевымъ. 1829. No 7 Апрель. стр. 550.

причиненной ожогою. Одному угольщику, жестоко обожженному, хлопчатую бумагу не перемѣняли двѣ недѣли; послѣ сего при перевязкѣ большая часть ранъ найдена исцѣленной, а оспалыя въ короткое время также закрылись. Въ другомъ случаѣ, гдѣ ожогою причинены были глубокія и почти одинакія раны на обѣихъ ногахъ, Г. *Андерсонъ* приложилъ къ одной ногѣ хлопчатую бумагу, а другую перевязалъ обыкновеннымъ спускомъ. Рана, покрытая хлопчатой бумагою, чрезъ три недѣли совершенно исцѣлилась; напрошивъ того излѣченіе раны, перевязанной спускомъ, совершилось не прежде прехъ мѣсяцовъ. Другой, столь же простой способъ лѣченія ожогъ, предложилъ Англіскій Врачъ Г. *Вардъ* *). Онъ посыпаетъ обожженное мѣсто посредствомъ сита мукою, покрываетъ оное пошомъ чистою сухою холстиною и оспавляетъ больного въ совершенномъ спокойствіи, Жидкія лѣкарства и мази не должны быть употребляемы, по мнѣнію Г-на *Варда*. Если боль въ обожженномъ мѣстѣ возобновится, то, снявъ холстину и нимало не удаляя муки, посыпаютъ новый ея слой, толщиною

*) The Lancet. No 245.

въ $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{2}$ дюйма. Такимъ образомъ должно поступать нѣсколько недѣль; а подѣ конецъ лѣченія примѣшивается къ мукѣ галмейный камень (*lapis salaminaris*). Когда ожога близка уже къ исцѣленію, то присыпается однимъ только галмейнымъ камнемъ.

Послѣ отравленія щелочами и щелочными составами, фосфоролиъ, іодолиъ и всѣми металлическими ядами: по прекращеніи припадковъ воспаленія пѣми именно средствами, которые предложены (спр. 283-285) для лѣченія послѣдствій оправленія кислотами, проглоченными внутрь, назначаются крѣпительныя средства, хина, горькіе экстракты, Исландскій мохъ, и подѣ конецъ желѣзо. Полезно также употребленіе минеральныхъ водъ, наружное и внутреннее. Послѣ оправленія металлическими ядами, особенно же послѣ оправленія мышьячными и ртутными составами предписываются наконецъ сѣрные ванны. Особамъ, вылѣченнымъ отъ оправленія мышьякомъ, совѣтуютъ *) давать внутрь *oleum aethereum apisi* и тереть онымъ животъ. Прошивъ свинцовой колики (*colica saturnina*), какъ послѣдствія оправленій свин-

*) Sundelin Прив. сочм. стр. 107.

цовыми составами, употребляются промывательныя (ex infuso æppae cum sale Glauberi et vino antimoniali), слабительныя (ex decocto cassiæ fistulæ cum sale amaro et auxillo tartari emetici), потогонныя пишия (decoc-tum e ligno guajaci cum radice sarsaparillae, chinae podosae); на ночь спавишся успокоивающее промывательное (clyster opiatum).

Послѣ отравленія испанскими мухами: воспаление дѣишся вышеозначенными средствами (спр. 283-285). Рѣзь въ мочеиспускательномъ каналѣ и прудное мочеиспускание удаляется впрыскиваніемъ въ оный слизистыхъ жидкостей, впираніемъ во внутреннюю поверхность бедра раствора камфоры въ Прованскомъ маслѣ, употребленіемъ внутрь камфоры съ личнымъ желѣзкомъ. Пропивъ испеченія мочи по каплямъ, какъ слѣдствія отравленій испанскими мухами, *Д. Деви* *) совѣдуетъ ввести осторожно кашетеръ въ моче-вой пузырь, и не выпуская нима-ло мочи, оставить тамъ сіе орудіе на нѣсколь-ко секундъ. Онъ увѣряетъ, что средство сіе го-

*) Edinb. medic. a. Surgic. Journal. No 97. стр. 315.

раздо дѣйствительнѣе, нежели камфорныя микстуры и другія подобныя лѣкарства.

Послѣ отравленія острыми растительными ядами: больной удерживается въ спокойномъ положеніи; продолжаются слизистыя и водянистыя пищія, равно также вышеупомянутыя (снр. 283-285) пропивувоспалительныя и успокоивающія средства.

Послѣ отравленія растительными наркотическими ядами: больной удерживается въ непрерывномъ движеніи и не допускается къ засыпанію. Сильная спячка и склонность къ поспрѣху пребываютъ кровопусканія изъ руки или, лучше, изъ яремной вены, пиявицъ и холодныхъ примочекъ къ головѣ. Обливаніе холодною водою оказалось, по новѣйшимъ опытамъ, весьма дѣйствительнымъ средствомъ. *С. Джексо́нъ* *) излѣчилъ 11-лѣтнюю дѣвочку, проглотившую два унца *Laudani liquidum Sydenhami*, чрезъ обливаніе головы ея холодною водою. *Ригардсо́нъ* **) излѣчилъ симъ же средствомъ оправленіе подобнаго

*) The Philadelphia Journal of the medical and physical sciences. Edit. by N. Chapman. Vol. III. N 1. May. 1824.

**) Тамъ же No 2.

рода. *Д. Оджайли* *) приводитъ примѣръ, гдѣ чрезъ искусственное вдунаніе воздуха въ легкія спасено десятидневное дитя, оправленное 30-ю каплями *Laudani liq. Syd.* Пропивъ одобенълости рукъ и ногъ назначается ипреніе. Къ икрамъ и подошвамъ прикладываются горчишники. Такое же лѣчение нужно бываетъ и тогда, когда ядъ проникнулъ въ шло чрезъ рану.

Послѣ отравленія сильною кислотою по новѣйшимъ наблюденіямъ, способъ лѣченія, употребляемый вообще послѣ отравленія наркотическими ядами, оказался столь же полезнымъ и послѣ сего отравленія. Фрейбургскій Профессоръ, Г. *Баумертнеръ* въ одномъ случаѣ, не смотря на слабость, корчи и онѣмѣніе, употребилъ съ наилучшимъ успѣхомъ кровопусканіе, припущеніе пиявицъ къ головѣ и обливаніе головы холодною водою. Доселѣ способъ сей не былъ еще испытанъ; и Г. *Баумертнеръ* руководствовался только слѣдующимъ наблюденіемъ Г-на *Гома*: одной собакѣ,

***) North-American medic. a. surgic. Journal for April 1827.

*) Medicinisch-Chirurgische Zeitung. No 22. 1829. стр. 377 - 384.

отравленной синильною кислотою, отворили яремную вену, съ шѣмъ, чѣобы пошерею крови ускоришь смерть сего живошного; но по мѣрѣ шого, какъ испекала кровь, собака мало помалу освободилась совершенно опъ припадковъ отравленія.

Послѣ отравленія растительными острооселдидующими ядами: смотря по свойству бо-лѣзненныхъ явленій, предписываются либо про-тивувоспалительныя, послѣ отравленія кисло-тами и оспрыми ядами употребляемыя (спр. 283-285) средства, либо же шѣ средства, копорыя назначаютъ послѣ отравленія нар-копическими ядами (спр. 289-290). Въ особен-ности же, *послѣ отравленія спиртными на-питками:* животъ покрывается холстиною, намоченною въ укусъ; даются кислыя пишія, спавяпся промывашельныя; при наклонности къ поспрѣлу назначается кровопусканіе изъ яремной вены, или припущеніе пѣявицъ къ шеѣ; въ легчайшихъ случаяхъ кислыя оп-рыжки и другіе подобные припадки, слѣдую-щіе послѣ значительнаго употребленія спирт-ныхъ напитковъ, прекращаются приемами

*) Delirium tremens, какъ слѣдствие продолжи-

магnezіи, употребленными предъ ночнымъ сномъ *). *Послѣ отравленія рожками:* когда боль, холодъ и ступоръ членовъ означаютъ приближающееся омертвѣніе, то оное оповращается внесеніемъ больного въ сухую, теплую комнату и положеніемъ въ теплую постель, коея постылка часто перемѣняется. Нужно припомъ сдѣлать ножную ванну (*pediluvium*) изъ ароматныхъ травъ съ уксусомъ и шерсть члены холстиною, омоченною въ сію же жидкость, съ прибавленіемъ къ ней настойки бузиновыхъ или померанцовыхъ цвѣтовъ и нѣсколько жидкаго амміака. Равно члены покрываются холстиною, смоченною щелокомъ изъ зоды, или опваромъ хины, съ прибавленіемъ къ нему напашыря и ромашковой настойки. Сія послѣдняя жидкость дается также внутрь, по рюмкѣ, раза три въ день. Можно также съ пользою предписывать для внутренняго употребленія *infusum serpentariae virgin. cum oxymelle*. Если однако ступоръ и холодъ въ членахъ продолжается, то прикладывается къ онымъ нарывный пластырь, и когда уже показалось пельнаго пьянства, излѣчиваются новѣйшіе Врачи *per opiate*.

омершвѣніе, по часпи омершвѣлыя примачивающа расшворомъ въ кипячей водѣ пережженныхъ квасцовъ, зеленого купороса и поваренной соли. Если наконецъ нужнымъ окажется опсѣченіе члена, по должно оное предпринимать не прежде, какъ когда сдѣлается примѣшная граница между здоровыми и омершвѣвшими часпиями, и въ семь-по именно мѣспѣ должно производить опсѣченіе члена. Вообще операція сія назначается, когда омершвѣніе въ одномъ мѣспѣ члена оспановилось, когда онымъ членъ шакъ разспроенъ, что и по выздоровленіи безъ операціи движеніе члена было бы запруднительно и почти невозможно, когда припомъ омершвѣлыя часпи не скоро опдѣляюща, но гниють и заражають больного.

Послѣ укушенія ядовитыми змѣями: когда опасныя припадки миновались, по снимается съ раны ѣдкое вещество и прикладывается вмѣсто того холспина, намоченная Прованскимъ чистымъ масломъ, а подъ конецъ прикладывается сухая корпія. Г. Боттеръ снимаетъ по прекращеніи опасныхъ припадковъ повязку съ оправленного члена и даетъ больному нѣсколько драхмъ Эпоом-

ской соли, дабы предотвращить вредное дѣйствіе, могущее послѣдовать отъ употребленія раздражающихъ средствъ. Въ одномъ случаѣ рана ядовитая поддерживалась въ нагноеніи чептыре недѣли и оправленный (*per methodum antiphlogisticam et antisepticam*) совершенно былъ излеченъ *).

При склонности раны къ омертвѣнію дается *china cum sale ammoniaco* и дальнѣйшее лѣченіе располагается такъ, какъ послѣ оправленія рожками.

Послѣ ужаленія скорпионоиъ и другими насѣкомыми: воспаленіе раны пребуесть соопшвѣшвенныхъ средствъ. Большею однако частію въ Европейскихъ странахъ доспашочно бываесть для совершеннаго излеченія обмываніе ужаленнаго мѣста холодною водою, Гулардовою водою, уксуомъ и проч. **)

*) *Zeitschrift für Natur u. Heilkunde. Herausg. v. d. Professoren der Chirurgisch-medizinischen Akademie zu Dresden. 5-ten Bandes 1-tes Heft.*

*) По увѣренію Гг. *Сцовига* и *Стувена*, путешествующихъ, по Высочайшему повелѣнію, въ Арменіи по рѣкѣ Араксу, ужаленіе такъ называемаго Міанскаго клопа (*Argas persicus. Fischer*), почипаемаго донынѣ весьма ядовитымъ, столь же неопасно, какъ и ужаленіе

Послѣ отравленія, причиненнаго животными, употребленными въ пищу: слабительныя, повпоряемыя въ продолженіи всей болѣзни. При воспалительныхъ припадкахъ назначаются вышеозначенныя (спр. 283-285) средства. Когда угрожаетъ онѣмѣніе, то, по совѣту Кернера *), нужно употреблять ванны изъ сѣрной печени. Кинѣ **) похваляется для сего элекпричество.

осы или комара. Г. Сцовитъ, пробудившись однажды опъ сна, нашель на своихъ подушкахъ два Міанскихъ клопа и въ тоже время увидѣль на пѣлѣ своемъ два пѣшна, подобныя пѣмъ, какія бывають послѣ ужаленія комарами. Онѣ обмывалъ пѣшна сіи чистою водою и чрезъ 37 дней не имѣль никакой перемѣны въ своемъ здоровѣ. Равно ужаленіе *Solpugae aranoidis* не имѣеть, по увѣренію Г-на Стувена, смертельныхъ послѣдствій. (*Journal de St. Pétersbourg. No 109. 11 Septembre.*

*) Привед. сочин. стр. 357.

**) Вышеприв. сочин.

У.

**О главныхъ способахъ лѣченія
болѣзней.**

(Изъ The American Journal of the medical sciences. 1828.)

Три суть главные способа лѣченія болѣзней: лѣченіе выжидательное (*medicina expectans*), дѣятельное или превожашее (*med. agens, vel perturbans*) и физиологическое (*med. physiologica*).

Первое или выжидательное лѣченіе болѣзней составляло мѣтоту Философской Греческой секты. *Гиппократъ* слѣдовалъ сей мѣтотѣ и весьма одобрялъ оную, а попому и названа она *Гиппократовою* мѣтотодою. Послѣдователи системы сей утверждаютъ, что законы животнаго организма могутъ, въ обширномъ значеніи, исправлять уклоненія естественныхъ дѣйствій, въ коихъ заключающія болѣзни и приводить оныя обратно въ естественное ихъ состояніе. Посему они при-

знають въ цѣломъ органическомъ соснаві врачующія силы, которыя его сохраняють, и дѣйствуя безпрепятственно, въ болѣйшей части больныхъ и скоропечныхъ болѣзней производящъ счастливый исходъ. Они полагають, что силы сіи въ болѣйшей части случаевъ доспапочны для лѣченія болѣзней. Болѣзни, особенно скоропечныя, бывъ предоспавлены напурѣ, проходящъ, по наблюденію всѣхъ временъ, чрезъ послѣдовательные періоды поспепеннаго развитія, приращенія, сильнѣйшаго ожеспоченія, упадка и выздоровленія. Въ нѣхъ случаяхъ, гдѣ рѣшеніе или окончаніе болѣзни имѣетъ воспослѣдовать чрезъ переломъ, часто замѣчающія нѣкоторыя умноженныя опдѣленія, какъ по: мочи, поппа, поносъ и проч., либо переносы. По великому множеству наблюдений сего рода, сдѣланныхъ опличнѣйшими Врачами всѣхъ временъ, не лзя опвергать того, что скоропечныя болѣзни имѣють произвольную наклонность къ исцѣленію, которое совершается одними только усиліями организма. Сіи усилія обнаруживающія нѣмъ явственнѣе и подають нѣмъ болѣую надежду, чѣмъ болѣе больной одаренъ здоровымъ нѣмосложеніемъ, находящ-

ся въ зрѣломъ возрастѣ, тѣмъ менѣе онъ въ жизни своей изнурилъ органы свои значительными уклоненіями отъ правилъ Гигіены. Дѣйствуя по симъ началамъ и сужденіямъ, выжидательный практикъ есть тщательный и оспорожный наблюдатель болѣзни; онъ довольствуется удаленіемъ причинъ, произведшихъ оную; защищаетъ своего больного отъ вредностей или отъ всего того, что можетъ непріязненнымъ образомъ дѣйствовать на него; старается о томъ, чтобы неосновательными и неблагоприятными поступками не мѣшали произвольнымъ усиленіямъ природы и вспомошествовать имъ чрезъ тщательное и благоразумное употребленіе діететическихъ средствъ, какъ физическихъ, такъ и моральныхъ.

Выжидательная метода была принята и подтверждена ученѣйшими и славнѣйшими Врачами-Философами всѣхъ временъ. Она была системою Греческихъ Врачей, отъ чего и названа Греческою Медициною; она получила одобреніе ученаго *Цельса*, какъ явствуетъ изъ слѣдующаго мнѣнія: *multi magni morbi curantur abstinencia et quiete*; она защищена была *Алберто* въ его диссертаціи:

De cura per expectationem, *Калперолъ* въ его сочиненіи: De optima agendi vel expectandi in medicina ratione, *Шталемъ* въ его сочиненіи: Ars sanandi cum expectatione; она была принята и подкрѣплена *Гофманолю* въ разныхъ его сочиненіяхъ: De optima naturae morbis medendi methodo. De medicina simplicissima et optima: motu, inedia, aquae potu. De inedia magnorum morborum remedio; она была поддерживаема и объяснена *Пинелли* въ его *Medicine clinique* и *Nosographie philosophique*. И въ самомъ дѣлѣ за три предъ симъ столѣтія Французскіе Врачи почти исключительно употребляли выжидательное лѣченіе. Общественство сіе надлежитъ приписать высокому уваженію, каковымъ пользовались во Франціи *Гиппократовы* сочиненія, равно также и тому, что Врачи спраны сей не имѣютъ никакой связи съ торговлею лѣкарствами и съ поую частію Фармаціи, которая ведетъ къ униженію науки и къ злоупотребленію въ практикѣ.

Самые предубѣжденные не могутъ оспаривать того, что выжиданіе въ Медицинѣ есть дѣйствіе совершенно благоразумное, что оно основано на законахъ организма, что въ простѣйшихъ воспалительныхъ и лихорадоч-

ныхъ болѣзняхъ оно совершенно довлѣтельно для приведенія больного, вѣрно и безопасно, къ желаемой цѣли. Но въ болѣзняхъ, копорыя сильно поражаютъ человѣческій организмъ, распроспраняются на многіе органы, причиняютъ онѣмъ и безсиліе въ осправленіяхъ ихъ, такъ что удерживаютъ спасительное ихъ взаимное дѣйствіе, возбуждаютъ неправильныя и безпорядочныя явленія, прерывающія обыкновенное теченіе болѣзней и разрушающія всѣ цѣлительныя усилія организма, въ сихъ болѣзняхъ выжиданіе, въ собственномъ его значеніи, было бы весьма предосудительно. Въ такихъ случаяхъ искусство должно присоединиться съ спасительными своими мѣрами и доставивъ изнемогающей напурѣ помощь своими дѣйствительными средствами, только бы оныя предлагались опытною рукою и располагались съ благоразуміемъ и искусствомъ.

Гомеопатическое врачеваніе *Ганнеланово* *), начинающее привлекать къ себѣ сполько послѣдователей въ Германіи, есть не иное что, какъ только выжиданіе. Не взирая на споль ааспарѣлыя и глубоко вкоренившіяся понятія

*) Основанія онаго см. В. М. Ж. Ч. IX. N. 3.

и предразсудки, привыкшіе почитать лѣкарства, какъ единственнае средство къ преодолѣнію и лѣченію болѣзней, Гомеопатики въ лѣченіи своемъ приписываютъ каждое благопворное направленіе или перемѣну несомнѣнному дѣйствію миллионной, билліонной и даже квадрилліонной *) чаши капли наспоекъ, хины, наперсточной правы, болиголова и проч., охотнѣе, нежели какимъ либо спасительнымъ дѣйствіямъ самаго организма.

Дѣятельная или преобладающая система совершенно противоположна выжидательной. Практикъ, дѣйствующій по сему плану, слагаетъ съ себя характеръ и поведеніе, каковыя *Баглови* споль справедливо и прекрасно приписываетъ Врачу въ самомъ началѣ своей *Praxeos medicae: medicus naturae minister et interpres, quidquid meditetur et faciat, si naturae non obtemperat, naturae non imperat.* Въ противность сему, природа не принимается, какъ вспомогательница, и ея усилія разсмаприваются какъ болѣе вредныя, нежели благопворныя. Говоря словами Профессора *Рурша* (Rush), напура при входѣ Врача въ комнату больного должна быть выгнана изъ

*) Даже дециллионной. Ред.

оной, какъ шумливая кошка, причиняющая безпокойство. Поступая по дѣятельной методѣ лѣченія, должно имѣть въ виду быстрое прекращеніе болѣзни, за однимъ разомъ, какъ нѣкоторыя выражаютъ сіе, и для того нужно прибѣгать къ самымъ сильнымъ средствамъ. Героическія средства раздаются щедрою рукою; непрерывная и неупоминная дѣятельность является въ предписываніи и подаваніи лѣкарствъ; каждый органъ приводится въ дѣятельность, каждое оппавленіе бываетъ тревожимо, каждый испражнительный пушъ насильно направляется къ тому, чтобы болѣзнь извержена была чрезъ оный. Кровопущаніе, рвопныя средства, слабительныя, попогонныя, мочегонныя, усиливающія оппѣленіе слюны, испражняющія грудную мокроту, возбуждающія, замѣняются быстро одно другимъ, а нерѣдко всѣ употребляются въ одно и тоже время; каждая вещь превращается въ лѣкарства; они разсмаприваются какъ всемогущія; природа, цѣлительныя силы органическаго состава почищаются за ничто; спасительное ихъ вліяніе дѣлается неизвѣспнымъ, или же горделиво презирается,—хотя, къ счастью больного, сіи пренебре-

женныя силы часто одерживаютъ побѣду надъ болѣзнію, лѣкарствомъ, Врачемъ и вредными его поспухами. Героическія лѣкарства возбуждаютъ дѣйствіемъ своимъ величайшую тревогу въ организмъ; они обладаютъ такою степенью дѣятельности, которая не уступаетъ никакой болѣзнетворной причинѣ и превышаетъ болѣеую часть сихъ причинъ. Это суть шѣ средства, которыя, будучи употреблены не во время, или безъ надлежащаго выбора, или же, будучи приведены въ худое направленіе, могутъ имѣть пагубнѣйшія послѣдствія. Употребленіе ихъ требуетъ со стороны Врача величайшей осторожности, обширныхъ теоретическихъ и практическихъ свѣденій въ наукѣ своей и совершеннаго искусства.

Дѣятельный или тревожащій способъ лѣченія долженъ быть назначаемъ съ благоразумною осмотрительностію. Сего способа не должно употреблять безъ разбора, но предоставлять оный для такихъ только случаевъ, гдѣ болѣеая часть важнѣйшихъ органовъ находится въ болѣзненномъ состояніи, гдѣ отправления ихъ разстроены, естественныя отдѣленія задержаны, гдѣ мало осталось здоро-

выхъ органовъ, способныхъ пролившись бол-
нымъ органамъ и мало сочувственныхъ здо-
ровыхъ дѣйствій, могущихъ пропировобореще-
вать болѣзненнымъ дѣйствіямъ, гдѣ слѣд-
ственно благоразуміе не позволяетъ ожидать,
чтобы организмъ самъ собою могъ освободить-
ся отъ болѣзни. Въ сихъ - то обстоятель-
ствахъ должно прибѣгать къ дѣятельному
врачеванію, и вспомошествованіе, доставляе-
мое имъ угнетенной и изнемогающей напу-
рѣ, часто одерживаетъ побѣду тамъ, гдѣ
она была бы сомнительна, или гдѣ безъ его
дѣйствія разрушеніе было бы неизбежно.

Однакожъ дѣятельное врачеваніе въ сущно-
сти своей весьма часто есть эмпирическое.
Лѣкарствами приписываются предполагаемыя
специфическія качества, которыя означаю-
тся именно какъ средства противъ особен-
ныхъ болѣзненныхъ припадковъ. Для лихора-
докъ имѣются средства противу лихорадочныхъ,
для кашля средства, извергающія грудную
мокроту, для слабости (выраженіе, худо по-
нимаемое и весьма злоупотребляемое) крѣпи-
тельныя и возбуждающія, для изліяній спя-
гивающія и всасывающія, для судорогъ про-
тивусудорожныя, для недоснапка мѣсячныхъ

кровей мѣсячегонныя, для водяной болѣзни мочегонншельныя и водогонныя, а для всѣхъ болѣзней рѣшная панацея. Если сообразно съ сими основаніями предписаны лѣкарства, то не лѣзя положишься на ихъ дѣйствіе. Тотъ же родъ припадковъ происходитъ отъ совершенно противоположныхъ причинъ, принадлежащихъ болѣзненнымъ состояніямъ органовъ совершенно различныхъ и требуетъ благо-разумнаго разсмотрѣнія при опредѣленіи свойства ихъ и употребленіи соотвѣствующихъ имъ лѣкарствъ. Кромѣ сего, нѣтъ ничего, что было бы столь мало доказано, какъ специфическое дѣйствіе лѣкарствъ; столь не-вѣрно, какъ способность ихъ къ произведе-нію тѣхъ именно цѣлишельныхъ дѣйствій, копорыя имъ присвоены; столь несомнѣнно, какъ то, что они нерѣдко усиливаютъ по-же самое состояніе, для удаленія коего упо-требляются. И такъ лѣкарства должно раз-сматривать только въ отношеніи къ роду вліянія ихъ на органическія дѣйствія частей тѣла, вступающихъ въ соприкосновеніе съ оными и отдаленныхъ, также въ отноше-ніи къ взаимной связи между симъ вліяніемъ и наслоящимъ состояніемъ органическихъ дѣй-

ствій. Ни на какомъ другомъ основаніи они не могутъ быть предписываемы съ пользою, безопасностію и удовлетвореніемъ.

Дѣятельное или превозжащее врачеваніе владычествуетъ въ Великобританіи и прогрессируетъ здѣсь до значительной степени опасной дѣятельности и эмпиризма. Какъ Соединенные Штаты Американскіе заимствовали отъ сей страны свои свѣденія, то и въ оныхъ врачеваніе сіе весьма обыкновенно. Свойство Англійской Врачебной Науки повреждено было неправильнымъ устройствомъ Медицинской части. За нѣсколько предъ симъ столѣтіемъ двѣ трети Великобританской врачебной практики оставались въ рукахъ Аптекарей. Обстоятельство сіе родилось изъ рѣшенія Верхняго Парламента по аппеляціи Королевскаго Суда, касательно возникшаго въ Коллегіи Врачей дѣла объ Аптекарь *Рози*, который былъ преслѣдуемъ за нарушеніе постановленій о предписываніи лѣкарствъ больнымъ. Судъ пропивъ *Рози* былъ отвергнутъ, и чрезъ сіе доспомянутое рѣшеніе законодателей и Судей Англійскіе Аптекари получили право предписывать и раздавать лѣкарства боль-

нымъ; въ тоже время запрещено имъ было пребывать награды за посѣщенія больныхъ. Награда Англійскихъ Аптекарей за ихъ посѣщеніе зависяла отъ лѣкарства, употребленнаго больнымъ, и чѣмъ больше лѣкарствъ онъ принимаетъ, тѣмъ болѣе выгоды имѣетъ Аптекарь. Если бы спокойствіе и діета, вмѣстѣ съ разводящими пиявками на одинъ или два дня, составляли всю потребность при лѣченіи, то, очевидно, Аптекарь, присовѣщавшій сіе средство, не имѣлъ бы чѣмъ содержать себя. Чтобы получить награду за свои услуги, онъ долженъ предписать haustum или пилюли, юлепъ или другое лѣкарство, и если оно дѣйствуетъ сильно, то въ девяти случаяхъ изъ десяти здороваго чело-вѣка превратить въ дѣйствительно больнаго, который будетъ плакать хорошо до тѣхъ поръ, пока будетъ имѣть надобность во врачебной помощи. Англійскіе Аптекари прежнихъ временъ весьма отличались отъ нынѣшнихъ, составляющихъ классъ людей разсудительныхъ и благовоспитанныхъ *).

*) Что обстоятельство сіе нынѣ вовсе измѣнилось, о томъ можно удостовѣриться изъ сочиненія Clarke: Defence of the medical science in Great-Britain. Ред.

Они были несвѣдуши и худо образованы; они не были уважаемы въ почтенномъ кругу; нѣчто укоризненное соединялось съ симъ званіемъ. Практика ихъ была необходимо эмпирическая, состояла въ слѣпой и полной довѣренности къ лѣкарствамъ и специфическимъ средствамъ; они совершенно пренебрегали спасительныя и могущественныя пособія діететическія, которыя были для нихъ вовсе неизвѣстны и оспивались безъ всякаго уваженія. Философская Медицина и наблюденіе природы, изслѣдованіе законовъ организма, коего направленіе и измѣненіе есть цѣль образованнаго и испинно свѣдущаго практическаго Врача, не могли существовать въ врачебномъ быту, основанномъ на правилахъ Англійскаго Аптекаря, или главнаго практика. Значительная часть Англійскихъ Врачей, находясь въ семъ состояніи, смѣшивая занятія совершенно различныя, которыя всегда должны быть отдѣльными, соединяя торговлю съ наукою, а Фармацію съ врачебною практикою, произвела неблагоприятное вліяніе на Англійскую Медицину. Сія содержитъ въ себѣ много Арабской Медицины, коея опличительною чертою была

Полифармація и совершенная довѣренность къ предположеннымъ специфическимъ средствамъ. Мы все еще видимъ, что въ Англійской Медицинѣ продолжается съ предосудительными видами стремленіе къ новымъ врачевательскимъ средствамъ, новымъ образцамъ (рецептамъ), хотя врачебное вѣщесловословіе уже слишкомъ обременено множествомъ лѣкарствъ; хотя практика доспашочно показала, что обиліе Фармація служитъ вѣрнымъ доказательствомъ ея безсилія и что множество извѣстныхъ средствъ противъ какой либо болѣзни есть свидѣтельство въ безполезности ихъ; хотя милліоны опытовъ и двѣ тысячи лѣтъ опытности, пропекшія безъ ошкрытія и одного специфическаго и совершенно дѣйствительнаго средства противъ какой либо болѣзни доспашочно обнаружили всю тщетность сей надежды. Время уже предасть забвенію сей призракъ Врачебной Науки, подобно тому, какъ забыта пущая мечта пресветней Философіи—Философскій камень.

Физиологическое врачеваніе есть новѣйшаго происхожденія; касательно усовершенствованія и обстоятельнаго опредѣленія его Бруссэ приобрѣлъ себѣ право именоваться

возобновили сего учения *). Основаніе системы Медицины на Физиологическихъ началахъ не есть новоспъ. На сіе часто покупались. Система покойнаго Профессора Рутша (Rush) была Физиологическая система Медицины; но тогда Физиологія находилась въ состояніи, весьма отличномъ отъ нынѣ; въ какомъ она нынѣ находится. Аналитическая Анатомія не показала точнымъ образомъ простоты теловѣческаго состава; ученіе о перепонкахъ или тканяхъ, составляющее эпоху въ Медицинѣ, было неизвѣстно, особенно въ Англіи и Америкѣ; равно незнакома была объѣмъ симъ спирамъ общаго Анатоміи Бина, — сочиненіе, которое Профессоръ Чаплинъ (Chapman) провозгласилъ въ своихъ лекціяхъ *откровеніемъ въ Медицинѣ*. Не возможно было, чтобы Физиологическое врачебное ученіе при такомъ состояніи науки могло сдѣлать болѣе, какъ только нѣсколько приблизиться къ истинѣ; совершенно не было удѣломъ чловѣческаго генія. Что Доктора Рувъ погрешилъ, что сего и должно было ожидать, и сіе имало не предосудительно для ясности его понятій, бодрости умственной.

*) См. В. М. Ж. Ч. XII. No 1.

ныхъ его способностей или его здраваго разсудка; все сіе должно приписать недоспашику нашихъ Анапомическихъ и Физиологическихъ знаній,—главнаго основанія, изъ котораго могли бы бытъ выведены начала его системы. Однакожъ главныя основанія Доктора Руша, за исключеніемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, исправленныя ученіемъ общей Анапоміи, сближающіяся съ началами Физиологической Медицины Г-на Брюсе и подтверждающія ихъ правильность.

Патологическое ученіе, преподаваемое за нѣсколько лѣтъ предъ симъ нынѣшнимъ Профессоромъ теоретической и практической Медицины въ Пенсильванскомъ Университетѣ, имѣетъ во многихъ отношеніяхъ точное сходство съ ученіемъ Французскаго возобновителя. Однакожъ по несовершенству нашей Физиологіи, какъ науки, изъ которой должны бытъ выводимы всѣ здравыя и обстоятельныя сужденія Патологическія, онъ встрѣпилъ пѣже самыя затрудненія, какимъ подвергались всѣ учиненныя доселѣ покушенія къ составленію цѣлой Физиологической системы.

Физиологическая Медицина полагаетъ основаніемъ своимъ строеніе человѣческаго соспа

•

ба, здоровыя дѣйствія и законы, управляющіе
 ими. Человѣческій составъ есть сложный
 животный механизмъ. Онъ состоитъ изъ
 многочисленныхъ органовъ, изъ коихъ каждый
 имѣетъ особенныя управленія; органы сіи
 расположены въ рядъ орудій, назначенныхъ для
 управленія известныхъ дѣйствій; каждый
 органъ самъ по себѣ есть сложный составъ,
 разбѣшаемый на части, именуемыя тканя-
 ми или перепонками; притомъ каждая ткань
 имѣетъ особенное свойство дѣйствія и уп-
 равленія.

Органы и различныя органическія орудія не-
 одинакую имѣютъ важность въ дѣйствіи
 жизни; нѣкоторые изъ нихъ дѣйствуютъ на
 жизнь опосредованно и посредственно, другіе не-
 посредственно; они находятся одинъ къ дру-
 гому въ различной степени отношенія; нѣ-
 которые весьма тѣсно связаны между собою
 и состоятъ во взаимной и непосредственной
 зависимости; между другими связь не столь
 тѣсна, а между нѣкоторыми низшими она
 едва существуетъ. Органы и орудія связаны
 между собою двоякимъ образомъ. Первая связь
 зависитъ отъ управленій, болѣе или менѣе
 существенно свойственныхъ дѣйствіямъ каж-

даго изъ нихъ. Вторая происходитъ отъ сообщенія впечатлѣній и дѣйствія одного на другой, что совершается чрезъ сочувствіе. Сія послѣдняя связь бываетъ въ органахъ различна по степени и обширности. Она называется весьма дѣятельною и обширною въ большей части важныхъ органовъ.

Всѣ впечатлѣнія на органы должны быть воспринимаемы ихъ жкаными. Каждое впечатлѣніе производитъ нѣкоторую перемѣну или измѣненіе въ дѣйствіи жкани, къ коей проводится, и каждая перемѣна въ дѣйствіи должна быть сопровождаема перемѣною въ строеніи. И такъ болѣзнь, какъ слѣдствіе неправильныхъ впечатлѣній, есть перемѣна въ дѣйствіи и строеніи жкани какого либо органа.

Болѣзнь въ началѣ своемъ всегда бываетъ мѣстная; но другіе органы чрезъ сочувствіе участвуютъ въ болѣзненномъ состояніи. Важные органы, имѣющіе весьма многочисленныя и дѣятельныя сочувствія, спрадаютъ въ большей части болѣзней либо первоначально, либо послѣдственно.

Болѣзни, какъ уклоненія особыхъ жканей отъ естественныхъ дѣйствій и строенія, никогда не бываютъ повсемѣстными, но во-

гда мѣспными. Никогда всѣ ткани и органы не находящіяся въ одно и тоже время въ болѣзненномъ состояніи. Чѣмъ большее бываетъ число мѣспныхъ спраданій и чѣмъ важнѣе спраждающіе органы, тѣмъ затруднительнѣе возстановленіе здоровья. И такъ поелику болѣзнь естъ всегда мѣспная, то различныя системы или органы могутъ въ одно и тоже время находиться въ весьма противоположномъ состояніи и требовать разнаго лѣченія, приспособленнаго къ каждому изъ нихъ.

Изъ сего общаго начертанія основаній Физиологической Врачебной Науки явствуетъ, что каждая особая болѣзнь представляетъ практическому Врачу для разрѣшенія слѣдующія проблемы:

По даннымъ извѣстнымъ припадкамъ опредѣлить органы и ткани, находящіяся въ болѣзненномъ состояніи.

По даннымъ органамъ и тканямъ опредѣлить свойство болѣзней въ каждомъ изъ нихъ.

По даннымъ органамъ, тканямъ и свойству сихъ болѣзней опредѣлить, какими діететическими и терапевтическими средствами, какими способами дѣйствія на ткани и чрезъ

такія фізіологіческія послѣдствія практика
моженъ преодолѣвъ сіи болѣзни прямѣй-
шимъ и скорѣйшимъ образомъ и съ безопас-
ностію для больного.

Таковы сунъ проблемы, которыя каж-
дый Физіологическій Патологъ по собственно-
му убѣжденію почишаеъ себя обязаннымъ
рѣшить, прежде нежели онъ приступитъ къ
начертанію плана лѣченія, коего предмѣтомъ
есть дѣятельное и могущественное измѣне-
ніе законовъ и дѣйствій жизни.

Изъ главныхъ способовъ лѣченія болѣзней
я предпочитаю сей послѣдній и упоиреб-
ляю въ бѣльшей части болѣзней, предпо-
ручаемыхъ моему врачеванію. Въ долгопро-
должительныхъ болѣзняхъ, неизлѣчиваемыхъ
надлежащимъ способомъ врачеванія, я по
бѣльшей части прибѣгаю къ выжидатель-
ному врачеванію, и только въ нѣкоторыхъ не-
ясныхъ случаяхъ, гдѣ другіе способы лѣченія
не оказали никакого пособія, приступаю къ
преобладающему и эмпирическому врачеванію.

V.

**ОФФИЦІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ СЪ 1-ГО
СЕНТЯБРЯ ПО 1-Е НОЯБРЯ 1829 ГОДА.**

**1. *Опредѣленіе Медицинскихъ Чиновниковъ
на высшія мѣста.***

Дивизионными Докторами въ 20-ю пѣхотную Дивизію Шпабъ-Лѣкаръ Эриванскаго Караванернаго полка Коллежскій Ассесоръ Силчъ. Старшими Лѣкарями: Въ Одесскомъ пѣхотномъ полку Шпабъ-Лѣкаръ онаго полка Феоклисповъ, въ Азовскомъ пѣхотномъ полку Лѣкаръ сего же полка Савицкій.

2. *Вновь поступившіе въ службу.*

Изъ Московскаго Университета Докторы Медицины Кодрапъ Чайковскій въ Днѣпровскій пѣхотный полкъ, Іосифъ Тихоновичъ во 2-ю армію сверхъ комплекта. Изъ Дерптска-

го *Университета* Лѣкари: 1-го опдѣленія Августъ Амелунгъ и 3-го опдѣленія Карлъ фонъ Шмидтъ во 2-ю армию сверхъ комплекта. Изъ *Харьковскаго Университета* Лѣкарь 1-го опдѣленія Андрей Дьяковъ въ 19-й Егерскій полкъ. Изъ *Вилenskaго Университета* Лѣкари: 2-го опдѣленія Францискъ Мисюнкевичъ и 3-го опдѣленія Антонъ Колиновскій и Антонъ Лешевскій въ резервныя войска 2-й армии сверхъ комплекта, 2-го опдѣленія Антонъ Яцкевичъ въ Полтавскій пѣхотный полкъ; Вечеринарные Лѣкари: 2-го опдѣленія Иванъ Фрейманъ въ Сумскій Гусарскій полкъ и 3-го опдѣленія Клементій Смыковский въ Арзамасскій Конно-Егерскій полкъ. Изъ *отставныхъ*: Докторъ Медицины Надворный Совѣтникъ Лука Богушевичъ въ Киевскую военную госпиталь Ординапоровъ; Шпабъ-Лѣкарь Надворный Совѣтникъ Иванъ Волперъ въ Выборгскую военную госпиталь Ординапоровъ; Шпабъ-Лѣкарь Коллежскій Совѣтникъ Андрей Вишлянскій и Шпабъ-Лѣкарь Коллежскій Ассесоръ Михайло Рукинъ во 2-ю армию сверхъ комплекта. Изъ *Волепопрактырующихъ*: Лѣкари Василий Козловскій въ 37-й Егерскій полкъ, Александръ Шпельцнеръ

во 2-ю армию сверх комплекта, Вильгельм Цюмировскій въ 38-й Егерскій полкъ, Михайло Гобделъ въ Ясскую военновременную госпиталь, Николай Парлу во 2-ю армию сверх комплекта, Николай Хребшовъ въ 20-й Егерскій полкъ. *Изъ Иностранцевъ* Лъкаръ Нейманъ во 2-ю армию сверх комплекта.

3. Увольненіе отъ службы.

Ординапоръ С. Петербургской военносухопушной госпитали Штабъ-Лъкаръ Коллежскій Совѣтникъ Цагель.

4. Производство въ чины званія.

Въ Докторы Медицины Лъкаръ Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полка Завадскій-Краснопольскій. *Въ Штабъ-Лъкари* Лъкари: Войска Донскаго Поповъ, поселеннаго 4-го Карабинернаго полка Бродзскій, 9-го Егерскаго полка Персяниновъ, Ординапоръ Бабадагской военновременной госпитали Панскій, Линковскаго пѣхотнаго полка Дзвонковскій, Лейбъ-Гвардіи Семеновскаго полка Сахаровъ, Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полка Клоссе, Ординапоръ Тульчинской военной госпитали Поповъ, Ординапоръ Севастопольской военной госпи-

нали Филиповъ, Ординашоръ Тифлисской военной госпитали Успенскій, Ординашоръ Омской военной госпитали Рѣпьевъ, 9-го Линейнаго Сибирскаго баталіона Музалевскій, Томскихъ Эшапныхъ командъ Тамлинскій, 14-го линейнаго Сибирскаго баталіона Рыбинскій, 2-го Учебнаго Карабинернаго полка Парначевъ, Конно-Артиллерійской № 25-го роты Негодяевъ, Линейнаго Оренбургскаго баталіона № 4-го Тихомировъ и Прозекторъ Зоотоміи Императорской Медико-Хирургической Академіи прикомандированный къ С. Петербургской военносухопушной госпитали для исправленія Ординашорской должности Нарановичъ 2-й. *Въ Ветеринарныя Лѣкари Ветеринарныя Помощники:* Починковскаго военного конскаго завода Соболевъ, Переяславскаго Конно-Егерскаго полка Анищенко.

6. Награды.

За отлично-усердную службу Всемилостивѣйше награждены чинами: *Статскаго Советника* Дивизионный Докшоръ 17-й пѣхотной Дивизіи Коллежскій Совѣтникъ Екатерининскій; *Коллежскаго Советника* Дивизионный Докшоръ 21-й пѣхотной Дивизіи Надворный Совѣтникъ Ильашенко; *Надворнаго*

Совѣтника: состоящій при Генералъ-Штабъ-Докторъ 2-й арміи Докторъ Медицины Коллежскій Ассесоръ Геллингъ, исправляющій должность Дивизионнаго Доктора 6-й пѣхотной Дивизіи Коллежскій Ассесоръ Шорнманъ, Конно-Артиллерійской Но 22-го роты Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Препориусъ, Старшій Лѣкаръ Селенгинскаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Масальскій, Дивизионный Докторъ 22-й пѣхотной Дивизіи Коллежскій Ассесоръ Земскій; *Коллежскаго Ассесора:* Старшій Лѣкаръ Гусарскаго Принца Оранскаго полка Штабъ-Лѣкаръ Воскресенскій, Штабъ-Лѣкаръ Софійскаго пѣхотнаго полка Вороничъ, Тобольскаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкаръ Баженовъ, Колыванскаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкаръ Копыповскій, 11-го Егерскаго полка Штабъ-Лѣкаръ Веспенгольцъ, 16-й Артиллерійской Бригады Штабъ-Лѣкаръ Злобинъ, 21-го Егерскаго полка Штабъ-Лѣкаръ Снинко. *Орденами:* Св. Владимира 3-й степени: Главный Медикъ 2-й арміи Докторъ Спандскій Совѣтникъ Шлегель и Старшій Медикъ 3-й Гусарской Дивизіи Спандскій Совѣтникъ Кочура; *того же ордена 4-й степени:* Ди-

визионный Докшоръ 16-й пѣхотной Дивизіи
 Надворный Совѣтникъ Чупрыгинъ, Спаршій
 Медикъ 4-й Уланской Дивизіи Коллежскій
 Ассесоръ Миловановъ, Спаршій Лѣкаръ Мо-
 сковскаго Драгунскаго полка Шпабъ-Лѣкаръ
 Аманскій, Шпабъ-Лѣкаръ Томскаго пѣхотна-
 го полка Савинъ, Шпабъ-Лѣкаръ Намебург-
 скаго пѣхотнаго полка Коллежскій Ассесоръ
 Миргородскій, Спаршій Лѣкаръ Купайской
 военной госпитали Шпабъ-Лѣкаръ Надворный
 Совѣтникъ Бѣлявскій; *Св. Анны 3-й сте-*
пени: Спаршій Лѣкаръ Ахтырскаго Гусарскаго
 полка Докшоръ Медицины Пептерсонъ, Шпабъ-
 Лѣкари: Александрійскаго Гусарскаго полка
 Гриневичъ, 34-го Егерскаго полка Пальцовъ,
 31-го Егерскаго полка Шнейдеръ, 32-го Егер-
 скаго полка Красногорскій, 9-й Артиллерійской
 Бригады Циповичъ, Лѣкаръ Охотскаго пѣхот-
 наго полка Левицкій, состоящій въ Опѣль-
 номъ Кавказскомъ Корпусѣ Шпабъ-Лѣкаръ
 Пироцкій, Ординапоръ Купайской военной гос-
 питали Шпабъ-Лѣкаръ Барышевъ, Ординапоръ
 Спарорусской военной госпитали Лѣкаръ Му-
 равьевъ, Ординапоръ Елисаветпольской воен-
 ной госпитали Шпабъ-Лѣкаръ Гладкій, Шпабъ-
 Лѣкаръ Кабардинскаго пѣхотнаго полка Реб-

ровъ, Штабъ-Лѣкаръ Кубанскаго Козачьяго полка Всесвятскій, Ординапоръ Кутайской военной госпитали Иергаузенъ, Старшій Лѣкаръ Одесской военной госпитали Штабъ-Лѣкаръ Кириловичъ, Штабъ-Лѣкаръ Черниговскаго Конно-Егерскаго полка Спасскій, Докторъ Медицины Балаклавскаго Греческаго баталіона Тихомировъ, Ординапоръ Димитріевской военной госпитали Лѣкаръ Яковлевъ; *Св. Станислава 2-го класса* Генераль-Штабъ-Докторъ войскъ, состоящихъ подъ начальствомъ Его Императорскаго Высочества Цесаревича Спасскій Совѣтникъ Кутковский. *Подарками:* Штабъ-Лѣкаръ Нѣвскаго пѣхотнаго полка Кричевскій, Лѣкаръ Елисаветградскаго Гусарскаго полка Лызловъ, Ординапоръ Артиллерійской госпитали Штабъ-Лѣкаръ Сивинскій Совѣтникъ Оборскій, Сполочальникъ Медицинскаго Департамента Военнаго Министрства Спасскій Совѣтникъ Талиевъ, Старшій Докторъ Тираспольской военной госпитали Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Совѣтникъ Слобеусъ, Ординапоръ Казанской военной госпитали Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Совѣтникъ Тимоновъ, Старшій Лѣкаръ Тираспольской военной госпитали Штабъ-Лѣкаръ

Коллежскій Ассесоръ Шаховъ, Старшій Лѣ-
 карь Оренбургской военной госпитали Штабъ-
 Лѣкарь Смирновъ, Ординаморъ Могилевской
 на Днѣспрѣ военновременной госпитали
 Штабъ-Лѣкарь Бугровъ, Ординаморъ Казан-
 ской военной госпитали Штабъ-Лѣкарь Ксан-
 совъ, Ординаморъ Оренбургской военной гос-
 питали Штабъ-Лѣкарь Соколовъ, Лейбъ-Гвар-
 дии Измайловскаго полка Лѣкарь Франковский.
Денежныя награжденіе: по 1500 р. въ годъ
 прибавочнаго жалованья, доколѣ будетъ нахо-
 диться на службѣ въ военномъ вѣдомствѣ, Ди-
 визионный Докторъ 7-й пѣхотной Дивизіи Спаса-
 скій Совѣтникъ Лучинскій; единовременно: 4000
 р. Штабъ-Доктору 7-го пѣхотнаго Корпуса
 Спасакому Совѣнику Аммону, 2000 р. Началь-
 нику Отдѣленія Медицинскаго Департамента
 Военнаго Министрства Доктору Медицины и
 Хирургіи Спасакому Совѣнику Сушинскому,
 1200 р. Ординамору Артиллерійской госпитали
 Штабъ-Лѣкарю Коллежскому Совѣнику Симо-
 нису; годовое жалованье: Штабъ-Лѣкарю 40-го
 Егерскаго полка Михайловскому, Старшему
 Лѣкарю Варшавской Гвардейской Военно-Рос-
 сійской госпитали Коллежскому Совѣнику
 Флоріо и исправляющему должность Корпусна-

го Шпабъ-Доктора 2-го пѣхотнаго Корпуса Спашскому Совѣшнику Никольскому.

6. Умершіе.

Шпабъ-Лѣкаръ 3-го баталіона пѣхотнаго Генералъ-Фельдмаршала Графа фонъ деръ Осигенъ-Сакена полка Басисцовъ, Ординапоръ Измаильской военновременной госпитали Лѣкаръ Егоровскій, Лѣкаръ 3-го баталіона Украинскаго пѣхотнаго полка Удимовъ, Ординапоръ Оренбургской военной госпитали Шпабъ-Лѣкаръ 9-го класса Гавриловъ, Ординапоръ Херсонской военной госпитали Лѣкаръ Лыщевъ, Ординапоръ Спирорусской военной госпитали Лѣкаръ Муравьевъ, исправлявшій должность Шпабъ-Доктора резервныхъ войскъ 2-й арміи Докторъ Спашскій Совѣшникъ Дегіо, Старшій Лѣкаръ Нарвскаго пѣхотнаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Хоруженко, Ординапоръ Кишеневской военновременной госпитали Лѣкаръ Успенскій, Ординапоръ Краіовской военновременной госпитали Шпабъ-Лѣкаръ Похорскій, Лѣкаръ Одесской военной госпитали Маіоръ, Шпабъ-Докторъ 4-го пѣхотнаго Корпуса Шпабъ-Лѣкаръ Спашскій Совѣшникъ Гольшкінъ, Шпабъ-Лѣкаръ Бакинскаго гарнизоннаго баталіона Гостевъ, Старшій Ветеринарный Лѣ-

карь Екашеринославскаго Кирасирскаго полка
 Андреевъ, исправлявшій должности Старшаго
 Лѣкаря Болградской военновременной госпи-
 тали Шпабъ-Лѣкарь Келлеръ, Ординапоръ
 Измаильской военновременной госпитали Лѣ-
 карь Ямчипскій, Ординапоръ Кіевской воен-
 ной госпитали Шпабъ-Лѣкарь Коллежскій Со-
 вѣтникъ Грушинскій, Ординапоръ Бухарест-
 ской военновременной госпитали Лѣкарь По-
 повъ, Ординапоръ Ясской военновременной гос-
 питали Докторъ Медицины Коллежскій Ас-
 сесоръ Шлессингеръ, Ординапоръ Бузевской
 военновременной госпитали Лѣкарь Бушаке-
 вичъ-Петрашевскій, Каларажской военновремен-
 ной госпитали Лѣкари: Фашѣвъ, Ассиканусъ,
 Гринихъ, Боголюбовъ и Солярскій, Младшій
 Лѣкарь Пензенскаго пѣхотнаго полка Силь-
 вановъ, состоявшій во 2-й арміи сверхъ ком-
 плекта Лѣкарь Глинскій, Шпабъ-Лѣкарь Ви-
 шебскаго пѣхотнаго полка Сильвановъ, Лѣ-
 карь 3-го непремѣннаго полка Аспираханскаго
 Козачьяго войска Шпейнбахъ.

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКІЙ
ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ
ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА.

~~~~~  
**Часть XIV N. 3.**  
~~~~~

Discere ne cessa: cura sapientia crescit:

Rara datur Iongo prudentia temporis usn.

Cato.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

ВЪ ТИПОГРАФИИ МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

1829 года.

СОДЕРЖАНІЕ.

Стран.

- I. О Гомеопатіи. 329.
- II. Примѣчательныя болѣзни костей 359.
- III. Извѣстіе о больныхъ, пользова-
ныхъ въ Терапевтической Кли-
никѣ 381.
- IV. О болѣзняхъ сердца, причинае-
мыхъ онанизмомъ 403.
- V. Объ употребленіи ртуты въ ве-
нерическихъ болѣзняхъ . . . 407.
- VI. СМѢСЬ.
1. Хлоридная известь противъ заразы. 416.
2. Лѣченіе венерической болѣзни безъ
ртути 417.
3. Лѣченіе потки совѣтъ запертаго ды-
хательнаго горла. 420.
4. Способъ лѣчить опухоль яичекъ. . . 422.
5. Каменистыя наросты на мошонкѣ . 423.
6. Къ Патологикъ столбняка. . . . —
7. Табакъ противъ перепончатой жабы. 424.
8. Лѣченіе нѣкоторыхъ болѣзней тленосо-
единеній. —
- VII. О вновь вышедшихъ книгахъ . 428.
- VIII. Официальныя извѣстія съ 1-го
Ноября 1829 по 1-е Генваря 1830 434.
-

I.

О Гомеопатіи.

Около тридцати лѣтъ предъ симъ *Ганеманнъ* въ первый разъ обнаруговалъ ученіе свое въ нѣкоторыхъ изъ прежнихъ чашей *Гуфеландова Журнала*, въ видѣ особыхъ спашей, подѣ заглавіемъ: „*Опытъ о новомъ основаніи для открытія цѣлительныхъ силъ врачебныхъ средствъ*“ *) Послѣ нѣкотораго времени онъ представилъ мнѣнія свои въ видѣ оригинальной теоріи и далъ ей названіе Гомеопатіи, взятое отъ словъ: *ομοιον* (подобный) и *παθος* (болѣзнь). Предметомъ разсужденій сихъ было: показати, что дѣйствительныя качества бѣльшей части лѣкарствъ весьма несовершенно извѣстны и

*) Versuch über ein neues Princip zur Auffindung der Heilkräfte der Arzneisubstanzen. Hufeland's Journal der practischen Heilkunde. В. I и II.

что единственный вѣрный способъ для узна-
 нія истины состояишь въ испытываніи лѣ-
 карственныхъ силъ надъ здоровыми людьми
 и въ тщательномъ замѣчаніи каждаго при-
 падка, произведеннаго употребленіемъ ихъ.
 Онъ старался показать, что симъ только
 путемъ можемъ мы достигнуть точности
 въ употребленіи лѣкарствъ при болѣзненномъ
 состояніи, или составишь истинное лечеб-
 ное веществословіе. Онъ совѣпывалъ Врачамъ
 производишь сіи опыты надъ собою, и изъ
 многихъ испытаній, учиненныхъ надъ самимъ
 собою, сдѣлалъ заключеніе, что всѣ лѣкар-
 ства, данныя здоровымъ особамъ, причиняють
 временную или искусственную болѣзнь; что
 чрезъ таковое возбужденіе искусственной бо-
 лѣзни прежде начавшаяся болѣзнь можетъ
 прекратиться скорѣе или медленнѣе, смотря
 по тому, въ какой степени припадки, возбу-
 жденные лѣкарствомъ, сходны съ припадками
 болѣзни. Онъ даже утверждалъ, что чрезъ
 продолжительное изслѣдованіе можно от-
 крыть значительное количество пропивудій,
 не только равняющихся числу болѣзней, до-
 селъ извѣстныхъ, но и весьма превышаю-
 щихъ оныя, особливо если бы таковое изслѣ-

дованіе производилось съ должнымъ спараніемъ. Словомъ, для удаленія какой либо болѣзни, зависящей опть физическихъ или моральныхъ причинъ, нужно полько, говорить *Ганеманнъ*, произвести подлинникъ ея. Въ подтвержденіе сего мнѣнія онъ спарался показати, что природа употребляетъ сей способъ въ пѣхъ случаяхъ, копорые вообще называюпся произвольнымъ выздоровленіемъ; что практика неученыхъ людей, древнихъ Врачей и многихъ изъ новѣйшихъ доказываетъ справедливостъ сего; что они по опыту были, сами не вѣдая того, практическими Гомеопатиками.

Особенностъ вышеписанныхъ мнѣній обрапила на себя, по видимому, всеобщее вниманіе; одни поддерживали сія мнѣнія, а другіе осмѣивали оныя; и какъ никакіе проекшы не бываюптъ споль мало правдоподобны, что бы не могли склонитъ кого либо на свою сторону, то *Ганеманнъ* успѣлъ составитъ паршію, копорая публично приняла его мнѣнія. Слѣдствіемъ сего была продолжительная письменная война, копорая хотя еще и не окончилась, однакожь успѣла произвести волненіе между Германскими Врачами и

составивъ изъ нихъ двѣ большія секты: Гомеопатическую и пропивиу—Гомеопатическую.

Въ 1810-мъ году *Ганеманнъ* издалъ свой *Organon der Heilkunde*, содержащій систематическое извѣстiе о его мнѣнiяхъ *); въ 1818-мъ году появилось второе изданiе сего сочиненiя, которое въ Дрезденѣ переведено было на Французскiй языкъ *Брунновомъ* **); въ 1824-мъ году вышло третье изданiе. Кроме сихъ трехъ изданiй вышесказаннаго сочиненiя, онъ написалъ обширное сочиненiе, въ осьмую долю листа, составляющее шесть томовъ, подъ заглавiемъ: *Die reine Arzneimittellehre* ***). По мѣрѣ распространенiя ученiя сего признано было нужнымъ издаванiе журнала, съ тѣмъ, чтобы въ полной мѣрѣ упрочить и утвердить оное; поему *Ганеманнъ* началъ, подобно *Бруссе*, издавать свой

*) См. В. М. Ж. ч. IX.

**) *Organon de l'art de guérir; traduit de l'original Allemand du Dr. S. Hahnemann. 8^o. Dresden. 1824.*

***) Издано въ Дрезденѣ 1811-1821-го года. И сiе сочиненiе издано впрочемъ; послѣдняя часть онаго напечатана въ 1825-мъ году.

Архивъ *), кошорый выходитъ въ Лейпцигѣ, подѣ руководствомъ, какъ сказано, особливаго Общества Врачей. Уже напечатано пятъ томовъ сего сочиненія. Каспари и Гартлаубъ явились, какъ защитники сего ученія, а Ереѣ, Ведекинѣ, Лихтенштедтѣ, Гейнротѣ, Науманнѣ и Саксѣ были главными противниками онаго. Но это только немногіе изъ соспязующихся соперниковъ; безыменные сочиненія, въ видѣ капехизисовъ, фарсовъ и сатиръ, въ пользу и въ противность Гомеопатической паршіи, суть сподъ многочисленны, что одно уже вычисленіе оныхъ было бы затруднительно. Гейнротѣ, Профессоръ Медицины въ Лейпцигѣ, рѣшился опровергнуть основательнымъ образомъ ученіе сіе, издавъ сочиненіе подѣ заглавіемъ: *Antiorganon, oder das Irrige der Hahnemannischen Lehre in Organon der Heilkunst, dargestellt von D. J. C. A. Heinroth **)*, написанное съ большою скромностію, нежели какую соблюли многіе изъ его соповарищей и досланиоч-

*) Archiv für die Homöopathische Heilkunst. Изданіе сего журнала, начавшись съ 1822-го года, продолжается и нынѣ.

**) Издано въ Лейпцигѣ 1825-го года.

мо показавшее многія нелѣпости *Ганеманнова* ученія. Въ Журналѣ: *Litterarische Annalen der gesammten Heilkunde* *), издаваемомъ Берлинскимъ Профессоромъ *Геккеромъ*, найдется обстоятельная критика или разсмотрѣніе Гомеопатіи, сочиненное Г. *Лихтенштедтомъ*. Последнее, сколько извѣстно, монографическое возраженіе на *Ганеманново* ученіе сдѣлалъ *Саксъ*, Профессоръ Медицины въ Кенигсбергскомъ Университетѣ; онъ издалъ оное въ исходѣ 1826-го года, и подобно многимъ другимъ Авторамъ, полагая, что прошивъ основательности его доказательствъ не возможно сдѣлать никакихъ возраженій, думаетъ, что сочиненіе его **) нанесло смертельный ударъ Гомеопатіямъ. *Дрѣ Шенбергъ* въ Неаполѣ издалъ обширное описаніе сей системы ***), которое сдѣлалось весьма извѣстнымъ и привлекло къ себѣ многихъ

*) Сентябрь и Октябрь 1825-го года.

**) Подъ заглавіемъ: Versuch zu einem Schlussworte über Hahnemann's Homöopathisches System. Leipzig. 1826.

***) Il sistema medico del Doctor S. Hahnemann esposto alla Reale Academia delle scienze di Napoli, dal Dr. J. J. Schoenberg. Napoli. 1822.

Италіанскихъ Врачей, особенно въ Неаполѣ и окрестностяхъ его. Въ Вѣнѣ и Прагѣ ученіе сіе совершенно вошло въ моду. И шакъ изъ сего краткаго извѣстія о Гомеопатіи весьма явствуетъ, что она, какова бы ни была ея заслуга, возбудила значительное прѣніе между Врачами во всей Германіи и многимъ изъ нихъ показалась достойною того, чтобы они присоединились къ числу ея защитниковъ. *Гуфеландъ*, Спаршій Профессоръ Медицины въ Берлинскомъ Университетѣ, покровительствовалъ оприцательнымъ образомъ сему ученію, принимая въ свой журналъ примѣры больныхъ, лѣчимыхъ Гомеопатиками, и онъ полагаетъ, что ученіе сіе произвело благотворное вліяніе на практику его соотечественниковъ, потому что оно ведетъ къ бѣльшей точности въ употребленіи лѣкарствъ и къ строжайшему соблюденію діетъ. Онъ описывается наилучшимъ образомъ о характерѣ *Ганеманна*, какъ Врача и почитаетъ его однимъ изъ отличнѣйшихъ, остроумнѣйшихъ и оригинальныхъ Врачей нашего времени. Однакожъ долгъ справедливости обязываетъ меня сказать, гово-

рипъ Г. *Прейсъ* *), что я получилъ совершенно другія вѣсти ошъ многихъ достопо-
чтенныхъ пракшниковъ и мнѣ извѣсны нѣ-
копорыя обспояпельспва, въ копорыхъ до-
вольно много учаспвовали шарлатанспво
и обманъ. За нѣсколько лѣпъ предъ симъ *Га-
неманнъ* пригопвлялъ свои собспвенныя лѣ-
карспва, для того, чтообы они оспавались
неизвѣспными, и былъ изгнанъ изъ Лейпцига
за присвоеніе себѣ Апшекарскихъ правъ и
всегдашнее содержаніе впайнѣ лѣкарспвъ сво-
ихъ. Нынѣ проживаетъ онъ въ Ангальтъ—Ке-
пенскомъ Княжеспвѣ, на границѣ между Сак-
соніею и Магдебургомъ; тамъ онъ имѣетъ
обширную пракшику и нерѣдко подаетъ со-
вѣпы особамъ, пріѣзжающимъ для сего изъ
ошдаленныхъ мѣспъ.

Достопримѣчательно присемъ то, что
первые примѣры, избранные *Ганеманномъ*,
для подпвержденія успѣха Гомеопатическаго
лѣченія, заимспвованы изъ памяспниковъ Вра-
чебной Испоріи въ Англіи. Онъ спарается
показать, что и самъ *Гиппократъ* былъ Гомео-

*) Edinburgh Med. and Surg. Journal. 1828.

папическій Врачъ *). „Доселѣ, говоритъ *Ганеманнъ*, обыкновенно лѣчили болѣзни жалкимъ образомъ, по одному только фантасмическому способу и между прочимъ наблюдали одно только палліативное правило: *contra grāia contrariis*; но истинный и естественный способъ лѣченія есть нижеслѣдующій, заключающійся въ сихъ словахъ: „во всякомъ случаѣ для излѣченія болѣзни легкимъ, скорымъ, вѣрнымъ и постояннымъ образомъ избирай лѣкарство, способное къ произведенію спраданія, подобнаго тому, которое нужно удалить.“

*) Для сего ссылается онъ въ своемъ *Organon* на небольшое сочиненіе *περί Εόλου Εού Κας' αυδρωτου* и приводитъ именно 72-ю страницу сего сочиненія, разумѣя Базельское изданіе; но какъ ссылка сія невѣрна, то и доказательство, основанное на ней, теряетъ свою важность; припомъ съ другой стороны весьма извѣстно то, что отецъ врачевства былъ противникомъ сего ученія и во второмъ отдѣленіи 22-го своего афоризма выражается такъ: болѣзни, происшедшія отъ полнокровія, лѣчатся испражнительными, равно какъ и болѣзни, причиненныя испражнениями, пребываютъ пополняющихъ средствъ, и такъ бываетъ во всѣхъ случаяхъ, всегда потребно противное.

Далѣе доказываетъ онъ, что исторіи болѣзней, пропивъ которыхъ лѣкарства употреблены были въ простомъ видѣ, такъ что можно было судить о дѣйствіи ихъ, подтверждающъ оное мнѣніе; что во всѣхъ сихъ случаяхъ можно замѣтить, что болѣзнь удалена лѣкарствомъ, произведшимъ одинаковое, а не противоположное спраданіе, какъ по врачующій предполагалъ. Попова Англійская лихорадка (*febris sudatoria Anglicana, Sudor Anglicanus*), которая, по замѣчанію *Виллиса*, оказалась столь же опустошительною, какъ и чума, и не прежде уменьшилась, какъ послѣ употребленія сильныхъ потогонныхъ средствъ, приводится *Ганеманномъ* для примѣра. Онъ ссылается на лѣченіе опмороженныхъ частей чрезъ преніе ихъ снѣгомъ и на лѣченіе обожженныхъ частей чрезъ приближеніе ихъ къ огню, и опирается на *Джона Гунтера*, подтверждающаго пользу сего лѣченія. Лѣченіе людей, обожженныхъ въ угольныхъ ямахъ, употребляемое *Д. Эдвардомъ*, *Кентишемъ* и состоящее въ преніи ихъ горячимъ скипидарнымъ масломъ, представляется здѣсь также въ доказательство. Случай, рассказываемый *Г-мъ Джономъ Беллемъ*, каса-

тельно одной благородной женщины, которая обожгла себѣ обѣ руки и погрузила одну руку въ холодную воду, а другую напирала скипидарнымъ масломъ, выспавляеиъсѣ здѣсь какъ убѣдительно доказательство великаго превосходства Гомеопатической практики. Вычисливъ многіе подобные примѣры, приводимые *Гейстеролъ*, *Сиденгамолъ* и другими, онъ въ воспоргѣ спрашиваетъ: кто не захочетъ признать рѣшительнаго преимущества, которое должно отдавать Гомеопатическому способу лѣченія? Кто не видитъ, соображая сіе, жалкаго несовершенства стараго способа или системы, слѣдующей правилу: *contraria contrariis*? Однакожъ нѣкоторые изъ обстоятельствъ, приводимыхъ имъ, придають мнѣніямъ его видъ какъ бы правдоподобія; таковы суть: удаленіе или предопвращеніе естественной оспы чрезъ коровью оспу и лѣченіе любостраспной болѣзни посредствомъ рпупи. Повсемспвенные припадки, производимые обоими сими средствами, подходятъ къ естественнымъ припадкамъ сказанныхъ болѣзней столь много, что опытнѣйшіе Врачи съ шрудомъ различають оныя.

Утвердивъ, какъ полагаешь, первую свою аксіому, онъ приступаетъ ко второй, которую выражаетъ въ слѣдующихъ словахъ: „болѣзнь существуетъ для Врача, такъ сказать, въ совокупности только ея припадковъ и для излѣченія болѣзни нужно только удалить сію совокупность припадковъ; но сіе можно произвести только помощію лѣкарствъ, могущихъ возбудить подобные естественнымъ и въ нѣкоторой степени сильнѣйшіе припадки. Таковое познаніе силъ различныхъ веществъ можетъ быть приобрѣтено только чрезъ опыты надъ здоровыми людьми.“

Потомъ старается онъ показать шопъ процессъ nature, по которому она можетъ лѣчить болѣзни чрезъ одну только замѣну первоначально существующихъ болѣзней другими, имѣющими сходственные съ первыми припадки. По мнѣнію *Ганеманна*, при сущъ способа лѣченія болѣзней: 1) Аллопатическій, или способъ перемѣщенія болѣзни изъ одной части тѣла въ другую; 2) Гомеопатическій, по его мнѣнію, самый дѣйствительный; 3) Антипатическій или палліативный способъ или система, считающая за правило *contraria contrariis*; сей способъ есть самый худшій.

Антипатическій способъ почищаетъ онъ самымъ худшимъ потому, что одинъ какой либо припадокъ уничтожается лѣкарствомъ, производящимъ противоположный припадокъ, между тѣмъ какъ всѣ прочіе припадки оставляются безъ вниманія; „слѣдствіемъ сего, говоритъ *Ганеманъ*, есть то, что хотя больной чувствуетъ сперва нѣкоторое облегченіе, однакожь за симъ всегда наступаютъ худшее состояніе, и все сіе зависитъ большею частію отъ чрезмѣрнаго приема лѣкарствъ, употребляемыхъ при палліативномъ лѣченіи болѣзней. Таковыя чрезмѣрные приемы лѣкарствъ производятъ, чего никто не зналъ доселѣ, значительное вторичное дѣйствіе на органическій составъ,—непріязненное производѣніе.“ Онъ принимаетъ, какъ главное правило, что всѣ лѣкарства производятъ два совершенно отдѣльныя дѣйствія, первоначальное (*Erstwirkung*) и вторичное (*Nachwirkung*). Для поясненія сихъ двухъ отдѣльных дѣйствій одного и того же лѣкарства онъ приводитъ между прочимъ слѣдующій примѣръ: рука, погруженная въ горячую воду, сперва бываетъ теплѣе, но будучи вынута и обсушена, она скоро дѣлается холоднѣе,

нежели другая рука. Послѣ значительнаго пѣлеснаго упражненія человекъ чувствуетъ въ себѣ примѣтный жаръ (Erstwirkung), но чрезъ нѣкоторое время наступаетъ холодъ и дрожь (Nachwirkung). Онъ полагаетъ, что въпоричное дѣйствіе лѣкарствъ всегда бываетъ вредно и что сіе зависитъ отъ большихъ приемовъ, обыкновенно предписываемыхъ. Для отвращенія сего въпоричнаго дѣйствія онъ предписываетъ лѣкарства свои въ чрезмѣрно малыхъ приемахъ, чрезъ что, говоритъ онъ, непосредственное или первоначальное дѣйствіе лѣкарства успѣваетъ привести больного обратно въ здоровое состояніе прежде появленія въпоричнаго дѣйствія. Въ семь-то состоишь Гомеопатическій способъ лѣченія, чрезъ который, помощію приличныхъ умѣренныхъ приемовъ, производятся припадки, весьма подобные припадкамъ естественной болѣзни; однимъ только симъ способомъ, говоритъ *Ганеманнъ*, болѣзнь излѣчивается совершенно и постоянно.

Поелику причины, производящія болѣзнь, суть почти безчисленны, а измѣненія въ состояніи пѣла, спржаждающаго болѣзнь, также весьма многоразличны: то прудъ, пред-

лежацій Гомеопатикамъ, долженъ быть весьма значительнъ; поему *Ганеманнъ* принимаетъ за основаніе, что каждое лѣкарство имѣетъ свое особенное дѣйствіе и что едва ли бываетъ два такихъ случая, въ которыхъ бы одно и то же лѣкарство могло быть употреблено съ пользою. О дѣйствіи Гомеопатическихъ лѣкарствъ находимъ мы слѣдующее извѣстіе въ 155-мъ отдѣленіи *Ганеманнова* сочиненія: Organon etc. „лѣкарство, выбранное сообразно съ вышепредложенными правилами и данное въ приличныхъ приемахъ, оказываетъ на спраждущую часть организма особенное свое вліяніе, или производитъ въ сей части искусственную, но нѣсколько сильнѣйшую болѣзнь, которая, по великому своему сходству съ прежнею болѣзнію и по превозмогательному вліянію на оную, поступаетъ на ея мѣсто и съ тѣхъ поръ организмъ спраждаетъ одною только искусственною болѣзнію. Сія же послѣдняя болѣзнь, *по притинѣ малыхъ приѣмовъ лѣкарствъ*, оканчивается сама собою и больного совершенно освобождаетъ; это значить, что больной вылѣченъ надежно.“

Вещества, избираемая для лѣкарствъ, должны быть употребляемы въ естественномъ

и неизмѣненномъ состояніи ихъ и Ганеманнъ утверждаетъ, что наилучшій способъ сберечь дѣятельное начало растѣній состоятъ въ смѣшеніи выжатого сока ихъ съ равнымъ количествомъ чистаго спирта. Если растѣніе должно быть приведено въ порошокъ, то опредѣленные для сего вещества нужно весьма тщательнаго высушить въ темномъ мѣстѣ; а когда растѣніе приведено уже въ порошокъ, то сушеніе онаго надлежитъ производить иначе, и лучшимъ для сего средствомъ почитается теплое водяной бани. Сушеніе должно продолжаться до того, чтобы частички порошка, взявъ въ руку, рассыпались подобно мелчайшему песку; порошки сіи надлежитъ сберегать въ крѣпко закупоренныхъ стекляныхъ банкахъ и тщательно удалять оныя отъ непосредственнаго дѣйствія солнечныхъ лучей; всего лучше сберегать оныя въ темномъ мѣстѣ. Въ каждомъ случаѣ должно предписывать не болѣе, какъ только одно лѣкарство, и то въ простѣйшемъ видѣ.

Для успѣшнаго лѣченія не только нужно то, чтобы лѣкарство надлежащимъ образомъ было выбрано и пригопвлено, но также надлежитъ стараться и о томъ, чтобы оное предписыва-

мо было въ весьма малыхъ количествахъ. Большой пріемъ лѣкарства, вмѣсто уменьшенія болѣзни, несомнѣнно увеличилъ оную. Въ предисловіи къ своему сочиненію: *Reine Arzneimittellehre*, Ганеманнъ представилъ слѣдствія, выведенныя имъ изъ разнообразныхъ опытовъ, учиненныхъ надъ самимъ собою и сдѣлалъ слѣдующее заключеніе: дѣйствія лѣкарствъ не уменьшаются въ Ариѳметической прогрессіи съ уменьшеніемъ пріема ихъ. Восемь капель какой либо пинкпуры не дѣйствуютъ въ чепыре раза сильнѣе, нежели двѣ капли, и шакъ далѣе.

Чрезмѣрная малость пріемовъ, назначаемыхъ имъ, кажется, совершенно препяпспвуетъ тому, чпобы они могли произвестъ какое либо дѣйствіе; но онъ рѣшительно признаетъ оныя доспаппочными. Онъ обращаетъ особенное вниманіе на діету, и какъ болѣзни, въ коихъ онъ подаетъ совѣтъ, суть болѣею частію хроническія; по вѣрояпну, чпо успѣшнымъ лѣченіемъ въ пакихъ случаяхъ онъ обязанъ сему обстоятельству. Онъ утверждаетъ, что не имѣетъ особенной пріверженности къ однимъ какимъ либо лѣкарствомъ; однакожъ сочиненія его весьма яв-

*

сшвенно показывають, что онъ имѣетъ нѣ-
 копорые любимые препараши. *Atropa bella-*
dona, *Cannabis sativa*, *semina Menispermī coc-*
culi, *Nux vomica*, *Datura stramonium*, *Arnica*
montana, *Pulsatilla*, *Aconitum*, *Opium et Hyos-*
ciamus, супъ, по видимому, пѣ вещества,
 копорыя онъ наичаще употребляетъ. Осо-
 бенную точность, съ каковою онъ наблюда-
 етъ дѣйствія лѣкарствъ, можно усмотрѣть
 изъ того, что вычисленіе припадковъ, проис-
 ходящихъ отъ употребленія *pusis vomit-*
is, занимаетъ 50 страницъ перваго тома его
 сочиненія: *Arzneimittellehre*, а припадки, опиemy
 возбуждаемые, наполняютъ 53 страницы.

Согласно съ его наблюденіями,

Ромашковые цвѣты производятъ 1481 при-
 падокъ.

Бузинные цвѣты ————— 116 при-
 падковъ.

Цвѣты медвѣжьяго ушка (*flores Verbasci*)
 производятъ 175 припадковъ.

Желѣзо производитъ 228 припадковъ.

Хина ————— 691 припадокъ.

Планина ————— 402 припада.

Онъ, какъ замѣчаетъ, открылъ уже сіе
 число припадковъ, свойственныхъ каждому изъ

упомянутыхъ веществъ; но, вѣроятно, многіе еще остаются въ неизвѣстности. Онъ упоминаетъ о 69-ти разныхъ лѣкарствахъ, испытанныхъ имъ надъ самимъ собою.

Во вѣдомѣ помѣ своего сочиненія: *Reine Arzneimittellehre*, Ганеманнъ опредѣляетъ приемы различныхъ лѣкарствъ; но мы для краткости упомянемъ только о нѣкопорохъ. Разсуждая о приемахъ мышьяка, онъ говоритъ, что $\frac{1}{1000}$ части грана есть самый болѣе сильный приемъ, какой только можно предписать; что въ обыкновенныхъ случаяхъ достаточно бываетъ $\frac{1}{100,000}$ но что иногда миллионная и даже четырехмиллионная часть грана есть уже весьма сильный приемъ. Касательно растворовъ желѣза въ соляной, уксусной и сѣрной кислотахъ онъ говоритъ, что количество, проспирающееся отъ $\frac{1}{1000}$ до $\frac{1}{10000}$ части грана можно почесть равномернымъ приемомъ; но что иногда $\frac{1}{30000}$ части грана есть уже сильный приемъ. Касательно настойки *Fabae S-ti Ignatii*, для приема полагается около $\frac{1}{3000000}$ части грана сѣмянъ сихъ; но онъ, какъ замѣчаетъ, видѣлъ весьма хорошее дѣйствіе послѣ употребленія $\frac{1}{4000000}$ части грана того же количества. Капля

спиртной настойки сарсапарилли есть, по его словамъ, сильный пріемъ. Одинъ гранъ *Cuscuta colosynthidis*, растворенный въ сошнѣ каплей виннаго спирта, составляетъ форму употребленія, которую онъ особенно одобряетъ, увѣряя, что $\frac{1}{7000000}$ и даже $\frac{1}{8000000}$ часть капли сего раствора дѣйствуетъ иногда слишкомъ сильно.

Сколь ни смѣшными кажутся съ перваго взгляду шаковыя замѣчанія, однакожь оныя, кажется, по нѣкоторымъ обстоятельствомъ приближающіяся какъ бы къ возможности. Извѣстны весьма достоверныя примѣры, въ которыхъ обморокъ произведенъ былъ запахомъ розовой воды и гдѣ особы, вошедшія въ комнату, въ которой содержалось малое количество мускуса, весьма-скоро получали пошноту. Одинъ гранъ сего послѣдняго вещества сообщаетъ явный запахъ свой атмосфере обширной комнаты, не теряя нисколько своего вѣсу. Однакожь излишнимъ будетъ показывать, какъ шаковыя мнѣнія дѣйствуютъ на практикѣ, и если судить по благопріятнымъ случаямъ, на которые ссылается самъ Ганеманнъ, то заключеніе не можетъ быть удовлетворительное.

Нижеслѣдующіе примѣры выбраны изъ собственныхъ сочиненій *Ганеманна* (*Reine Arzneimittellehre 2-er Theil s. 28*) и лѣченіе въ оныхъ производилъ самъ *Ганеманнъ*.

Примѣръ 1. Больная была прачка, крѣпкаго сложенія, около 40 лѣтъ; она явилась къ сему Доктору, спустя при недѣли съ лѣтъ поръ, какъ не могла заниматься работою. Случай сей описываетъ онъ слѣдующимъ образомъ:

Припадокъ I. При каждомъ движеніи ощущается острая, съ біеніемъ сопряженная боль подъ ложечкою, особливо когда больная спавишь ногу на полъ; какъ скоро сдѣлаетъ она неправильный шагъ, то боль обнаруживается въ лѣвой сторонѣ.

II. Въ лежачемъ положеніи больная совершенно спокойна; нигдѣ и никакая боль не оказывалась.

III. Больная не могла спать послѣ прехъ часовъ утра.

IV. Послѣ принятія пищи являлась тошнота.

V. Послѣ принятія пищи накоплялась мокрота во рту, какъ будто при глоспяхъ.

VI. По принятіи пищи появлялась опрыжка, но безъ запаха.

VII. Больная была холерическаго темперамента и во время боли выступалъ потъ. Всѣ прочія опшравленія совершались весьма правильно.

(Примѣтанія Ганеманна).

„И такъ касательно припадка No I. *Bel-ladona*, *Cinchona* и *Rhus toxicodendron* производятъ боль въ предсердіи. *Bryonia alba* производитъ тоже и кромѣ того причиняетъ колючую боль подъ грудиною, при поднятіи плеча. Относительно оприцашельнаго припадка No II имѣются, кромѣ бріоніи, и другія лѣкарства, могущія успокоить боль при лежачемъ положеніи больного, но ниодно изъ нихъ не производить сего споль вѣрно, особливо въ соединеніи съ другими припадками, какъ бріонія. Касательно No III, припадокъ сей производятъ многія лѣкарства, также какъ и бріонія. No IV. Что касается до тошноты послѣ принятія пищи, нѣкоторые лѣкарства производятъ сіе дѣйствіе, преимущественно же бріонія. No V. Нѣкоторые лѣкарства производятъ обильное опі-

дѣленіе мокроты во рту; шоже производить и бріонія; но другія лѣкарства не возбуждаютъ прочихъ припадковъ, замѣченныхъ въ семь случаѣ. Посему бріонію должно предпочесть. Опрыжку послѣ принятія пищи причиняють немногія лѣкарства, но бріонія причиняетъ сіе, слѣдственно и въ семь опношеніи заслуживаетъ она предпочтеніе. На соспояніе духа или шемпераментъ также должно смотрѣть, и бріонія производить такую перемѣну въ расположеніи духа, какъ означено подъ No VII. И такъ изъ всѣхъ лѣкарствъ бріонія наиболѣе приличествуетъ сему случаю, если мы желаемъ совершить Гомеопатическое или поспоянное лѣченіе. Въ заключеніе *Ганеманнъ* замѣчаетъ, что какъ женщина сія была крѣпкаго сложенія и какъ болѣзнь ея была споль значительна, что удержала ее отъ всякаго занятія, шо онъ рѣшился дать ей одинъ изъ сильнѣйшихъ Гомеопатическихъ пріемовъ, шо есть, цѣлую каплю выжатого сока корня *Bryoniae albae*.

Примѣръ 2. Счетчикъ, 42-хъ лѣтъ, слабого сложенія, явился къ *Ганеманну* чрезъ пять дней послѣ появленія болѣзни своей. Припадки означены въ слѣдующемъ порядкѣ:

I. Вечеромъ сдѣлались у него, безъ всякой явственней причины, головокруженіе, пошнота и опрыжка.

II. На слѣдующее утро въ два часа легкая рвоша.

III. Въ слѣдующую ночь была опрыжка.

IV. Каждая опрыжка была воиющая и кислая.

V. Ему казалось, что пища оставалась непереваренною въ его желудкѣ.

VI. Ему казалось, что голова его пуста и по временамъ былъ онъ болѣе разсѣянъ, однакожь всегда помнилъ себя.

VII. Малѣйшій шумъ беспокоилъ его.

VIII. Духъ его былъ спокоенъ.

(Примѣтанія Ганеманна).

„Изъ сихъ обспоятельствъ мы заключаемъ: 1-е. что нѣкоторыя лѣкарства производятъ головокруженіе съ пошнотою, особливо же Pulsatilla, которая производитъ головокруженіе вечеромъ, чего никто другой не замѣпилъ. Касательно No II, изверженіе чрезъ рвошу слизистой влаги съ худымъ запахомъ производятъ Datura Stramonium и Nux vomica, но сколько доселѣ извѣстно, не

въ ночное время. *Valeriana* и *Menispermum* *sossulus* возбуждаютъ рвошу ночью, но не кислую рвошу. Желѣзо производитъ рвошу ночью, и даже кислую рвошу, но не причиняетъ другихъ припадковъ, которые должно принять въ разсужденіе. *Pulsatilla* производитъ не только вечеромъ кислую рвошу и ночную рвошу, но также и всѣ другіе припадки, означенные въ семь случаевъ, чего желѣзо не дѣлаетъ. Относительно припадка III, ночная опрыжка является послѣ принятія *Pulsatillæ*. No IV. Вонючая, гнилая и кислая опрыжка бываетъ послѣ принятія *Pulsatillæ*. No V. Чувство неваренія желудка никакимъ другимъ лѣкарствомъ не бываетъ производимо такъ вѣрно, какъ помощію *Pulsatillæ*. No VI. Съмена *Fabae Sti Ignatii* производятъ сей припадокъ, но не причиняютъ другихъ припадковъ, означенныхъ въ семь случаевъ, какъ то дѣлаетъ *Pulsatilla*. No VII. *Pulsatilla* производитъ также и сей припадокъ, и кромѣ того дѣйствуетъ очевидно на всѣ органы чувствъ, преимущественно же на чувство зрѣнія. Что касается до No VIII, *Pulsatilla* производитъ также спокойствіе

духа. И такъ по всѣмъ симъ причинамъ она заслуживаетъ преимущество.“

По причинѣ слабости сего больного и по особенному появленію болѣзни его шребовался весьма малый только пріемъ, то есть, половина только капли $\frac{1}{4000000}$ часпи большой капли сока Pulsatillæ; только $\frac{1}{8000000}$ часпъ капли сока Pulsatillæ принята была больнымъ около вечера. На слѣдующій день, говоритъ Ганеманнъ, больной былъ свободенъ отъ всѣхъ припадковъ; пищевареніе его совершенно исправилось и въ исходѣ недѣли Ганеманнъ получилъ извѣстіе, что больной продолжаетъ пользоваться добрымъ здоровьемъ.

Довольно необычайно присемъ то, что Ганеманнъ приводитъ сіи только два примѣра Гомеопатическаго лѣченія, между шѣмъ какъ сочиненія учениковъ его чрезмѣрно наполнены таковыми примѣрами. Но и сіи два примѣра доспапочно показываютъ, что Гомеопатія не можетъ выдержатъ пробы опыта, и сколь оспроумною ни казалась бы теорія сей системы, однакожъ приспособленіе ея къ практикѣ является споль смѣшнымъ, что она никогда не получитъ прочнаго основанія.

Самый даже поверхностный взгляд на вышеизложенное *Ганеманново* учение доспапочень для подшверженія сей истины. Такъ припадочное лѣчение (*cura symptomatica*),—сей ненадежный способъ, употребляемый не иначе и не прежде, какъ когда причина болѣзни совершенно неизвѣстна, *Ганеманнъ* почищаетъ за *самое существенное* и разсмаприваетъ оное, какъ единственное основаніе всей Врачебной Науки. При насоящемъ состояніи Медицины не нужно доказывать, что лѣчение по причинамъ неоспоримо есть и всегда останется вѣрнѣйшимъ и основательнѣйшимъ способомъ врачеванія. Припомъ извѣстно, что лѣчение по припадкамъ не есть что либо новое; оно уже и древними употреблялось въ сказанныхъ случаяхъ; по сему здѣсь одно только можно назвать новостію то, что *Ганеманнъ* припадочное лѣчение предпочитаетъ всякому другому, не имѣя на то никакихъ доказательствъ: ибо предотвращеніе естественной оспы помощію коровьей и произведеніе помощію ртутни припадковъ, подобныхъ венерическимъ, суть недоспапочные доводы; они ничего не доказываютъ тамъ, гдѣ должно показатъ, что

всѣ вообще болѣзни излѣчиваются чрезъ искусственное произведеніе имъ подобныхъ. Никакой еще *Ганеманнизмъ* не произвелъ, помощію сѣры, чесотки, лишая и ш. д.

Если далѣе, по словамъ *Ганеманна*, искусственная болѣзнь, произведенная Гомеопатическимъ лѣченіемъ, поспешенно прекращается сама собою, *именно по приклинъ малыхъ приѣмовъ лѣкарствъ*: то не значить ли сіе, что малые приемы лѣкарствъ не имѣютъ вообще никакого дѣйствія и не подтверждаются ли сія истина Гомеопатическимъ опредѣленіемъ лѣкарствъ, гдѣ веществва, весьма разнообразныя по дѣйствию своему, помѣщаются въ одинъ и тотъ же классъ,—гдѣ мышьякъ и ромашка, чилибуха и молочный сахаръ,—словомъ, гдѣ ядовитое и питательное веществво стоитъ въ одномъ и томъ же ряду? Неоспоримо, опыты научаютъ насъ, что нѣкоторыя веществва и въ самомъ маломъ количествѣ могутъ оказывать дѣйствіе; но сего никакъ не лзя примѣнить къ Гомеопатическимъ лѣкарствамъ, потому что билліонная или триллионная часть капли лѣкарства едва ли даже попадетъ въ щепотное горло, а шѣмъ менѣе въ желудокъ, и

еще менѣе въ кровь. Гдѣ нѣтъ ничего, тамъ не можетъ быть никакого дѣйствія; гдѣ нѣтъ причинъ, тамъ не бываетъ слѣдствій. И такъ очевидно подъ именемъ Гомеопатіи во всѣхъ сихъ случаяхъ должно разумѣть не иное что, какъ цѣлительную силу природы; а попому лѣчение такое есть, по всей справедливости, *выжидательное*, благопворное, безъ сомнѣнія, во многихъ случаяхъ, встрѣчающихся преимущественно Военнымъ Врачамъ. Такъ нерѣдко рекрупы и солдаты, изнуренные походами, претерпѣвшіе значительный недосыпашокъ въ жизненныхъ потребностяхъ, поспуливъ въ госпиталь съ важною, по видимому, болѣзнію, излѣчивающся скоро и вѣрно чрезъ одно только спокойствіе, лучшую пищу, чрезъ пребываніе въ здоровомъ воздухѣ. И въ семъ-то смыслѣ Гомеопатическое, или, лучше сказать, выжидательное лѣчение достойно уваженія, въ которомъ однакожъ помчасъ откажетъ ему истинный Врачъ, какъ скоро увидитъ, что миллионная часть капли лѣкарства почиается причиною выздоровленія тамъ, гдѣ одно опдохновеніе, хорошая пища и свѣжій воздухъ досыпашочны были для поправленія здо-

ровья,—какъ скоро онъ удостовѣряется, что Гомеопатики въ крипическихъ случаяхъ прибѣгають, болѣе, нежели смѣло и даже *не краснѣя*, къ сильнѣйшимъ приемамъ героическихъ лѣкарствъ, и покрывая шаковые поступки благовидною личиною своей системы, причиняють несомнѣнный вредъ обществу.

II.

ПРИМѢЧАТЕЛЬНЫЯ ВОЛѢЗНИ КО- СТЕЙ.

1. *Переломъ и въ слѣдствіе онаго помертвѣ-
ніе (necrosis) ключицы.*
-

Одна 11-ти лѣтъ дѣвушка хопѣла сой-
ти съ бочки, копорая вмѣстѣ съ нею опро-
кинулась и упала ей на правое плечо. Дѣвоч-
ка вспала, ни на что не жалуясь и до
третьяго дня не было примѣшно никакого
наружнаго поврежденія, а на третій день
она не могла дѣйствовать правою рукою. При
изслѣдованіи найдена значительная опухоль
около ключицы сей стороны; приложены смяг-
чающія припарки и дѣвочка опять принялась
за свои игрушки, какъ будто съ нею ничего
не случилось. Спустия около семи недѣль опу-
холь вскрылась, вышло много гноя и мало
помалу образовалось множество опиверспій

во всю длину ключицы. Въ сіи оптверстія по временамъ были дѣланы раздражающія впрыскиванія. Спустия семь мѣсяцовъ, когда Докпоръ Gilgencrautz увидѣлъ сію дѣвочку, она дѣйствововала обѣими руками также свободно, какъ и до ушиба; она имѣла болѣе крѣпоспи и ловкоспи въ правой рукѣ, нежели въ лѣвой; шея была немного наклонена на правую сторону; поврежденное плечо почти на дюймъ было подвинуто внизъ и внутрь, нижній уголь лопапки споялъ кверху, а processus coracoideus внизъ и соспавлялъ кпереди небольшое возвышеніе. Вдоль ключицы находилось семь оптверстій, чрезъ копорыя помощію зонда можно было чувствовованъ твердое, удобоподвижное шѣло, которое было принято за длинный опломокъ сей кости. Gilgencrautz хотѣлъ было его извлечь, но другіе на то не согласились. Язва, чрезъ копорую дѣлали изслѣдованіе зондомъ, непримѣнно увеличилась, и 20-го Марша можно было извлечь оное твердое шѣло, которое соспавляло всю переднюю часть ключицы, длиною въ $3\frac{1}{2}$ дюйма. При разсмапрованіи сей кости оказалось, что она была опдѣлена опъ задней части неровнымъ пе-

реломомъ. По извлеченіи можно было примѣ-
нить, какъ вмѣсто старой кости и по на-
правленію ключицы образовалась новая, при-
спавшая къ задней часпи и соединившаяся
съ грудиною. Къ ней прикрѣпился m. sterno-
mastoides, который однако былъ слабѣе,
нежели на лѣвой сторонѣ. Движеніе руки,
попчась по вынутой ключицы, не было ни-
мало воспещено, и больная могла сама завя-
зывать свой чепчикъ сзади. Двѣ недѣли послѣ
извлеченія ключицы язвы закрылись и кожа
начала наростать.

Frogier's Notizen. XVIII. Bd. стр. 47.

2. Изсѣженіе ключицы, extirpatio claviculæ.

Нью-Йоркскій Профессоръ *Mott* предпри-
нялъ сію опасную операцію съ счастливымъ
успѣхомъ при костномъ наростѣ (osteosar-
coma). Болѣзнь появилась сперва въ Февраль
1829, а въ Іюнь опухоль была уже величи-
ною въ кулакъ и изъ воспослѣдовавшей на верх-
ней ея поверхности язвы часто случалось
кровотеченіе. Хотя больной впрочемъ былъ
здоровъ, однако чрезвычайное раздраженіе,
опухолью причиняемое и частое кровоте-
ченіе скоро прекратили бы его жизнь.

Судя по величинѣ опухоли и по важности объявляхъ ея часпей надлежало опасаться худаго исхода операціи, и потому больному и его родственникамъ было объявлено, что кромѣ жестокой боли при сей операціи, вѣроятно, трудно будетъ опыскать большую подключичную вену, окруженную губчатнымъ костнымъ наростомъ, необходимо попомъ анатомически отдѣлять часпи на большое пространство, причемъ потребна величайшая осторожность, чтобы не повредить груднаго протока, и можетъ воспослѣдовать большая потеря крови. Но больной рѣшился подвергнуться операціи и желалъ, чтобы оная поспѣла была предпринята.

Докторъ *Мотт* сперва сдѣлалъ разрѣзъ, начинавшійся противъ передняго конца четвертаго ребра, простиравшійся полукружно вверхъ къ шишобообразному хрящу и оканчивавшійся дюйма на два ниже сего хряща. Попомъ къ концу сего разрѣза провелъ другой, начинавшійся отъ *acromion. Vena jugularis externa* была перевязана и перерѣзана. Послѣ сего раздѣлено соединеніе ключицы съ грудиною, препарованіе продолжаемо было снаружи, пока отдѣле-

но *ligamentum rhomboideum*. Нижний конец *m. sterno-cleido-mastoidei* оспорожно опдѣленъ и вся опухоль обнаружена. Опъ раздраженія, которе причиняла губчатая кровянистая масса, всѣ сосуды окололежащихъ частей были значительно расширены, почему множесиво изъ нихъ нужно было перевязать. При каждомъ разрѣзѣ, касавшемся опухоли, выступало много крови, и пѣмъ затруднялось продолженіе операціи, а между пѣмъ попребна была величайшая оспорожность, чтобъ не повредить большихъ кровеносныхъ сосудовъ, лежащихъ подъ ключицею. Больной съ величайшимъ терпѣніемъ перенесъ операцію, продолжавшуюся по вышесказаннымъ обстоятельсвамъ почти четыре часа. Разумѣется, что труднѣе всего было для Оператора опдѣлить опухоль опъ подключичной вены и грудного протока: поелику онъ съ разрѣзами долженъ былъ ожидать, пока вена наполнится при выдыханіи. Часть вены была окружена губчатымъ веществомъ, и по окончаніи операціи, состоявшемъ въ перепилении (*dividing*) задняго конца ключицы противъ конической связки (*lig. conoideum*), была обнажена на нѣсколько

дюймовъ. Въ продолженіи операціи перевязано около тридцати сосудовъ.

Какъ часпъ покрововъ надъ опухолью бы-
ла разспроена чрезъ язву, цю всей раны
не лзя было закрыть кожею, и цопому ша-
ковое мѣсто было покрыто корпіею.

На щеспой день появилось начало плото-
творенія; больной видимо поправлялся.

Тринадцать дней спустя послѣ операціи,
Докшоръ *Mott* сказывалъ, цто онъ на-
дѣется благополучнаго исхода сей трудной
операціи. Онъ признается, цто изъ всѣхъ
операцій, какія онъ дѣлалъ, эта была самая
трудная и, по видимому, самая опасная; онъ
даже сомнѣвался въ возможности опдѣлить
болѣзненно-разспроенную ключицу опъ ле-
жащихъ подъ нею большихъ сосудовъ, и успѣлъ
въ томъ только чрезъ величайшую оспо-
рожность и терпѣніе.

Frozier's Notizen. XXIII. Bd. стр. 8.

3. *Водянки въ 6. берцовой кости, при
коихъ передняя часть сей кости отнята.*

Женщина 35-ти лѣтъ, здороваго плѣдсло-
женія, прогуливаясь 21-го Сентября, скоро
поворочилась и переломила себѣ лѣвую ногу.

Вскорѣ призванный Врачъ вправиль переломъ обыкновеннымъ способомъ, приложилъ шины и для разогнанія опухоли велѣлъ безпрестанно примачивать свинцовою водою.

При изслѣдованіи причины сего перелома оказалось, что женщина сія за шесть лѣтъ была ранена въ ногу косою, коея конецъ проникъ въ кость, но рана скоро зажила. Вскорѣ послѣ того на раненномъ мѣстѣ появилась опухоль, копорая постепенно выросла до величины куриного яйца. Она сильно болѣла и, какъ можно полагать, ослабила ногу не задолго передъ переломомъ.

По разогнаніи оспраго воспаления хроническая опухоль была мягкая, содержавшееся въ ней ошъ прижатіи входило въ полость кости, но по прекращеніи давленія опухоль опять достигала прежней своей величины. Концы перелома были угловаты и показывали значительное болѣзненное состояніе. Членъ опять положенъ въ шины и оставался въ оныхъ при мѣсяцъ, но желеченіи коихъ переломъ нимаю не сросся. Теперь больная соглашалась на операцію, копорую ей прежде щещенно предлагали, для чего и была перенесена въ госпиталь.

7-го Генваря операція сдѣлана слѣдующимъ способомъ. На передней поверхности голени сдѣланъ разрѣзъ, дюймовъ въ шестъ, изъ котораго вышло нѣсколько водяноковъ (hydatides). Вся полость кости была наполнена водянками разной величины, коихъ всѣхъ собрана чайная чашка. Переломъ былъ косвенный, концы кости были неровные и почти на дюймъ выше и ниже перелома кость была такъ тонка, что малѣйшее насиліе могло переломить ее. Передняя часть 6. берцовой кости, заключавшая шероховатые концы, опията дюйма на чепыре, нога опянь вложена въ шины и была лѣчена какъ сложный переломъ. Рана и переломъ скоро зажили. Нога сдѣлалась такъ прямою, какъ только можетъ быть послѣ перелома и не короче другой. Женщина могла ходить и нѣсколько времени днемъ заниматься домашними дѣлами; общее здоровье ея поправилось.

Случай сей доказываетъ, до какой степени кость можетъ быть обнажена, разстроена и опянь зарости.

Я и мои поварищи въ госпиталѣ много видѣли случаевъ костоуды и помершвѣнія

костей, въ коихъ чрезвычайно большіе куски кости были выняты съ счастливымъ успѣхомъ и члены спасены, копорые по обыкновенному способу надлежало бы отнять.

W. J. Wickham jun.

Lond. med. and phys. Journal, Janv. 1827.

4. Помертвѣніе простиравшееся почти во всю внутреннюю поверхность б. берцовой кости.

У юноши 17-ти лѣтъ, золотушнаго сложенья, послѣ ломоты въ правомъ колѣнѣ, перешедшей на всю голень сей ноги появилось нѣсколько язвъ на голени, коихъ, число въ теченіи года постепенно увеличилось, и изъ нихъ по временамъ выходили кусочки кости. Во время принятія въ госпиталь (въ la Flèche) нога была толщею вдвое противъ здоровой, объемъ б. берцовой кости во всю ея длину былъ чрезвычайно увеличенъ. Отъ верхняго конца голени до нижняго, на пространствѣ дюйма въ три, находилось 22 свищевыхъ отверстій, изъ коихъ выпекалъ вонючій, жидкій гной. Всѣ они имѣли сообщеніе со внутреннею поверхностію кости и ея переднимъ

краемъ. Покровы были цвѣта блѣднокраснаго, переходящаго въ фіолетовый. При изслѣдованіи зондомъ оказалось, что б. берцовая кость вездѣ была обнажена, неровна и бугорковата. Около нижней трети голени находилось одно опверстіе больше другихъ, проходившее въ самую полость кости; другое опверстіе, дюйма на два ниже сказаннаго, также вело въ ту же полость. Задняя и боковыя части голени были въ здоровомъ состояніи, хотя больной безпрестанно лежалъ на спинѣ. Безпрерывные лихорадочныя припадки, по вечерамъ ожесточавшіеся, съ ночными потами и изнуреніе сопровождали сіе болѣзненное состояніе. Больной убѣдительно просилъ какимъ бы то ни было способомъ избавить его отъ болѣзни, которая непременно повергнетъ его во гробъ. Поелику помертвѣніе кости начиналось не далѣе какъ на дюймъ отъ нижней связки надколенной кости, то для опіятія голени не было удобнаго мѣста. Здоровое состояніе задней и боковыхъ частей голени и молодыхъ лѣтъ больного подали Врачу мысль, что можетъ быть удастся сохранить членъ чрезъ удавленіе однихъ помертвѣлыхъ частей. Сдѣланы

были два эллиптическіе разрѣза, начинавшіеся непосредственно подъ нижнею связкою надколѣнной кости и оканчивавшіеся на два дюйма выше нижняго конца б. берцовой кости. Всѣ свищевыя отверстія были окружены сими разрѣзами. По опіяптіи мягкихъ частей представилась обнаженная кость, которая была почернѣвшая, неровная и шероховатая на всей своей внутренней поверхности. Въ верхней части поврежденной кости просверлено отверстіе и другое на два дюйма ниже перваго; болѣе сверлишь кость не было надобности, по причинѣ упомянутыхъ отверстій, проспиравшихся въ самую полость кости. Посредствомъ полаго долота и деревяннаго молотка опіяпты всѣ костныя части, находившіяся между просверленными отверстиями; вся внутренняя сторона и передній край б. берцовой кости опіяпты прочь, и полость ея обнажена на пространствѣ осьми дюймовъ. Въ полости найденъ кусокъ кости въ черноватомъ, вонючемъ, жидкомъ гноѣ. Полость кости была очищена, выскоблена водою, наполнена сухою корпіею и вся рана покрыта широкими корпейными связками. Въ при мѣсяца рана почти совсѣмъ

зажила; оставались только два свищевых отверстия, которые по выходе из них косточек также скоро закрылись. Голень сдѣлалась ширею еще противъ здоровой; ни на внутренней, ни на передней ея части не осталось никакихъ вдавленій. По выходе изъ госпиталя человекъ сей не хромалъ и могъ опять по прежнему заниматься полевыми работами.

Froriep's Notizen. Bd. XVIII. стр. 125.

5. Изсѣченіе нижней челюсти.

Въ новѣйшее время многіе Хирурги принимали съ счастливымъ успѣхомъ изсѣченіе нижней челюсти. Изъ числа таковыхъ случаевъ слѣдующій, кажется, болѣе другихъ примѣчательный, по крайней мѣрѣ по чрезвычайной величинѣ опухоли.

Въ началѣ Іюля, говоритъ Г. Сейме, Докторъ Сиббалдъ просилъ меня посмотришь опухоль, которую онъ хотѣлъ вырѣзать, если это не будетъ опасно для жизни больного, и рассказалъ мнѣ припомъ слѣдующее:

Робертъ Пенманъ, будучи еще 16-ти лѣтъ, замѣтилъ твердую опухоль десенъ съ наружной стороны коренныхъ зубовъ лѣвой

нижней челюсти. Опухоль постепенно увеличивалась, безъ боли. Когда она была величиною въ куриное яйцо, больной просилъ помощи у одного Хирурга, который ему выдернулъ три коренные зуба. Послѣ сего опухоль начала расти скорѣе, и когда она выросла до величины кулака въ два, больной для излѣченія оной поспушилъ въ Единбургскую больницу, гдѣ ее вырѣзали, не прогая кости. Рана не заживала, не смотря на повпоренное дѣйствительное прижиганіе. Пробывши восемь мѣсяцовъ въ больницѣ, *Пенманъ* возвратился домой; но видя, что опухоль постоянно и скоро увеличивалась, онъ, спустя два года, опять пришелъ въ Единбургъ и просилъ совѣта у одного извѣстнаго тамошняго Хирурга, который однако никакъ не рѣшился предпринять что либо для его облегченія. Больной возвратился домой съ печальною мыслию, что его ожидаетъ неизбежная, медленная и мучительная смерть. Три года съ половиною провелъ онъ въ семь жалкомъ состояніи, когда его случайно увидѣлъ Докторъ *Сиббалдъ*. Онъ началъ болѣзнь тогда было около десяти лѣтъ. Хотя опухоль теперь была втрое болѣе

противъ того, когда больной оставилъ Единбургъ въ послѣдній разъ, однако Докторъ Сиббалдъ полагалъ, что еще можно ожидать помощи отъ операціи, и потому уговорилъ больного еще разъ побывать въ упомянутомъ городѣ.

Не смотря, что я уже былъ приутопленъ увидѣвъ нѣчто необычайное и спрашивное, я испугался при видѣ больного. Изображеніе лучше представитъ то, чего словами выразить не лзя. (См. карт.).

Ротъ споялъ вверхъ, былъ ужасно искривленъ, въ окружности въ пятнадцать дюймовъ. Дыхательное горло было почти совсѣмъ сжато (*fast obliterirt*), только дюйма на два можно было его видѣть выше грудной кости, такъ что черпаловидный хрящъ (*cart. cricoides*) находился на одинакой высотѣ съ сею костью. Смотря съ боку, опухоль простиралась на восемь дюймовъ внизъ на шею; она выполняла всю полость рта. Языкъ лежалъ на споронѣ между зубами и правою щекою. Только вѣлвь и основаніе нижней челюсти правой спороны отъ первыхъ коренныхъ зубовъ кзади были здоровы. Опухоль въ нѣхъ мѣстахъ, гдѣ она покрыва-

валась общими покровами, была очень крѣпка и большею частію явственнѣ косянаго существа. Часпъ, выдававшаяся изъ рта, была красная, безобразная, съ виду губчатая, различной плотности; по временамъ изъ нее вытекало много крови, а въ послѣдніе 3 - 4 недѣли почти ежедневно вытекало оной опъ унціи до двухъ унцій. Не смотря на величину опухоли, больной могъ довольно свободно двигать челюсть во всѣ стороны. Общее состояніе больного было хорошо. Онъ былъ высокаго роста, только очень похудѣлъ, расшоропелъ и необыкновенно терпѣливъ.

Исслѣдовавши опухоль, я рѣшилъ ее вырѣзать, и какъ сіе намѣреніе было одобрено Докторомъ *Аберкамби* и Профессоромъ *Беллингсломъ*, то я 7-го Іюля и сдѣлалъ операцію въ присутствіи Профессора *Рассела*, Докторовъ *Аберкамби*, *Гунтара* и другихъ.

Посадивши больного на обыкновенный стулъ (хотя сіе положеніе для меня было неудобное, однако я его предпочелъ потому, что оно служило къ отвращенію задушенія, котораго надлежало опасаться опъ кровопеченія во время операціи), я сдѣлалъ кос-

венный разръзъ, проведши ошодоконечный ножъ отъ праваго угла рта до основанія челюсти, гдѣ я хотѣлъ ее раздѣлить, именно прошивъ вѣпораго кореннаго зуба, который на канунѣ былъ выдернутъ. Я обнажилъ въ семь мѣстѣ наружную поверхность кости, часть ея перепилилъ, а остальное отпнялъ прочь острыми щипцами. Послѣ сего перевязана *arteria coronaria inferior*, коей кровоотечение было удерживаемо чрезъ сжатіе губы.

Послѣ сего сдѣлалъ я продолговатый дугообразный разръзъ на лѣвой сторонѣ, простирившійся отъ угла рта по направленію основанія и вѣшви челюсти за сосцеватый отростокъ. Перевязавши *arter. facialem* и двѣ поперечныя вѣшви *arteriæ temporalis*, отсепаровалъ я лоскутъ до самой шеи, такъ что Докторъ Баллигалъ могъ ощущать сонную артерію между мышцами, и въ случаѣ нужды ее можно было прижать. Пошомъ сдѣлалъ я другой кривой разръзъ въ подобномъ направленіи съ первымъ, также начинавшійся отъ угла рта и обходившій часть щеки, плотно сросшуюся съ опухолью. Отдѣливши и сей лоскутъ, я разръзалъ *musc.*

masseterem, и обнажилъ всю наружную поверхность опухоли. Послѣ сего разрѣзана внутренняя перепонка рта, отъ чего опухоль сдѣлалась гораздо подвижнѣе, и я могъ обнажить processum coronoideum, отдѣлить musc. temporalem и вскрыть сосцевъ въ его передней части. За симъ мнѣ оставалось только обрѣзать вокругъ сосцевого отростка и отдѣлить m. n. pterygoideum, mylohyoideum и другія мышечныя соединенія.

Операція продолжалась 24 минуты; но и сіе время не все употреблено на рѣзаніе: ибо я часто давалъ больному нѣсколько оподохнуть, дабы онъ не ослабѣлъ отъ непрерывной боли. Онъ хорошо перенесъ операцію и потерялъ не болѣе осьми унцій крови. Дыханіе нисколько не было затруднено.

Положивши нѣсколько свершковъ нипокъ въ большую полость, оставшуюся послѣ опухоли, вѣсившей чептыре фунта съ половиною, я спянулъ общіе покровы лѣвой стороны лица въ трехъугольникъ и края раны соединилъ sutura contorta. Разрѣзъ на правой стороне соединенъ такимъ же образомъ. Послѣ сего, для поддержанія ослабшихъ покрововъ,

сдѣлано два или три обвода окружной повязки около подбородка и головы.

Послѣ операціи больной ни на что не жаловался. Пульсъ въ первые два дни около 100 ударовъ въ минуту, мягкій; мало помалу онъ сдѣлался естественнымъ. Больной спалъ хорошо и кушалъ съ аппетитомъ говяжій супъ и сыворопку, которые ему вливали въ глотку чрезъ кривую воронку. Испражнение низомъ было правильное. На третій день сверпки нитокъ выняты; больной вспалъ и сказывалъ, что онъ чувствуетъ себя лучше, нежели до операціи.

Въ заключеніе Г. Сейле присоединяетъ слѣдующія общія замѣчанія о производствѣ сей операціи.

Больной во время операціи долженъ сидѣть, дабы кровь не текла въ дыхательное горло и не оспанавливала производства операціи, либо даже не принудила прибѣгнуть къ прободенію горла (*tracheotomia*), для отвращенія задущенія.

Перевязываніе сонной артеріи прежде операціи не доставляетъ никакой выгоды. Въ описанномъ случаѣ мнѣ совѣтовали это сдѣлать, но я не согласился по слѣдующимъ

причинамъ: 1. перевязываніе сіе ненужно, поелику при изсѣченіи челюсти разрѣзываются только *arteria facialis* и нѣкоторыя вѣтви ея и *arter. temporalis*; 2. оно испостило бы больного, а особливо когда опухоль пому препящивуесть, какъ въ вышепредставленномъ случаѣ, въ коемъ почти не было мѣста для наложенія лигатуры. Въ одномъ изъ случаевъ, описанныхъ Докторомъ *Моттомъ*, больной такъ ослабѣлъ, что изсѣченіе челюсти нужно было оставить до другаго дня послѣ перевязанія артерій; 3. оно увеличиваетъ опасность: поелику при опнытіи лигатуры опъ сосуда, столь большаго, какъ сонная артерія, всегда надлежитъ болѣе или менее опасаться кровотеченія; 4. оно бесполезно: поелику сообщенія сосудовъ (*anastomoses*) такъ многочисленны, что перевязаніе главнаго ствола не можетъ опвратить кровотеченія изъ его вѣтвей. Такъ въ вышеупомянутомъ случаѣ *Мотта* нужно было перевязать артерію, перерѣзанную при' операціи, и я слышалъ объ одномъ случаѣ, въ коемъ Операторъ, желая вырѣзать опухоль верхней челюсти, перевязалъ обѣ сонныя артеріи; однако кровотеченіе было такъ

• *

сильно, что онъ принужденнымъ нашелся оставить операцію; 5. всѣмъ въ выгоды, какихъ слѣдуетъ ожидать отъ перевязанія спвола, можно получить чрезъ сжатіе онаго, опдѣливъ или разрѣзавъ лежащія надъ нимъ покровы.

Касательно перепиливанія нижней челюсти я навѣрно утверждаю, что составная пила (Kettensäge) для сего не есть самая лучшая, хотя Докторъ Кузакъ, опытный и свѣдущій Хирургъ, ее похваляетъ. Я употреблялъ пилу, коей лезвіе прямое въ 6½ дюймовъ длины и полдюйма ширины, а рукоятка прямая. Она можетъ быть полезна при различныхъ операціяхъ костей. Нѣтъ надобности перепиливать всю кость, но сдѣлавъ глубокую бороздку, остальное можно удобно закончить острыми щипцами, что Листонъ сдѣлалъ съ большою пользою. Симъ способомъ и я опдѣлилъ челюсть гораздо скорѣе, нежели когда бы я обвелъ вокругъ ея составную пилу.

Сперва нужно обнажить всю наружную поверхность опухоли, дабы можно было перевязать всѣ сосуды, какіе нужно перевязывать, и доставить крови, выходящей изъ маленькихъ сосудовъ, свободный истокъ. По-

помъ нужно разрѣзать слизистую перепонку рта, проводя ножъ опъ миндалевидныхъ желѣзъ наружу, чрезъ что опухоль сдѣлается подвижнѣе и Хирургъ обыкновенно бываетъ въ состояніи отдѣлить мышцы, прикрѣпляющіяся ad processum coronoideum. Если сего сдѣлать не удастся, то надобно processum coronoideum перепилить или перерѣзать острыми щипцами и потомъ прижать опухольвнизъ, сколько возможно, дабы вскрыть соспавъ на передней его части. Послѣ сего, для отдѣленія оспающихъ соединеній, слѣдуетъ только провести ножъ близко къ опухоли.

Мнѣ кажется, что предложеніе Доктора Кузака вскрывать соспавъ нижней челюсти спереди очень благоразумно; иначе поврежденіе arteriae maxillaris internae либо arter. temporalis почти неизбѣжно. Такъ Листонъ въ одномъ случаѣ, вскрывши соспавъ сзади, былъ принужденъ перевязать главный стволъ arter. temporalis и arter. maxillarem internam,—кратко сказать, carotidem externam. Я не говорю, что способъ сей весьма опасенъ для больного, либо весьма затруднителенъ для Оператора, столь искуснаго, какъ

Листонъ; однако я полагаю, что Хирургъ не долженъ рѣзать ничего, что существенно не необходимо для операціи. Также мнѣ кажется, что въ случаѣ, описанномъ *Листономъ*, больной не подвергся бы опасному послѣдственному кровопеченію, если бы только поверхностные сосуды были разрѣзаны.

Далѣе мнѣ кажется, что въ *Листоновомъ* случаѣ восходящія вѣтви *portionis durae* (7-й пары) были перерѣзаны: поелику вѣтви больного сдѣлались параличны. Весьма вѣроятно, что сего не случилось бы, если бы сосавъ былъ вскрытъ спереди.

Прибавленіе. *Пенланъ* теперь очень въ хорошемъ состояніи. Ростъ его достигъ почти естественной величины и видъ его не производитъ никакого непріятнаго впечатлѣнія. Рѣчь его ежедневно улучшается, и онъ уже можетъ довольно внятно выразить свои желанія. Онъ сдѣлался гораздо крѣпче и намѣревается опять приняться за свои дѣла.

Notizen von Froriep. XXIII. Bd. стр. 9.

III.

**ИЗВѢСТІЕ О БОЛЬНЫХЪ, ПОЛЬЗОВАН-
НЫХЪ ВЪ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КЛИ-
НИКѢ И. М. Х. А. ВЪ С. ПЕТЕРБУРГѢ
СЪ 16-ГО СЕНТЯБРЯ 1828 ПО 14-Е
ІЮНЯ 1829 ГОДА.**

*Сообщилъ Профессоръ оной Клиники, Докторъ
П. Чаруковский.*

Въ печеніи сказаннаго времени пользова-
но въ Клиникѣ 182 больныхъ. Слѣдующая
таблица представляетъ названія болѣзней,
коими они спрдали, число спрдавшихъ
каждою болѣзнію, исходъ болѣзни и сред-
нее число дней пребыванія больныхъ въ Кли-
никѣ.

НАИМЕНОВАНИЕ БОЛЕЗНЕЙ.	Число бо- ль- ных.	Вызоров- но.	Умерло.	Опущены невылече- ными.	Среднее чис- ло дней пре- бывания.
Febris intermittens quo- tidiana.	5	4	„	1	9 $\frac{3}{4}$
— — — — — tertiana.	6	4	„	2	27 $\frac{3}{4}$
— — — — — quartana.	4	1	1	2	18 $\frac{1}{4}$
— — — — — anomala.	2	2	„	„	22
— — — — — rheumatica. . . .	3	2	„	1	21
— — — — — catarrhalis. . . .	5	4	„	1	12 $\frac{1}{2}$
— — — — — gastrica.	8	8	„	„	23 $\frac{1}{2}$
Synochus.	15	14	„	1	20
Febris metisthica. . . .	1	1	„	„	68
Morbilli.	2	2	„	„	16
Parotitis.	1	1	„	„	12
Glossitis.	1	1	„	„	8
Tracheitis.	2	2	„	„	11 $\frac{1}{2}$
Pharyngitis.	1	1	„	„	5
Pleuritis.	7	6	„	1	12 $\frac{5}{7}$
Pneumonitis.	11	9	„	2	16 $\frac{7}{11}$
Peritonitis.	6	4	1	1	17 $\frac{3}{5}$
Enteritis.	4	„	4	„	1 $\frac{3}{4}$
Gastro-enteritis.	1	1	„	„	13
Orchitis.	1	1	„	„	13
Tabes dorsalis.	1	„	„	1	150
Syphilis universalis. . .	5	4	„	1	34 $\frac{2}{5}$
Hydrops.	4	1	1	2	34 $\frac{1}{4}$
Icterus.	1	1	„	„	17
Plethora et congestio sang- vinis.	8	7	„	1	14
И всего. .	105	81	7	17	

Всего.	182	115	16	53
--------	-----	-----	----	----

Изъ сего обозрѣнія видно, что изъ 182-хъ больныхъ 113 выздоровѣло, 16 умерло и 53 опущены неизлѣченными. Посему изъ числа всѣхъ больныхъ умеръ почти двенадца-

пый, а число умершихъ къ числу выздоровѣвшихъ содержи́ся какъ 1: $7\frac{1}{16}$.

Смертность сія сама по себѣ конечно значительна; но она уже довольно объясняется свойствомъ и продолженіемъ болѣзней, опъ копорыхъ умерла большая часть нашихъ больныхъ. Извѣстно, что настоящее воспаление кишекъ, даже заблаговременно лѣчимое, нерѣдко оканчивается несчастно; а умершіе у насъ поступили въ Клинику не въ семь благопріятномъ періодѣ, какъ это видно уже изъ средняго ихъ пребыванія въ Клиникѣ. Но 16-й, по порядку поступленія больныхъ въ Клинику, еще въ Генварѣ 1828 года лѣчился цѣлый мѣсяцъ въ госпиталѣ. опъ боли живота, копорая съ тѣхъ поръ по временамъ усиливалась и сопровождалась рвою и напужнымъ поносомъ. Около 20-го Сенября (больный былъ не въ состояніи обстоятельно объясняться) боль ожесточилась сильнѣе прежняго; но онъ поступилъ въ Клинику только 3-го Оксября вечеромъ, причемъ конечности были холодныя, пульсъ совсѣмъ неощупительный, непрерывная тошнота и рвоша зеленоватою жидкостію, напужный съ кровію

поносъ. По смерти, послѣдовавшей 6-го Октября, найдено выпотѣніе бѣлковаго, густаго вещества въ брюшную полость, склеивавшаго кишки; померщившіе кишки въ такой степени, что полости разлезались между пальцами, язвы на внутренней поверхности ободочной кишки и суженія оной, изъ коихъ одно едва пропускало мизинецъ; оболочки въ семь мѣстѣ были ополстѣвшія, какъ бы мозолистыя, а выше суженія (къ тонкимъ кишкамъ) въ полости кишки нѣсколько свободныхъ перепончатыхъ комковъ (*concrementa polypiformia*), разной величины, но столь плотныхъ, что они не могли пройти сквозь сказанное суженіе. Комки сіи, безъ сомнѣнія, произведены предшествовавшими воспаленіями кишекъ. Но 81-й пробылъ въ Клиникѣ четырнадцать, а Но 84-й только семь часовъ. Но 92-й. Инвалидъ, 46 лѣтъ, также уже долго страдалъ болью въ животѣ, иногда съ поносомъ, а иногда съ запоромъ; 30-го Декабря боль въ животѣ сдѣлалась очень жестокою, а 2-го Генваря больной принесенъ въ Клинику почти въ безпамятствѣ, съ бредомъ; брюхо было раздуто, поноша и рво-

та черноватою жидкостію, пульсъ неощупительный. По смертїи, послѣдовавшей 4-го Генваря, найдено изліяніе изъ-желта красноватой жидкостїи въ брюшную полость и помертвѣніе наружной (брюшинной) перепонки кишекъ, сверхъ того два темнаго, бурога цвѣта шарика въ маломъ опроспкѣ поджелудочной желѣзы, изъ коихъ одинъ величиною въ лѣсный орѣхъ, а другой поменьше.

Въ какомъ состояніи поступили въ Клинику спрадавшіе хроническими недугами груди, явствуетъ изъ средняго числа дней ихъ пребыванія въ Клиникѣ. Почти всѣ они приняты только по неощспунной ихъ просьбѣ, и дабы опказомъ не опнятъ у нихъ и послѣдней надежды къ излѣченію ихъ болѣзни, пропивъ копорой они уже долго искали помощи у другихъ Врачей.

Умершій опъ водяной, или, лучше сказать, опъ разспройства брюшныхъ внупренностей, спарикъ 66-ти лѣтъ, шакже принятъ изъ соспраданія къ его безпомощному состоянию. Онъ пробылъ у насъ только десять дней.

Равнымъ образомъ и Чиновникъ (No 59), спрадавшій хроническимъ недугомъ сердца,

принялъ только попому, что мы боялись, дабы онъ не умеръ на обратномъ пути домой, дабы хотя нѣсколько облегчить бѣдную его жену, которая сама должна была ходитъ за изнемогающимъ больнымъ и имѣть попеченіе о нѣсколькихъ малолѣпныхъ дѣтяхъ, и дабы ему самому, въ послѣдніе дни его жизни, доставить успокоеніе и опраду. Больной сей пробылъ въ Клиникѣ съ 14-го по 25-е Ноября.

Исторія болѣзни умершаго ab ileo описана въ ч. XIII. No 1. сего Журнала, а умершаго изъ числа спрдавшихъ четвертодневную лихорадкою смерть воспослѣдовала опть воспаленія спиннаго мозга, и исторія его болѣзни описана въ ч. XIII. No 3.

Умершій изъ числа спрдавшихъ воспаленіемъ брюшины былъ мужчина 40 лѣтъ, здороваго тѣлосложенія. На 20-мъ году своей жизни у него нѣсколько разъ было кровохарканіе, а на 36-мъ венерическая, опть которой онъ два раза, по нѣскольку мѣсяцовъ, лѣчился съ значительнымъ ослабленіемъ силъ. Въ 1828 году онъ два раза спрдалъ сильною болью въ груди, которая всякой разъ была лѣчена кровопусканіемъ. 19-го Маія 1829

въ 3 часа по полудни больной сей почувствовалъ сильный ознобъ, съ большою слабостию, вечеромъ перешедшій въ жаръ, къ коему 21-го числа присоединилась жестокая боль всего брюха, безъ поношны и поноса. Вечеромъ сего числа онъ поспушилъ въ Клинику, гдѣ кромѣ того замѣчено: желпизна глазъ, языкъ очень сухой, на концѣ краснѣй, пульсъ весьма частый, неровный, некрѣпкій, но не очень слабый, температура шѣла мало возвышенная, боль всего брюха, опъ легкаго прикосновенія ожесточавшаяся, свободное испражнение низомъ. *Mixtura nitratis potassæ, cataplasma emolliens narcoticum.*

23-го появилась икота, а 24-го небольшой поносъ, желпизна распространилась на все шѣло, брюхо надушо, по прежнему чувствительно, боль въ подреберьяхъ; пульсъ ровнѣе, довольно полный. *Dtra mucilaginoza, submur. hydrarg. cum opio*; теплая ванна; *vesicator.*

25-го. Брюхо чувствительно только при прижатіи, языкъ мягкій, частая икота, опрыжки зеленоватою жидкостію; пульсъ какъ вчера, конечноши нехолодные, физиономія больного довольно спокойная. Вечеромъ въ

7-мъ часу безчувствіе, судорожныя движенія, пульсъ неощупительный; въ 10-мъ часу скончался.

Вскрытіе пѣла спустя 36 часовъ по смерти. Большое изліяніе темноцвѣтной крови въ брюшной полости; помертвѣніе брюшины и наружной оболочки кишекъ; печень рыхла, съ бугорками снаружи и въ существѣ, селезенка увеличена, рыхла, опдѣлена опъ под реберья, на выпуклой ея споронѣ, почти на срединѣ поперечная прещина опъ одного края до другаго, нѣсколько проспиравшаяся въ самое существо.

Число оппущенныхъ неизлѣченными такъ же большое. Главная причина сего состоиптъ въ томъ, что къ намъ поступало много (именно 45 человекъ) гарнизонныхъ и инвалидов *), слѣдовательно уже прежде признанныхъ неизлѣчимыми; а изъ вольноприходящихъ къ намъ являюпся болшею частію такіе, которые уже были пользованы многими Врачами. Нѣкоторыя хроническіе боль-

*) Обыкновенно къ намъ поступаюптъ больные изъ пріемнаго покоя главнаго военнаго госпиталя, а изъ вольноприходящихъ мы принимаемъ только примѣчательнѣйшіе случаи.

ные, мало поучительные для Спудентовъ, опущены по ограниченности кроватей въ Клиникъ, дабы на ихъ мѣсто можно было принять другихъ, болѣе примѣчательныхъ; немногіе отправлены изъ Клиники по причинѣ большихъ праздниковъ или при окончаніи курса, однако не иначе, какъ значительно поправившись; трудныхъ больныхъ мы и въ сіе время удерживаемъ въ Клиникъ до поправленія или до смерти, особливо когда надѣемся воспользоваться патологическимъ вскрытіемъ, которое, къ сожалѣнію, по просьбѣ родственниковъ или поварищей часто принуждены бываемъ оставлять.

Хотя у насъ было много спрдавшихъ перемежающимися лихорадками, однако замѣчаніе Г-на Главнаго по арміи Медицинскаго Инспектора Я. В. *Вилліе*, что болѣзни сіи въ С. Петербургѣ рѣдко случаются *), подтверждается. Мы не видали ниодного примѣра правильной лихорадки у такихъ, которые живутъ здѣсь постоянно и уже давно не спрдавали оною; напрошивъ того всѣ сего рода больные были либо прибывшіе сюда рекрупты, спрдавшіе лихорадкою еще на своей родинѣ, или забо-

*) См. В. М. Ж. ч. XIII. стр. 6.

пившіеся изъ Персіи и имѣвшіе ее еще въ Грузіи. У первыхъ лихорадка была большею частію каждодневная или прерывающаяся и легко излѣчивалась обыкновенными средствами; послѣдніе были одержимы лихорадкою четвертодневною или неправильною, большею частію съ завалами брюшныхъ внутренностей. Мы не могли сдѣлать надлежащихъ наблюдений касательно дѣйствія хинной соли; хина съ опіемъ или рвотною солью оспалась недѣйствительною противъ лихорадокъ застарѣлыхъ.

Воспалительно-нервные горячки (zupochi) случались наипаче въ Октябрѣ мѣсяцѣ (съ 5-го по 28-е поступило восемь), и сіи были труднѣе прочихъ. У одного изъ сихъ больныхъ (N 37-й) съ явною пользою было употреблено обмываніе всего тѣла холодною водою.

Острыя воспаленія легкихъ, въ продолженіи послѣдняго курса намъ совсѣмъ не встрѣчавшіяся, въ теченіи нынѣшняго были частыя, наипаче въ Генварѣ (изъ 11-ти такихъ больныхъ семь поступило въ семь мѣсяцѣ); нѣкоторыя изъ нихъ были очень жестоки, на прим: No 17-й, тридцатилѣтній мужчина, среднѣннаго тѣлосложенія, уже

при года спрдавшій одышкою послѣ ушиба груди и кровдохарканія и поступившій въ Клинику на 5-й день новой болѣзни, съ сильнымъ спѣсненіемъ въ груди, коропкимъ, неровнымъ, хриплымъ дыханіемъ, припухшимъ лицомъ, синеватыми губами, часпымъ, малымъ, неровнымъ пульсомъ; кромѣ того языкъ сухой, красный, сильная жажда, бредъ. При N. 99-мъ иноспранный Врачъ Г. *Гулибертъ*, коему сей больной поручень былъ для испытанія его, полагалъ уже начало помершвѣнія въ легкихъ. N. 128-й, мужчина 55-ти лѣтъ, многократно спрдавшій лихорадкою, иногда довольно упорною, въ первыхъ числахъ Февраля 1829 былъ ушибенъ въ грудь, съ значительною опухолью, оспававшеюся нѣсколько дней; 11-го того же мѣсяца попалъ онъ подъ полозъ саней, нагруженныхъ свинцомъ, опъ чего воспослѣдовало воспаленіе легкихъ съ кровохарканіемъ; но онъ принужденъ былъ продолжатъ свой нушъ при сильной спужѣ еще семь дней, безъ всякаго пособія, на отккрытыхъ саняхъ. 19-го Февраля, при поступленіи въ Клинику, кромѣ признаковъ жеспокаго, усилившагося воспаленія легкихъ, замѣчены еще значительные припадки воспалишельно-нервной го-

рячки, а при или чештыре дни спустя, присоединилось воспаление въ горлъ (*angina faucium*).

Изъ числа сихъ больныхъ только двое опущены несовершенно излѣченными: упомянутый N. 17-й, у котораго оспалась прежняя его одышка, и N. 101-й, имѣвшій припомъ большіе завалы брюшныхъ внушренноспей послѣ Грузинской лихорадки; почему трудно было рѣшить: оспавшееся небольшое спѣсненіе въ груди было ли слѣдспвіемъ воспаления легкихъ или механическаго препяшспвія движенію грудобрюшной преграды. При глубокомъ вдыханіи грудь расширялась хорошо, при удареніи издавала надлежащій звукъ и спешоскопъ показывалъ свободное прохожденіе воздуха въ существо легкихъ.

Главныя и обыкновенныя наши средства противъ воспаления легкихъ суть: кровопусканіе и солянокислая рпушь съ сюрмяными средствами; при значительномъ общемъ воспалительномъ состояніи селипра, а при раздраженномъ состояніи (*erethismus*) кровеносной системы наперспочная шрава и иногда опій; если припомъ находится оспрая боль, то употребляемъ кровососныя банки и попомъ смягчающія припарки; шпанскія муш-
*

ки прикладываемъ мы по ослабленіи воспаления, для уничтоженія оспашковъ раздраженія.

Количество испражняемой крови при кровопусканіи опредѣляемъ мы преимущественно его вліяніемъ на больного, т. е., мы даемъ ей печь до пѣхъ поръ, пока или больному въ груди сдѣлается свободнѣе, или появившаяся предвѣспники обморока. Обыкновенно сіе количество проспирается опъ фунта до двухъ. Сему наипаче обстоятельству мы приписываемъ счастливое окончаніе болѣзни, равно какъ и то, что мы рѣдко бываемъ принуждены прибѣгать къ ланцету во второй разъ.

Мѣстное испражненіе крови предпринимаемъ мы послѣ общаго только при значительной оспрой боли; при спѣсненіи въ груди, тупой, глубокой боли, трудномъ дыханіи, сжатомъ пульсѣ, оно если не вредно, то и мало полезно. Въ послѣднемъ случаѣ нужно чрезъ скорое испражненіе крови частію уменьшитъ ея количество въ организмъ, а частію отвлечь ее опъ легкихъ и чрезъ то возстановитъ свободное печеніе оной въ семь органъ; чего пиявки или кровососныя банки,

даже въ большомъ количествѣ употребленія, не производящъ.

Воспаленія подреберной плевры мы лѣчили уже прежде *) изложеннымъ способомъ, безъ общаго кровопусканія, и также съ хорошимъ успѣхомъ. И въ семь году имѣли мы одинъ случай (N. 2-й), въ кошоромъ, до поступленія больного въ Клинику, для уничтоженія колошья въ боку безъ пользы были употреблены горчишники, шпанская мушка и потомъ кровопусканіе, но кошорое въ два дни уничтожено смягчающими припарками и значительными пріемами наперспочной правы.

Воспаленія брюшины скоро уничтожились смягчающими припарками, ванною и теплымъ, испарину возбуждающимъ пишьемъ; піявки употребляли мы рѣдко. Среднее число дней пребыванія сихъ больныхъ въ Клиникѣ вышло значительное отъ того, что N. 11-й пробылъ 66 дней, по причинѣ хроническаго кашля, пропивъ кошораго, послѣ другихъ грудныхъ и наркопическихъ средствъ, *gummi r. f. ammon cum tinct. opii ammoniata* оказало очевидную пользу. Болѣзнь N. 86-го была очень сложная и жестокая: сильная боль въ груди,

*) В. М. Журнала ч. X. стр. 312 и слѣд.

при дыханіи ожесточавшаяся, таковая же во всемъ брюхѣ, непозволявшая и слабаго прижапія; поносъ, по зременамъ пошнопіа и рвопа, припадки общаго воспалительнаго состоянія, бредъ; припомъ больной былъ слабаго пѣлосложенія, по причинѣ коего, не имѣя еще 30-ли лѣтъ, послупилъ уже въ гарнизонъ. Общее кровопусканіе, піявки, припарки, а потомъ мушка къ живому, внутрь сперва селипра въ слизиспомъ опварѣ, а потомъ *submur. hydrarg. cum opio* и теплая ванна въ 13 дней возвратили больному прежнее его здорвье.

При воспаленіи кишекъ намъ мало оспавалось дѣлапъ; шолько въ двухъ случаяхъ мы хопѣли пуспипъ кровь, но она не пошла; припускали піявки, прикладывали снѣгъ, спавили холодныя промывапелныя.

Болѣзненное состояніе спрадавшаго бѣлою горячкою (N. 65-й) шакже было очень сложное. Больной сей, 32-хъ лѣтъ, здороваго пѣлосложенія, намъ былъ уже нѣсколько лѣтъ извѣспенъ своимъ приспраспіемъ къ спирпнымъ напишкамъ. Въ Августѣ 1828 года онъ заразился перелоемъ, кошорый почпи совсѣмъ пренебрегъ, и въ Сеншябрѣ дол-

женъ былъ предпринять опдаленный путь, продолжавшійся пять недѣль, въ продолженіи котораго больной по недоспазку подвергался всѣмъ непріятностямъ непогоды, усталости и проч. Во время сего пути появились язвинки на предплѣіи (*præputium*), сыпь на головѣ, лицѣ и груди, язвы во рту, опёкъ предплѣія и всего тѣла, *rhumozis*; перелой продолжался. По прибытіи въ С. Петербургъ больной, по причинѣ крайней слабости, пролежалъ въ постели цѣлый мѣсяцъ и оправившись немного въ силахъ, явился къ намъ со всѣми вышесказанными припадками. Кромѣ того сонъ его былъ очень легкій, грезами прерываемый, руки дрожали и онъ потѣлъ почти безпрестанно.

Haustus oriatus послѣ слабительнаго скоро успокоилъ нервные припадки; хина съ горькими и желѣзными средствами возстановила его силы, а для уничтоженія сыпи и язвъ употребляли мы *solutionem oxymur. hydragryi*, и потомъ *decoctum Zittmanni*.

Изъ спсрадавшихъ *dispersia* примѣчашеленъ Но 9-й. Чиновникъ, 28 лѣтъ, средспвеннаго тѣлосложенія, доспапочныхъ, здоровыхъ родителей, съ 15-ти лѣтъ *veneri et opaniae*

deditus ad excessum, употребляя припомъ *aphrodisiaca* и спиртные напитки не по своимъ лѣшамъ, съ 17-ши лѣтъ имѣлъ чепыре раза *blennorrhoeam* и въ 1825 году *ulcera syphilitica*. Послѣдняя болѣзнь была лѣчима рпушными средствами до сильного и продолжительнаго слюнотеченія, и съ того времени больной сей сдѣлался примѣшно слабѣе и чувствительнѣе къ переменамъ погоды, началъ часто имѣть зубную боль, слюнотеченіе и *pollutiones*. Желая заслужить выгодное мнѣніе Начальства по службѣ, въ послѣдніе годы онъ началъ прилѣжно заниматьсѣ дѣлами, причемъ къ прежнему болѣзненному его состоянію присоединились ипохондрико-меланхолическіе припадки: давленіе въ подреберьяхъ, ворчаніе въ брюхѣ, потеря аппетита, запоръ на низъ, попка, спѣсненіе въ груди, слабость всего тѣла, наружныхъ чувствъ и душевныхъ способностей. Разрѣшающія и возбуждающе-испражняющія средства (*соли, extracta, senna*) доставляли только временное облегченіе; пѣявки, два раза припущенныя къ верхней части брюха, продолжительное раздраженіе покрововъ брюха, теплыя ванны, а внутрь сперва *oleum olivæ*,

а потомъ для лучшаго испражненія низомъ ol. ricini, въ видѣ эмульсіи, уничтожили брюшные припадки, а хорошая діетѣ и вино привели его здоровье въ лучшее состояніе, нежели какимъ онъ наслаждался съ самаго начала своей невоздержной жизни.

Ревматическіе недуги были большею частію застарѣлые, у людей пожилыхъ. Сюрмяныя средства съ опіемъ, *Циттмановъ* декоктъ и теплыя ванны, особливо сѣрныя, оказались дѣйствительнѣйшими; въ двухъ случаяхъ hemigranіæ углекислое желѣзо, по видимому, оказало пользу; одинъ больной, молодой, крѣпкаго тѣлосложенія, выпилъ 48 стакановъ теплой воды въ продолженіи 12-ти часовъ (по способу *Каде-де-Во*) безъ значительнаго облегченія; сей же больной принялъ въ одинъ день пять, а на другой шесть гранъ опія, по грану черезъ часъ, также безъ примѣтнаго облегченія.

Только въ одномъ случаѣ пробовали мы излѣчить anginam veneream спрогою діетой, пиявками, припарками и раздраженіемъ покрововъ, но тщетно, и должны были обратиться къ обыкновеннымъ средствамъ (охутур. hydrargyri и decocto Zittmanni), коихъ упо-

прѣбленіе совершенно соотвѣтствовало нашему желанію.

При хроническихъ недугахъ легкихъ просуднаго свойства, съ труднымъ изверженіемъ, *murias ammoniæ cum decoctura specierum althææ et succo glizirrh. grabræ*, также *suboxydum stibii hydrosulph. cum succo spiss. hyoscyami n.*, а на ночь опій часто оказывали хорошее дѣйствіе; одинъ таковой больной получилъ большое облегченіе отъ паровъ дегтя (*rix liquida*); если же спраданіе легкихъ болѣе зависѣло отъ возвышенной ихъ раздражительности, при таковомъ же состояніи всего тѣла, каковыя примѣры имѣли мы наипаче въ молодыхъ полковыхъ музыкантахъ, то наперсточная права (*infusum digit. purpureæ*) облегчала и даже совсѣмъ уничтожала болѣзненные припадки.

Завалы брюшныхъ внутренностей, простые и сопряженные съ водяною, всѣ были слѣдствіемъ лихорадокъ. Исторія излѣченнаго отъ водяной представлена въ ч. XIII N 1.

Дѣйствіе *pipæris cubebæ* въ застарѣломъ перелѣ (*blennorrhoea*) соотвѣтствовало желанію. Больной принималъ два дни по драхмѣ, а на третій по полторы драхмы на пріемъ,

шесть разъ въ день. Въ частной моей практикѣ средство сіе оказалось также полезнымъ и въ оспромѣ перелоѣ; только приемы его не должны быть менѣе драхмы, 4-6 разъ въ день.

Въ онѣмѣніи лѣваго личнаго нерва (*portio dura*) опѣ ушиба ниже уха, случившагося за чепыре мѣсяца, причемъ пораженныя части удерживали свою чувствительность, пѣвки и смягчающія мази къ поврежденному мѣсту оказали явственную пользу; черпы лица пришли въ правильное состояніе и вѣка начали закрывать лѣвой глазъ; только при разговорѣ и смѣхѣ примѣпно было недоспачное дѣйствіе мышцъ лица лѣвой стороны.

Одного изъ спрадавшихъ падучею выписали мы почти выздоровѣвшимъ, попому что приспуть, прежде возвращавшійся раза по чепыре въ день, а попомъ раза по три въ недѣлю, въ продолженіи трехъ недѣль не появлялся. Таковую перемѣну должно, кажется, приписать хинной соли (*sulph. chinini*). Въ другомъ случаѣ какъ сіе, такъ и многія другія наружныя и внутреннія средства остались почти неѣствительными. Причиною болѣз-

ни въ обоихъ случаяхъ была онанія. Оба больные были не старѣе 18-ти лѣтъ. Уперваго болѣзнь была недавняя, и онъ скоро рѣшился опсшать опъ своего порока, а у послѣдняго и болѣзнь застарѣлая и нравспвенность весьма испорченная.

IV.

О БОЛѢЗНЯХЪ СЕРДЦА, ПРИЧИНЯЕ- МЫХЪ ОНАНИЗМОМЪ.

*Извѣщеніе изъ замѣтаній о семъ предметѣ Доктора
Кримера.*

По мнѣнію Г-на *Кримера*, болѣзни сердца, весьма умножившіяся въ печеніи послѣднихъ двадцати лѣтъ, не всегда происходящъ опъ органическаго измѣненія онаго, но весьма часто суть слѣдствіе пагубнаго приспращія къ онанизму (рукоблудію). Первые припадки сего порока суть: головная боль, великая жоска, препенаніе сердца, обмороки, давленіе и необыкновенная чувспвипельность въ надбрюшной споронѣ. Сіи припадки ожеспочающся по мѣрѣ шого, какъ человекъ болѣе предаешся сей нееспешвенной склонности, и напрошивъ скоро уменьшающся и даже вовсе исчезающъ, если онъ ее оспавляешъ. Для

подтвержденія своего мнѣнія Докторъ *Криеръ* приводитъ многія наблюденія и вычисляетъ слѣдующіе, какъ существеннѣйшіе, признаки таковыхъ спаданій сердца, при должномъ вниманіи къ копорымъ Врачъ удобно можетъ ихъ оплечать опъ другихъ подобныхъ болѣзней.

1. Волосы перяютъ свой естественный лоскъ, примѣтно сохнутъ, часпо на концахъ раздвоивающіяся и легко выпадаютъ въ большемъ количествѣ, особливо на передней части головы. У особъ, спраждающихъ изнуреніемъ или органическою болѣзнію сердца, волосы кажутся пучными и рѣдко выпадаютъ.

2. Глаза сухіе, поникшіе, часпо слезящіе, невыразительные и глубоко впавшіе. Края вѣкъ красные и окруженные голубымъ кругомъ. У чахолпныхъ и одержимыхъ органическою болѣзнію сердца глаза блестящіе и всегда сохраняютъ естественную свою живость и выразишельность. У молодыхъ женщинъ во время приближенія мѣсячнаго очищенія обыкновенно примѣчается голубой кружокъ вокругъ глазъ, но они не перяютъ своей живости и блеска.

3. Подверженные онанизму весьма боязливый и неохотно смотрятъ въ лице другимъ.

4. Они обыкновенно страдаютъ періодическою головою болью, проспирающеюся отъ запылка къ передней части головы.

5. Зрѣніе ослаблено, позывъ на пищу уничтоженъ, языкъ нечистъ; вообще бываетъ присесть небольшой кашель, короткое и шрудное дыханіе, но спраждающій можетъ впрочемъ глубоко вдыхать.

6. Боль, тяжесть и давленіе подъ ложечкою. Спраждающіе органическими болѣзнями сердца иногда имѣютъ сіи припадки, но они не сопровождаются вышесказанными.

7. Чувство усталости и слабости въ членахъ, съ болями въ поясницѣ. Къ сему прибавить должно боль и щемленіе въ яичкахъ, съ непріятнымъ чувствомъ подергиванія сѣменнаго канатика.

8. Испарина имѣетъ непріятный, *сладковатый* запахъ, подобный запаху младенцовъ.

9. Больной всегда приходитъ въ возмущеніе и беспокойство, если онанизмъ дѣлается предметомъ разговора.

10. На послѣдокъ ослабѣваетъ умъ; преданный онанизму дѣлается неспособнымъ къ

душевнымъ и тѣлеснымъ упражненіямъ и
впадаетъ въ нѣкоторое состояніе сонли-
вости.

Lond. Med. Gaz. Vol. 1. No 19.

V.

ОБЪ УПОТРЕБЛЕНІИ РТУТИ ВЪ ВЕ- НЕРИЧЕСКИХЪ БОЛѢЗНЯХЪ.

Г. *Бруетонъ* въ первой книгѣ Лондонской Медицинской газеты говоритъ, что изъ трехъсотъ пятидесяти больныхъ съ язвами мужескаго дѣпороднаго уда, копорыхъ онъ лѣчилъ во впоромъ Гвардейскомъ полковомъ госпицадѣ, сто пятинацать въ различное время принимали ртуть въ различныхъ видахъ и пропорціяхъ, а двѣспи придцать пять были излѣчены другими средспвами, равно какъ и многіе, невключенные въ счелъ, изъ такоаго же числа больныхъ въ печеніи того же времени, около двадцати двухъ, спрадали послѣдспвенными припадками, показавшимися послѣ первоначальной венерической болѢзни. По испоріямъ оказалось, что большаа часпъ изъ нихъ спрадала лишаемъ (*lichen*), копорый унищожался скоро и безъ ртутти. Бóльшее число больныхъ язвами въ

глопкѣ, болями въ соспавахъ и коспяными опухолями (nodi) было первоначально лѣчено въ госпиталѣ ртутью; другіе же показали, что они употребляли оную тайно, по временамъ и при ожесточеніи болѣзни. Простые случаи лишая были преимущественно между шѣми, кои ртутти не употребляли; напротивъ того упорные и продолжительные вспрѣчались у шѣхъ, кои были подвержены вѣдѣйствію. По прекращеніи употребленія ртутти, при лѣченіи первоначальной венерической, не было никакихъ случаевъ, которые возбуждали бы сомнѣніе о неприличномъ лѣченіи, и немногіе примѣры послѣдственныхъ припадковъ были вообще неважны въ сравненіи съ шѣми, кои обнаруживались послѣ ртутнаго лѣченія и легко уступали другимъ средствамъ.

Я не намѣренъ, (продолжаетъ Г. Бругтонъ), рассказывать различныя измѣненія лѣченія, или положить предѣлы между случаями, пребывающими и отвергающими употребленіе ртутти, ниже описывать такіе, кои опъ ртутти могутъ сдѣлаться худшими. По истинѣ, мнѣ неизвѣстны удовлетворительныя правила, которыми бы Врачъ могъ руководствоваться,

вапсья въ семь опношеніи, выключая тѣхъ, кои онъ самъ вывести можетъ изъ здраваго разсужденія и опытности. Я желаю только споспѣшествовать подтвержденію того, что венерическія язвы исцѣляются безъ рпуши, не причиняя припомъ никакого вреда, и что послѣдственныя рпушныя болѣзни гораздо гибельнѣе происходящихъ отъ венерическаго зараженія, причемъ нерѣдко одна болѣзнь принимается за другую. Почему, кажется мнѣ, безопаснѣе обойтись безъ рпуши: ибо во-первыхъ, по сравненіи немного найдется случаевъ, пребующихъ оной; во-вторыхъ, послѣдствія, происходящія отъ употребленія рпуши, многоразличны и ужасны, и на послѣдокъ попому, что изъ многоразличныхъ рпушныхъ припадковъ иногда выводятся ложныя заключенія, что лѣченіе было по крайней мѣрѣ бесполезно, если невредно, котораго дѣйствій никто предвидѣть, ни съ надлежащею точностію опредѣлить не въ состояніи.

Въ моей практикѣ, въ больницѣ для бѣдныхъ, я часто имѣлъ случай замѣтить великій вредъ, происходившій отъ обильнаго употребленія рпуши, наипаче если больной не состоялъ подъ особеннымъ надзоромъ Вра-

•

ча, касательно діеты, температуры и проч. Погрѣшность, въ семъ отношеніи сдѣланная больными язвами мужескаго дѣтороднаго уда, которые припомъ занимаются своими дѣлами и слѣдовательно подвергаются внезапнымъ переменамъ погоды, холоду и влажноти, весьма часто бываетъ ничѣмъ неизгладима. Классъ рабочихъ людей въ Лондонѣ, большею частію неимѣющихъ хорошихъ жизненныхъ продовольствій и нерѣдко съ слабымъ сложеніемъ шѣла, представляетъ ужасные примѣры неблагоразумнаго употребленія ршупи, котораго худыя дѣйствія по причинамъ, онымъ людямъ болѣе извѣстнымъ, нѣкоторые Врачи, особливо въ частной своей практикѣ, охотно приписываютъ венерическому яду, или же недоспащному употребленію ршупи.

Г. Бругтонъ привелъ многіе занимательные случаи для объясненія своихъ предположеній, но ограниченность сей статьи не позволяетъ намъ описать ихъ. Вотъ результаты оныхъ.

1. Всѣ виды, подѣ каковыми только венерическія болѣзни появляются, должны быть уничтожаемы безъ содѣйствія ршупи;

сіе преимущественно важно при послѣдственныхъ припадкахъ болѣзни.

2. Ртуть, какъ прежде употребляли, такъ и теперь еще употребляютъ безъ нужды, дерзко и съ крайнею опасностію.

3. Ртуть, употребляемая съ благоразуміемъ и съ перемѣною, составляетъ превосходное средство во многихъ венерическихъ болѣзняхъ; впрочемъ десятиая только часть того количества, которое прежде употребляли, бываетъ вообще достаточна для излѣченія первоначальныхъ припадковъ, а состоящая часть онаго испребляетъ совершенно послѣдственные припадки болѣзни.

4. Ртуть, въ какомъ бы видѣ или количествѣ употреблена ни была, никакихъ не предотвращаетъ послѣдственныхъ припадковъ.

5. Ртуть, въ излишество употребленная, изъязвляетъ слизь отдѣляющія поверхности, особливо небной занавѣски, глотки и полости зѣва; сверхъ того поражаетъ кости совершенно такъ, какъ истинный венерическій ядъ, и весьма многіе опытныйшіе Врачи никакой разности показать не могутъ. Въ рукахъ послѣдователей древней школы ртуть по справедливости почитается сильнымъ дѣ-

ятельнымъ средствомъ: ибо она производягъ болѣзни, легко смѣшиваемыя съ венерическими и чрезъ то ведутъ къ опасной и гибельной практикѣ.

6. Припадки, оказывающіеся послѣ ршупнаго лѣченія, найдены были жесточайшими и шруднѣйшими къ уничтоженію, нежели обнаруживающіеся послѣ первоначальныхъ венерическихъ язвъ, которыя не были лѣчимы ршупью. Возвратившіеся вторичные припадки удаляются весьма удобно при всякомъ ихъ появленіи, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ ршупь употребляема не была.

7. Хотя ршупь, по особенному своему дѣйствию, почитается наилучшимъ и сильнѣйшимъ средствомъ, производящимъ перемѣну во многочисленныхъ воспаленіяхъ, какъ то: радужной оболочки глаза, печени, плоскихъ кишекъ (dysenteria), въ ревматизмѣ и проч., такъ же весьма сильно прошиводѣйствуетъ воспаленіямъ, происходящимъ отъ венерическаго яда,—но будучи принята внутрь неосторожно, разрушаетъ крѣпость шѣлосложенія, въ нѣкоторыхъ случаяхъ производитъ, а въ другихъ увеличиваетъ болѣзни цѣлаго организма, умножаетъ раздражитель-

ность всей системы, возбуждаетъ воспаленіе, переходящее въ изъязвленіе, усиливаетъ болѣзненное всасываніе части жирной, волокнистой и костяной, способствуетъ накопленію жидкостей между сосавной, бѣлковой и сыворопочной въ полостяхъ, покрытыхъ оболочками, ихъ отдѣляющими, между тѣмъ какъ въ умѣренныхъ приемахъ ршуетъ уничтожаетъ паковыя накопленія.

8. Вредъ, дѣйствіемъ ршуети организму наносимый, по обширности своей въ мягкихъ и твердыхъ частяхъ гораздо ужаснѣе первоначальныхъ и послѣдственныхъ дѣйствій венерическаго яда.

9. Ршуетъ никогда не была специфическимъ средствомъ противъ венерическаго яда: ибо возврата болѣзни всегда встрѣчались при полномъ ея дѣйствіи, и мнѣніе столь долго существовавшее (можно сказать, для поврежденія здравія многихъ чрезъ ршутное слюнотеченіе) о необходимости ршуети въ леченіи, подъ опасеніемъ поперяшь больного отъ неупотребленія оной, есть совершенно ложное и неосновательное. Доказательствомъ сему служатъ многія тысячи здоровыхъ Бришанскихъ воиновъ, которые легко, совершен-

но и постоянно вылечены отъ венерической болѣзни, въ различныхъ ея степеняхъ, не употребляя ниодного рпушного аптома.

Суевѣрная приверженность къ споль ложному и всеобщему мнѣнію, которому самые мудрѣйшіе въ нашемъ званіи слѣпо слѣдовали, будетъ нѣкогда приводима какъ національный упрекъ, и судя по тому, какое до сего времени мнѣніе сіе имѣло вліяніе, опасаться должно, чптобы оно еще болѣе не усилилось и не опровергнуло нашей довѣренности ко всѣмъ медицинскимъ догматамъ и самымъ даже наукамъ.

10. Употребленіе рпуши вовсе неприлично въ нечиспыхъ язвахъ мужескаго дѣшпороднаго уда, коимъ предшеспвуеетъ сильное воспаление и опухоль спраждущей часпши, съ лихорадкою: ибо она, ожеспчоя мѣспные припадки, усиливаетъ общее раздраженіе; слѣдовательно рпушь не годится для лѣченія въ такихъ случаяхъ, гдѣ специфическая зараза уничтожается дѣйспвіемъ сильного воспаления, котораго печеніе быспрѣ разрушающей силы или другихъ какихъ либо ередспвъ, кромѣ шѣхъ, кои непосредспвен-

но и прямо дѣйствуютъ на опасные при-
падки *).

*) Автору случилось замѣпить два явственные примѣра разстроена мужескаго дѣтороднаго уда, въ одномъ случаѣ совершеннаго, а въ другомъ несовершеннаго, въ слѣдствіе употребленія ршупи въ нечистыхъ язвахъ уда, оставшихся послѣ воспаления съ лихорадкою.

VI.

С М Ъ С Ъ.

1. Хлориновая известь противъ заразы.

Г. Доккеръ, Врачъ корабля *Виндзоръ-Кастль*, принадлежащаго Остъ-Индской Компаніи, въ прошломъ году рапортовалъ о весьма важномъ и дѣйствительномъ средствѣ, а именно: о дѣйствіи *хлориновой извести* для уничтоженія вредоносныхъ испареній между деками корабля. Когда корабль сей приближался къ пропикамъ, то онъ приказалъ опрыскивать шлюзъ (horlordeck) растворомъ хлориновой извести, два раза въ недѣлю; опъ сего видѣлъ онъ совершенный успѣхъ, состоявшій въ томъ, что непріятный запахъ, существующій всегда, когда много людей спѣснено въ одномъ мѣстѣ и гдѣ нѣтъ свободного кругообращенія воздуха, шлочасъ пре-

кращался. Г. Доккеръ преимущественно вліянію хлориновой извести приписываетъ совершенное здоровье всего экипажа и пассажировъ во все время плаванія.

Но наиболѣе всего заслуживаетъ теперь наше вниманіе нижеслѣдующее присовокупленное имъ обстоятельство. Во время споянія на рейдѣ у острова Sangur при успѣхъ Гангеса пушечный декъ регулярно каждый день поутру и ввечеру опрыскиваемъ былъ растворомъ хлориновой извести. Слѣдствиемъ сего было совершенное избѣжаніе холеры, причинявшей великое опустошеніе на другихъ корабляхъ. Во все это время вѣтеръ дулъ съ берега (съ земли) и былъ напишанъ болѣзнетворною міазмою. Такимъ же образомъ употреблялъ онъ хлориную известь, бывши въ Кишаѣ (въ Канпонѣ), и спасъ весь экипажъ корабля отъ кроваваго поноса, свирѣпствовавшаго въ то время на всѣхъ другихъ корабляхъ, споявшихъ на рѣкѣ Тигрѣ (Тіумсѣ). Г. Доккеръ нашелъ сей растворъ неисчислимо полезнымъ, уничтожая помощію онаго поспѣшъ гнилый и непріятный запахъ, обыкновенно произраждающійся въ мѣсплахъ, гдѣ лежатъ больные. Равнымъ обра-

зомъ испыталъ онъ дѣйствительность распвора въ видѣ полосканья (gargarisma) для остановленія рпуупнаго слюнопеченія и подтвердилъ, что намъ извѣстно уже, что хлориновая извесль останавливаетъ распротпрание анпонова огня.

Вышесказаннымъ доказывается, что Воспочная ходера происходитъ отъ особой специфической мiazмы, копорая первоначально развивается изъ земли, ея продуктовъ или живущихъ на ней живописныхъ и расписельныхъ существъ, посредствомъ химическаго анализа неизъяснимыхъ апомовъ.

Medico-Chirurgical Review. Oct. 1829.

2. *Лѣчение венерической болѣзни безъ ртути.*

Г. Фриккъ лѣчитъ венерическія болѣзни въ Гамбургскомъ госпиталѣ слѣдующимъ способомъ: 1-е. Всякому больному пускаютъ крови отъ шести до двенадцати унцій, что по надобности повпоряется. Потомъ каждые при часа дается по полдрахмъ сѣрноислой магнезіи, до тѣхъ поръ, пока воспослѣдуютъ повпоренныя испражненія низомъ. Ежели послѣ того окажется запоръ, или язвы излѣчиваются медленно, то употребленіе того же

средства возобновляется. 2-е. Для язвъ снаружи употребляется Гулардова вода, или же растворъ двухъ гранъ сѣрнокислаго цинка въ шести унціяхъ перегнанной воды. Если величина язвы значительно уменьшилась и больше не болитъ, то прикладывается извѣстковая вода. Когда какая нибудь изъ сихъ примочекъ причиняетъ боль или воспаленіе, то должно ихъ побольше развести водою. Паховики сначала прижимаются; но если разрывленіе не воспослѣдуетъ, вскрываются бистурею и покрываются сухою корпѣю; бородавчатые наросты срѣзываются ножомъ; или прижигаются; и для раны употребляется та самая примочка, какая и для язвъ. 3-е. Больные соблюдаютъ весьма строгую діету, употребляя только два раза въ день определенное количество растительныхъ веществъ, хлѣба и водяного супа (*soupe à l'eau*). 4-е. Ежедневно въ теченіи нѣсколькихъ дней припадки не облегаются, то даются немногіе приемы рпути, въ малыхъ количествахъ, которые оказываются достаточными для окончанія лѣченія.

Полученные при семъ способѣ лѣченія результаты весьма удовлетворительны. Язвы и паховики излѣчаются скоро и рубцы не

такъ примѣнны, какъ послѣ употребленія ртутни. У женщинъ язвы, отъ трехъ до чепырехъ линій въ діаметрѣ, исцѣляются въ одну или при недѣли; у мужчинъ напротивъ того лѣчение пребуеетъ больше времени. Г. Фрихъ, имѣвшій случай удержанъ больныхъ, симъ способомъ вылѣченныхъ, подъ своимъ наблюденіемъ до сего времени, не замѣтилъ никакихъ послѣдственныхъ припадковъ.

Gräfe und Walther's Journ. der Chirurgie.

3. Лѣченіе почти совсѣмъ запертаго дыхательнаго горла.

Е. Освальдъ, 27-ми лѣтъ, въ Септябрѣ 1826, желая лишиться себя жизни, разрѣзала себя горшанъ, раздѣливъ ligamentum crico-tyreoideum. Она была лѣчена нѣсколько мѣсяцовъ и наконецъ опущена безгласною, а дыханіе совершалось посредствомъ серебряной трубки, вложенной въ рану, ею сдѣланную. При изслѣдованіи часшей оказалось, что къ горпанной щели шло только малое отверстие, едва пропускавшее зондъ въ половину толщины прошивъ обыкновеннаго.

Г. Листонъ, увидѣвшій больную въ Апрѣлѣ 1827, началъ вкладывать въ часть дыхательнаго горла, находившуюся выше раны, врачебныя свѣчки, величиною въ обыкновенную булавку (Stopfnadel), и попомъ поспешенно побольше, такъ что въ Юнѣ пространство канала сдѣлалось естественнымъ. Около половины Августа и нижняя часть дыхательнаго горла помощію трубочки поспешенно расширена. Послѣ сего проведена чрезъ рану въ ротъ трубка, длиною въ девять дюймовъ, а толщиною въ самый большой зондъ, употребляемый для пищепріемнаго горла (Schlundsonde), нижній же конецъ трубки опущенъ въ дыхательное горло, внизъ. Это причинило жестокій кашель, продолжавшійся около полчасъ. Трубка оспавалась въ такомъ положеніи двѣ недѣли и возбудила сильное слюнопеченіе, зубы начали шатаваться и силы больной весьма ослабли. Для закрѣпленія раны края оной окровавлены двумя эллиптическими нарѣзами и соединены швомъ. На пятнадцатый день, по вынутіи трубки, больная дышала хорошо, но на другой день дыханіе сдѣлалось столь труднымъ, что нужно было вскрыть дыхательное горло и вложить се-

ребрянную прубочку, которая чрезъ пять дней замѣнена понышею.

На 25-й день края оставшейся небольшой рашелины прожжены желѣзомъ, что было повторено и въ 26-й день, и отверстіе почти совсѣмъ закрылось. На 28-й день прубка вынята и чрезъ нѣсколько дней рана зажила. Теперь женщина сія дышетъ чрезъ горшанъ, дыханіе поспепенно дѣлается легче и голосъ возстановляется.

Hamburg. Magaz. der Heilkunde. 1829.
Januar, Februar, стр. 130.

4. Способъ лѣчить опухоль яичекъ.

При опухоли яичекъ, воспослѣдовавшей отъ перелоа, *Ларей* великъ легко сжимать ее кускомъ фланели, омоченной въ камфорно-ромашковое масло, въ тоже время вкладывать въ мочеиспускательный каналъ маленькую врачебную свѣчку, омоченную растворомъ опія и оставлять тамъ ее на нѣсколько времени. Внутрь прописывается легкое рвотное. Симъ способомъ, по увѣренію *Ларей*, опухоль уничтожается какъ бы чрезъ очарованіе. Лѣченіе пиявками весьма продолжительно, и послѣ него часто слѣдуетъ водяная яичекъ.

Тамъ же, стр. 135.

5. *Каменистые наросты на мощонкѣ.*

Профессоръ *Моттѣ* вырѣзалъ у 73-хъ лѣшняго спарика мощонку, висѣвшую до колѣнъ и усѣянную множеспвомъ камениспныхъ опухолей, величиною опъ горошины до мускапнаго орѣха. Внутри опухоли находились паковыя же сращенія. Яичка были здоровы и послѣ операціи образовалась новая мощонка.

Причина болѣзни неизвѣспна; она продолжалась болѣе двадцати лѣтъ.

Тамъ же, стр. 136.

6. *Къ Патологіи столбняка.*

Въ прупѣ 44-хъ лѣспней прачки, умершей на 5-й день опъ сполбняка (*tetanus*), найдена передняя часпъ спиннаго мозга значиспльно измѣненной, а задняя и сѣрое сущеспво онаго совершенно здоровыми. Душевные способноспи и чувспвсптельность кожи въ продолженіи болѣзни оспались неповрежденными. Причиною болѣзни была проспуда.

Случай сей подшверждаетъ мнѣніе, что сполбнякъ зависптъ опъ воспаления спиннаго мозга (См. В. М. Ж. ч. XIII. стр. 425.), равно какъ и то, что передняя часпъ спа-

новой жилы служишь движенію, а задняя чувствительности (см. В. М. Ж. ч. XII. стр. 207, 230).

Тотъ же Magazin, März, April, стр. 364.

7. Табакъ противъ перепончатой жабы.

Въ первомъ и впоромъ періодъ сей опасной болѣзни сказанное средство, по увѣренію *Годмана*, оказалось весьма дѣйствительнымъ. Порошокъ Шопландскаго нюхательнаго табаку посыпается на пластырь и прикладывается къ груди дыяпи. *Годману* сообщилъ сіе средство Докторъ *Вандербургъ*, въ Нью-Йоркѣ, гдѣ и Докт. *Пендлетонъ* употреблялъ сей табакъ съ хорошимъ успѣхомъ, а другіе сорпы табаку оспались недѣйствительными. Средство сіе не производитъ никакихъ непріятныхъ припадковъ.

Тамъ же, стр. 366.

8. Лѣченіе нѣкоторыхъ болѣзней членосоединеній.

При недвижимости членосоединеній, зависящей отъ болѣзней мягкихъ частей, окружающихъ составъ, Докторъ *Джиделла* (Gidhella) совѣтуесть дѣлать вокругъ оныхъ

много насѣчекъ. Онѣ должны быть большія, глубокія, въ разномъ направленіи, и полезны напаче въ тѣхъ случаяхъ, когда связки сократились и ополстѣлы, сухія жилы окрѣпли и покровы сморщены. Насѣчки надобно повпорять. Въ доказательство сказаннаго Д. Джиделла приводитъ нѣсколько примѣровъ, изъ коихъ въ первомъ симъ способомъ излѣчена неподвижность нижней челюсти, остававшаяся послѣ воспаленія окололежащихъ часпей; во второмъ, неподвижность первыхъ двухъ шейныхъ позвонковъ, въ слѣдствіе сильнаго напряженія при ношеніи тяжесшей; въ третьемъ, послѣ ртутнаго лѣченія упорной венерической, болѣзнь занимала плечевой суставъ; въ четвертомъ, послѣ раненія, локтевой суставъ (въ разное время сдѣлано было болѣе ста насѣчекъ и сверхъ того употреблена выпягивающая машина); въ пятомъ, спрадалъ суставъ правой руки послѣ перелома (около 200 насѣчекъ); въ шестомъ, поже и опъ такой же причины; въ седьмомъ, неподвижность находилась въ коленномъ суставѣ, съ похудѣніемъ голени, и произошла опъ бродящаго ревматизма (разрѣзы проспирались въ самую связку надко-

*

лѣнной кости и въ сухія жилы разгибающихъ мышцъ); въ осьмомъ спрадалъ составъ ноги, въ слѣдствіе вывиха (разрѣзы также проспирались въ связки и даже въ Ахиллесову сухую жилу). Всѣ сіи болѣзни были болѣе или менѣе застарѣлыя и напередъ шоголѣчены разными средствами; помощію насѣчекъ нѣкоторыя совершенно излѣчены, другія же значительно облегчены.

Г. Джиделла сверхъ того замѣчаетъ, что даже при неподвижности членовъ (anchylosis) отъ сращенія членосоставныхъ хрящей насѣчки уничтожаютъ шяную, какъ бы судорожную боль, причиняемую напряженіемъ мягкихъ частей.

Тамъ же, стр. 380.

VII.

О ВНОВЬ ВЫШЕДШИХЪ КНИГАХЪ.

1. *Новѣйшія открытія, наблюденія и опыты Врачей, сдѣланные въ Практической Врачебной Наукѣ въ послѣднее двадцатилѣтіе.* Частъ первая, заключающая въ себѣ Фармакографію, или Химико-Врачебныя предписанія приготовленія и употребленія новѣйшихъ лѣкарствъ. Издано Александромъ Нелюбинымъ, Докторомъ Медицины, Ординарнымъ Профессоромъ при Императорской Медико-Хирургической Академіи, Членомъ Медицинскаго Совѣта и проч. С. П. Б. 1830, въ 8. д. л. 734 стр.

Благосклонное принятіе просвѣщенной публикою перваго изданія Фармакографіи и особенное вниманіе опечиственныхъ Врачей къ сей книгѣ, скорая раскупка оной и новыя шребованія побудили Сочинителя при-

спуститъ ко второму, вновь разсмотрѣнному, исправленному и умноженному изданію сего сочиненія. Желая, по возможности, сдѣлать оное достойнымъ вниманія практическихъ Врачей, Г. Нелюбинъ рѣшился собрать воедино все нужное и любопытное по сему предмету и издать сочиненіе подъ названіемъ: *Новѣйшія открытія, наблюденія и опыты Врачей, сдѣланные въ Практической Врачебной Наукѣ въ послѣднее двадцатилѣтіе*. Первая часть сего сочиненія заключаетъ въ себѣ Фармакографію или Химико-Врачебныя предписанія приготовленія и употребленія новѣйшихъ лѣкарствъ. Вторая часть будетъ содержать въ себѣ изложеніе новѣйшихъ системъ Врачебной Науки, какъ по: ученія *Разори, Бруссе и Ганемана*, и подробное описаніе врачебныхъ средствъ, какъ простыхъ, такъ и сложныхъ, въ послѣднее время открытыхъ и во врачебное употребленіе введенныхъ. Это второе отдѣленіе сего сочиненія, содержащее въ себѣ описаніе болѣе ста новѣйшихъ врачебныхъ средствъ, въ непродолжительномъ времени поступитъ въ печать, если сему болѣзнь Сочинителя не воспрепятствуетъ.

При составленіи сего новаго изданія Фармакографіи пользовался Г. *Нелюбинъ*, такъ какъ и при первомъ, почти всѣми извѣстнѣйшими періодическими иноспранными сочиненіями, нѣкоторыми монографіями, въ особенностии же сочиненіями *Рихтера*, *Мажанди*, *Дирбаха* и многими другими. Подробный обзоръ сей книги, при первомъ ея изданіи, сообщенъ былъ въ No 2-мъ часпи IX сего Журнала, 1827 года. Главный планъ и порядокъ сочиненія удержаны Г-мъ *Нелюбинымъ* и при семъ изданіи. Вновь прибавлено слѣдующее: 1) въ спашѣ объ *іодинѣ* умножено число болѣзней, въ коихъ сіе средство дается. 2) Солянокислый цинкъ оспавляетъ новую, довольно подробно изложенную и любопытную спашню. 3) При *синильной кислотѣ* приведено большее прошивъ прежняго число болѣзней. 4) Прибавлены вновь: *Oleum amygdal.*, *farina amygdalar.* *amara gum.* 5) *Пиротонидъ*, спашья новая, заключающая въ себѣ изложеніе средства, въ послѣднее время введеннаго въ употребленіе въ болѣзняхъ глазъ и дыхательныхъ орудій. 6) *Bicarbonas potassæ et sodæ*, новая, довольно обширная спашья, съ присоединеніемъ многихъ рецептовъ.

шовъ и съ показаніемъ вкратцѣ способа пригото-
 вляющъ *ex tempore* искусственныя ще-
 лочныя минеральныя воды. 7) Къ списку о
хининѣ и *цинхонинѣ* прибавлены новыя пра-
 ктическія наблюденія, касательно способа
 употребленія сихъ средствъ и успѣшнаго из-
 лѣченія ими перемежающихся лихорадокъ.
 Здѣсь также помѣщены многіе новѣйшіе спо-
 собы приготовленія хинина. 8) *Хиниодинъ*,
 снѣдь новая, въ коей описанъ прерпій но-
 вый алкалоидъ хины, весьма достопримѣчатель-
 ный по своему опмѣнному дѣйствію въ переме-
 жающихся лихорадкахъ. 9) Въ списку *мор-*
фія и *наркотики* умножено число болѣзней.
 10) Тоже замѣтимъ и о списку *лактока-*
рій; сверхъ сего здѣсь присоединено нѣсколь-
 ко новыхъ врачебныхъ предписаній. 11) Из-
 ложень новый способъ приготовленія *Olei fi-*
licis maris, съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ
 формъ препаратовъ сего средства. 12) Но-
 вые способы приготовленія *хлористой изве-*
сти. 13) При *хлористой содѣ* умножено чис-
 ло болѣзней и приведены рецепты слож-
 ныхъ лѣкарствъ сего средства. Изъ нихъ за-
 служиваетъ наипаче вниманіе умыванье для
 лица; онымъ сводятся веснушки, загарь и

многія сыпи, нерѣдко обезображивающія лица прекраснаго пола. Къ двумъ послѣднимъ средствамъ присоединилъ Авпоръ, въ видѣ прибавленія, примѣчательную спашью о предохранительныхъ мѣрахъ противъ чумы, холеры и другихъ прилипчивыхъ болѣзней. 14) въ спашѣ *объ экстрактахъ* сдѣлано прибавленіе, относительно ихъ приготовленія.

Въ семъ новомъ изданіи Фармакографіи Г-на *Нелюбина* предметы изложены съ такою же ясностію, точностію и подробностію, какъ и въ первомъ. Редакція В. М. Ж. и теперь, какъ и прежде, вмѣняетъ себѣ въ обязанную обязанность замѣтить, что трудъ Г-на *Нелюбина* имѣетъ полное право на признательность опечетственныхъ Врачей и Аптекарей. Тѣмъ же замѣчаніемъ, какое сдѣлано было нами при первомъ появленіи сей книги, оканчиваемъ и сей второй обзоръ: совѣтуемъ читателямъ не быть слишкомъ поспѣшными при употребленіи новыхъ средствъ, внимательно читать и съ точностію соблюдать изложенныя Г-мъ *Нелюбинымъ* правила, относительно приготовленія и назначенія больнымъ означенныхъ средствъ; это, надѣмся, обратитъ какъ самыя недоразу-

мѣнія, такъ и тѣ грубыя ошибки, кои, вѣроятно, были причиною поселившагося въ нѣкоторыхъ изъ просвѣщенныхъ Врачей предубѣжденія къ симъ средствамъ.

Сочиненіе сіе продается въ С. Петербургѣ, въ книжномъ магазинѣ *Александра Филиповита Смирдина*, близъ Синяго моста, а въ Москвѣ у книгопродавца *Ширлева*. Цѣна экземпляру 15 рублей, съ доставленіемъ во всѣ города Россійской Имперіи.

2. *Systema pharmacodynamicum, exhibitis insimul Nomenclaturâ pharmacum emendata, chemico-technica et Doseographiâ, Auctore Paulo Horaninow, Doct. Med., Imperatoriae Med. Chir. Academiae Professore Adj. etc. Petropoli. 1829. pag. 151. in 12^o.*

Правильная и къ практическому употребленію способная система облегчаетъ вообще изученіе Науки, сближая сходные между собою предметы. Многіе писатели занимались систематическимъ расположеніемъ медицинскихъ средствъ; но, сколько извѣстно, никто еще удовлетворительно не разрѣшилъ сей задачи. Доспигъ ли Авторъ желаемой цѣли, или, по крайней мѣрѣ, приблизился ли

къ оной, пусть судить о семъ ученая Медицинская Публика.

Въ вышеозначенной книгѣ раздѣлены всѣ врачебныя средства на *три* класса, копорые основаны на *преимущественнои* дѣйствіи лѣкарствъ на распительную, раздражительную или чувствительную системы, исключивъ холодъ, теплоу, минеральныя воды и нѣкоторыя другія, разсмаприваемыя въ особой спашѣ. Въ предисловіи объяснено подробнѣе основаніе сей системы, въ чемъ Авторъ подражаетъ знаменитому Фармакологу *Фосту*. Предлагаемая Номенклатура лѣкарствъ, по своей простотѣ и нѣкоторому согласію съ древними названіями, заслуживаетъ также вниманіе Врачей, копорымъ сія карманная книга доставитъ и шу пользу, что въ ней означены всѣ, болѣе или менѣе употребительныя, препараты лѣкарствъ и приемы (*dosis*) оныхъ. Цѣна экземпляру 3 рубля.

3. *Начальныя основанія Ботаники*, изданныя для преподаванія въ Императорской Медико-Хирургической Академіи имъ же *Горяиновымъ*. С. Петербургъ. 1827. въ 8, 338 стр. съ 12-ю гравированными таблицами.

Книга сія заключаєть въ себѣ: во 1-хъ, краткое описаніе внутренняго строенія произрастаемыхъ и Терминологию, сообразную новѣйшему состоянію сей науки; во 2-хъ, описаніе новѣйшихъ и употребительнѣйшихъ системъ, какъ то: *Линнея, Жюсье, Декандоля, Окена* и проч.; въ 3-хъ, Фигурографию или правила описыванія растений, Листовую Ботанику и описаніе 12-ти таблицъ, служащихъ къ поясненію Терминологіи. Цѣна экземпляру 5 рублей.

Можно получать сіи книги, адресуясь на имя Сочинителя *Павла Федоровича Горькина*, или въ Хозяйственное Правленіе Императорской Медико-Хирургической Академіи, въ С. Петербургѣ. Для пересылки прилагается въсовыхъ на первую книгу за фунтъ, на Ботанику же за два фунта.

VIII.

**ОФФИЦІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ СЪ 1-ГО
НОВАБРЯ 1829 ПО 1-Е ГЕНВАРЯ 1830
ГОДА.**

**1. *Опредѣленіе Медицинскихъ Чиновниковъ
на высшій лѣста.***

*Корпусными Штабъ-Докторами: въ Оп-
дѣльный Кавказскій Корпусъ Исправляющій
сію должность Дивизіонный Докторъ 21-й
пѣхотной Дивизіи Штабъ-Лѣкаръ Коллеж-
скій Совѣтникъ Ильяшенко, во 2-й пѣхот-
ный Корпусъ Дивизіонный Докторъ 2-го Ре-
зервнаго поселеннаго Кавалерійскаго Корпуса
Коллежскій Совѣтникъ Байцуровъ. Стар-
шими Докторами Гвардейской Кавалеріи пол-
ковый Штабъ-Лѣкаръ Кавалергардскаго полка
Коллежскій Совѣтникъ Погоржанскій. Стар-
шими Лѣкарями: Лейбъ-Гвардіи въ Гроднен-*

скій Гусарскій полкъ Штабъ-Лѣкаръ Лейбъ-Гвардіи пѣшей Артиллеріи батарейной No 5-го роты Рейхъ, въ Подольскій пѣхотный полкъ Штабъ-Лѣкаръ онаго же полка Бейеръ, въ Тульчинскій военный госпиталь Лейбъ-Гвардіи Сапернаго баталіона Штабъ-Лѣкаръ Гильдебрандтъ, въ Выборгскій пѣхотный полкъ Медико-Хирургъ Пелпровскаго пѣхотнаго полка Гриневскій, въ Нейшлотскій пѣхотный полкъ Штабъ-Лѣкаръ 45-го Егерьскаго полка Герцъ, въ 46-й Егерьскій полкъ Штабъ-Лѣкаръ онаго полка Гаузенъ, въ Олыкскій военный госпиталь Штабъ - Лѣкаръ Конно-Артиллерійской No 29-го роты Надворный Совѣтникъ Грабовскій.

2. Вновь поступившіе въ службу.

Изъ Московскаго Отдѣленія Императорской Медико-Хирургической Академіи Лѣкаръ 1-го отдѣленія Михайло Марцинкевичъ въ Лубенскій Гусарскій полкъ. Изъ Дерптскаго Университета Лѣкаръ 3-го отдѣленія Августъ Клиндеръ въ Ревельскій военный госпиталь Ординапоровъ, сверхъ комплекта. Изъ Московскаго Университета Лѣкари: 1-го отдѣленія Сергѣй Волковъ въ 3-й ба-

паліонъ Московскаго пѣхопнаго полка, Ѳе-
 доръ Виноградскій въ 4-й Украинскій, Васи-
 лій Шумовъ въ 4-й Бугскій Уланскій, Ѳе-
 доръ Казанскій въ Орденскій Кирасирскій пол-
 ки *Младшими Лѣкарями*; Викторъ Юноникъ
 въ резервный 3-й баталіонъ Сибирскаго пѣхоп-
 наго полка, Иванъ Соловьевъ въ плаховый
 же баталіонъ пѣхопнаго Графа Дибича - За-
 балканскаго полка; 2-го отдѣленія Антонъ
 Лобачевскій въ 3-й баталіонъ Нижегородска-
 го пѣхопнаго полка, Михайло Дмиріевъ
 въ резервный 3-й баталіонъ пѣхопнаго Ге-
 нераль-Фельдмаршала Графа фонъ деръ Ос-
 тенъ-Сакена полка, Ѳеодоръ Соловьевъ, Иванъ
 Залуговскій, Козьма Родкевичъ въ резервныя
 войска, находящіяся въ составѣ 2-й арміи,
 сверхъ комплекта. *Изъ Виленскаго Универ-*
ситета Лѣкари: 2-го отдѣленія Иванъ Гром-
 ницкій въ Вознесенскій военный госпиталь
 Ординапоровъ, 3-го отдѣленія Иванъ Ириц-
 пуховъ въ Моздокскій Козачій полкъ, Павелъ
 Лейковскій и Семень Беръ во 2-ю армію
 сверхъ комплекта; Ветеринарные Лѣкари:
 Ромуальдъ Максъ въ Тверскій Драгунскій
 полкъ, Клементій Родкевичъ въ Ингерман-
 ландскій Гусарскій полкъ, Михайло Мицке-

вичь въ 1-ю поселенную Гренадерскую Дивизию, Константинъ Василевскій въ Нарвскій Гусарскій полкъ. *Изъ Гражданскаго вѣдомства:* Лѣкаръ 12-го класса Андрей Стефани въ Кіевскій военный госпиталь Ординашпоромъ. *Изъ отставныхъ:* Шпабъ-Лѣкаръ Макаръ Кобыляцкій въ 35-й Егерскій полкъ, Шпабъ-Лѣкаръ Іосифъ Фишеръ Лейбъ-Гвардіи въ пѣшую Артиллерійскую батарею № 5-го роту, Медико-Хирургъ Спашскій Совѣшникъ Иванъ Аргагольдтъ въ Казанскій военный госпиталь Ординашпоромъ, Шпабъ - Лѣкаръ Іосифъ Форшперъ въ Тираспольскій военный госпиталь Ординашпоромъ. *Изъ Вольнопрактикующихъ:* Лѣкаръ 1-го отдѣленія Александръ Селю въ Бѣлевскій пѣхотный полкъ, Михайло Бѣлицкій въ Конно-Артиллерійскую № 19-го роту и признанный *зѣвишею Императорскою Медико-Хирургическою Академіею* Веперинарнымъ Лѣкаремъ Луизій Демарни Лейбъ-Гвардіи въ Конно - Піонерный Эскадронъ.

3. Увольненіе отъ службы.

Спаршіе Веперинарные Лѣкари: Лейбъ-Гвардіи Гусарскаго полка Молдавановъ и 1-й

поселенной Гренадерской Дивизіи Боярскій, Старшій Лѣкаръ 34 - го Егерьскаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Геннинбергъ, Старшій Лѣкаръ Бѣлевскаго пѣхотнаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Левицкій; а Ординапоръ госпиталя Гренадерскаго Его Величества Короля Прусскаго полка Шпабъ-Лѣкаръ Поремскій и Шпабъ-Лѣкаръ 13-го Егерьскаго полка Коллежскій Ассесоръ Баршанскій перемѣщены въ Морское вѣдомство.

4. Производство въ чужья званія.

Въ Доктора Медицины: Младшій Лѣкаръ 47-го Егерьскаго полка Ходоровскій и Лѣкаръ Лейбъ-Гвардіи Волынскаго полка Боршкевичъ; *въ Штабъ-Лѣкари* Лѣкари: Лейбъ-Гвардіи Финляндскаго полка Обломіевскій, 4-го Піонернаго баталіона Христіановъ, Ординапоръ Браиловскаго военновременнаго госпиталя Мазовіусъ, 3-го баталіона Якутскаго пѣхотнаго полка Сахаровъ, Лейбъ-Гвардіи Уланскаго полка Рудневъ, 1-го Піонернаго баталіона Капустинъ, Эриванскаго Карабинернаго полка Дмишріевъ, Олонецкаго пѣхотнаго полка Рудневъ, 18-й Артиллерійской Бригады Дерпевъ, Энисейскихъ Есапныхъ командъ Графъ,

Арзамасскаго Конно-Егерскаго полка Тростянской; *въ Ветеринарные Лѣкари Ветеринарные Помощники*: Лейбъ-Гвардіи Гродненскаго Гусарскаго полка Шамлевичъ и Ингерманландскаго Гусарскаго полка Сервидовичъ.

5. Награды.

За отлично-усердную службу Всемилостивѣйше награждены *чинами*: *Коллежскаго Совѣтника* Исправляющій должность Дивизионнаго Доктора 7-й пѣхотной Дивизіи Штабъ-Лѣкаръ 7-й Артиллерійской Бригады Надворный Совѣтникъ Гласовъ; *Коллежскаго Ассесора*: Старшій Лѣкаръ Невскаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкаръ Кричевскій, Штабъ-Лѣкаръ Конно-Артиллерійской Но 3-го роты Сорокинъ, Штабъ-Лѣкаръ 3-го Піонернаго баталіона Солнцевъ, Старшій Лѣкаръ С. Петербургскаго Уланскаго полка Штабъ-Лѣкаръ Скуба, Симбирскаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкаръ Никифоренко, Вятскаго пѣхотнаго полка Штабъ - Лѣкаръ Смирновъ, Пермскаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкаръ Жуковъ, Штабъ-Лѣкаръ 19-й Артиллерійской Бригады Трешицевъ, Ординапоръ Ясскаго военновременнаго госпиталѣ Докторъ Медицины Церць, Старшій Лѣкаръ Черноводскаго

военновременнаго госпиталѣ Шпабъ-Лѣкаръ Гольцеймеръ, Старшій Лѣкаръ Бальчикскаго военновременнаго госпиталѣ Медико-Хирургъ Райскій, Старшій Лѣкаръ Базарджикскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ-Лѣкаръ Шрейберъ, состоящій при подвижномъ госпиталѣ при главной квартирѣ 2-й арміи Шпабъ-Лѣкаръ Леконпъ. *Орденами: Св. Владимира 3-й степени, Начальникъ Опдѣленія Медицинскаго Департамента Военнаго Министертва Докторъ Медицины и Хирургіи Спашскій Совѣтникъ Сушинскій; того же ордена 4-й степени: Старшій Лѣкаръ Гусарскаго Эрцъ-Герцога Фердинанда полка Шпабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Топачевъ; Св. Анны 2-й степени, Императорскою Короною украшеннымъ, Корпусный Шпабъ-Докторъ 2-го пѣхотнаго Корпуса Спашскій Совѣтникъ Холодовичъ; той же степени безъ Императорской Короны: Шпабъ-Лѣкаръ 13-го Егерскаго полка Коллежскій Ассесоръ Баршашскій, Дивизионный Докторъ 4-й пѣхотной Дивизіи Надворный Совѣтникъ Лехлеръ; 3-й степени: Шпабъ-Лѣкаръ Иркутскаго Гусарскаго полка Надворный Совѣтникъ Шорпманъ, Старшій Лѣкаръ Елисаветъ-*

✱

градскаго Гусарскаго полка Штабъ-Лѣкаръ
 Агафоновъ, Старшій Лѣкаръ 8-го Егерскаго
 полка Штабъ-Лѣкаръ Гепопановъ, Штабъ-
 Лѣкаръ Ладожскаго пѣхотнаго полка Фило-
 новъ, Старшій Лѣкаръ Копорскаго пѣхотнаго
 полка Штабъ-Лѣкаръ Болковскій, Старшій
 Лѣкаръ 11-го Егерскаго полка Штабъ-Лѣ-
 каръ Веспенгольцъ. *Денежными награжде-
 ніями* единовременно: 1200 р. Дивизионный
 Докторъ 4-й пѣхотной Дивизіи Коллежскій
 Совѣтникъ Карадулевъ, 900 р. Старшій Лѣ-
 каръ Олонецкаго пѣхотнаго полка Штабъ-
 Лѣкаръ Надворный Совѣтникъ Терновскій и
 700 р. Штабъ-Лѣкаръ Шлиссельбургскаго пѣ-
 хотнаго полка Маевскій. *Подарками*: Полевый
 Генералъ-Штабъ-Докторъ 2-й арміи Дѣйстви-
 тельный Спальскій Совѣтникъ Вишнь, Гу-
 сарскаго Эрцъ - Герцога Фердинанда полка
 Штабъ-Лѣкаръ Лебедевичъ-Драевскій, Млад-
 шій Лѣкаръ Павлоградскаго Гусарскаго полка
 Григорьевъ, Старшій Лѣкаръ Архангелого-
 родскаго пѣхотнаго полка Штабъ-Лѣкаръ
 Шпаркъ, Младшій Лѣкаръ онаго же полка Свіа-
 зевъ, Младшій Лѣкаръ Коспромскаго пѣхот-
 наго полка Гржималло, Младшій Лѣкаръ Га-
 лицкаго пѣхотнаго полка Сокольскій, Старшій

Лѣкаръ 7-го Егерскаго полка Штабъ-Лѣкаръ Боровскій, Младшій Лѣкаръ Бѣлозерскаго пѣхотнаго полка Рудневъ, Младшій Лѣкаръ Невскаго пѣхотнаго полка Кашевскій, Штабъ-Лѣкаръ 4-й Артиллерійской Бригады Бѣлинскій и Младшій Лѣкаръ 6-й Артиллерійской Бригады Карловичъ. За выслугу лѣтъ Всемилошпивѣйше пожалованъ пансіонъ Дивизионному Доктору 5-го Резервнаго Кавалерійскаго Корпуса Штабъ-Лѣкарю Коллежскому Совѣшнику Шольцу по 600 р. въ годъ.

6. Умершіе.

Ординапоръ Айдосскаго военновременнаго госпиталѣя иноснранный Докторъ Медицины Швердтъ, Ординапоръ Анхіольскаго военновременнаго госпиталѣя Лѣкаръ Успенскій, Лѣкаръ 3-го баталіона 38-го Егерскаго полка Труневъ, состоявшій въ Опдѣльномъ Кавказскомъ Корпусѣ сверхъ комплекта Лѣкаръ Михайло Шумовъ, Штабъ-Лѣкаръ 22-го Егерскаго полка Кедровъ, Ординапоръ Казанскаго военнаго госпиталѣя Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Совѣшникъ Тимоновъ, Штабъ-Лѣкаръ 13-й Артиллерійской Бригады Бухаревъ, Ординапоръ Браиловскаго военновременнаго

госпиталя Лѣкаръ Вознесенскій, Ординаторъ Базарджикскаго военновременнаго госпиталя Лѣкаръ Кандидовъ, Ординаторы Бургасскаго военновременнаго госпиталя Лѣкари Поспѣловъ и Коропневъ, Лѣкаръ 5-й Кавалерійской Бригады Куцевичъ, состоявшій при Резервной Бригадѣ 3-й Артиллерійской Дивизіи Красовскій, Ординаторъ Пипешпскаго военновременнаго госпиталя Лѣкаръ Гинмъ, Ординаторъ Яскаго военновременнаго госпиталя Докторъ Медицины Надворный Совѣтникъ Вейнрейхъ, Штабъ-Лѣкаръ Муромскаго пѣхотнаго полка Павловъ, Младшій Лѣкаръ Селенгинскаго пѣхотнаго полка Архангельскій, Ординаторъ Купайскаго военнаго госпиталя Лѣкаръ Іергаузенъ, Ветеринарный Лѣкаръ Харьковскаго Уланскаго полка Яковлевъ, Ординаторъ Анхіюльскаго военновременнаго госпиталя Лѣкаръ Молчановъ, Штабъ-Лѣкаръ 16-го Егерьскаго полка Биляговъ, состоявшій во 2-й арміи сверхъ комплекта Штабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Шуббе, Ординаторъ Измаильскаго военновременнаго госпиталя Лѣкаръ Павлючъ, Штабъ-Лѣкаръ 3-го Піонернаго баталіона Коллежскій Ассесоръ Солнцевъ, Штабъ-Лѣкаръ 21-го Егерьскаго

полка Шафиковъ, Шпабъ-Лѣкаръ Саратовскаго пѣхотнаго полка Супруненко, Ординапоръ Слапинскаго военновременнаго госпиталѣ Лѣкаръ Линднеръ, Лѣкаръ пѣхотнаго Герцога Веллингтона полка Скрыбинъ, Помощникъ Полеваго Генераль-Шпабъ-Доктора 2-й арміи Коллежскій Совѣтникъ Иконниковъ, Дивизионный Докторъ 12-й пѣхотной Дивизіи Спашскій Совѣтникъ Шарфскій, Старшій Лѣкаръ Айдовскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ-Лѣкаръ Коллежскій Ассесоръ Кричевскій, Ординапоры Анхіольскаго военновременнаго госпиталѣ Лѣкари Аксеновъ и Скальскій, Старшій Докторъ Краіовскаго военновременнаго госпиталѣ Шпабъ-Лѣкаръ Надворный Совѣтникъ Войневичъ, Ординапоръ Слапинскаго военновременнаго госпиталѣ Лѣкаръ Веллеръ и Шпабъ-Лѣкаръ 1-го Украинскаго Уланскаго полка Маркевичъ.

ЛУЧШІЯ НОВѢЙШІЯ МЕДИЦИНСКІЯ СОЧИНЕНІЯ.

63. L. Mende's Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshülfe und der gerichtlichen Medizin, 5 Bde, Göttingen, 1824-1827.

64. J. F. Niemann's Taschenbuch der Staatsarzneykunde, III Bde. Leipzig, 1828.

65. J. A. Paris and J. S. M. Fonblanque Medicales Jurisprudence. III Vol. 1823.

66. C. Wenzel, über die Krankheiten des Uterus, mit Kupfern, Frankfurt am Main, 1816. Folio.

67. Toxicologie générale, par, M. P. Orfila, Paris, 1818.

M. P. Orfila, allgemeine Giftkunde, a. d. Französischen, mit Zusätzen von Hermbstädt, 4 Bde. Berlin. 1817-1820.

68. G. H. Masius, Handbuch der gerichtlichen Arzneywissenschaft, VI Bde, Stendal, 1823-27.

69. W. Remer, Lehrbuch der polizeilich-gerichtl. Chemie. II Bde. 3-te Aufl. 1828.

Ремера Судебная и Полицейская Химія. Перев. С. Гаевскимъ. 1818.

70. F. Accum, von der Verfälschung der Nahrungsmittel und von den Küchengiften. Nach d. 2-ten englisch. Ausgabe. von L. Cerutti. Leipzig. 1822.

71. Capuron, maladies des enfans jusqu'à la puberté. Paris. 1814.

J. Capuron, Abhandlung üb. d. Krankheiten der Kinder. Nach der 2-ten Ausgabe übers. Leipzig. 1821.

72. M. Rozier, des habitudes secrètes, ou de l'onanisme chez les femmes. Paris. 1824.

73. J. Capuron, la Médecine légale relative à l'art des accouchemens. Paris. 1821.

74. G. Borzelotti, Medicina legale, secondo lo spisto delle leggi civili épenali. 2. Ediz. II Tom. Pisa. 1819.

75. J. Burns, The principles of Midwifery. 5 Edit. London. 1827.

76. Manuel d' Anatomie chirurgicale, par H. M. Edwards. Paris. 1828.

77. Cours d'Histoire naturelle pharmaceutique, ou Histoire des substances usitées dans

la thérapeutique, les arts et l'économie domestique, par A. L. D. Fée. 2 vol. Paris. 1828.

78. Dictionnaire des drogues simples et composées, ou Dictionnaire d'Histoire naturelle médicale et pharmaceutique, par. A. Chevalier et A. Richard. III vol. Paris. 1828.

79. Pharmacopée raisonnée, ou Traité de Pharmacie théoretique et pratique, par N. S. Henry et Guibour. 2 vol. Paris. 1828.

СОДЕРЖАНІЕ ПЕРВЫХЪ ЧЕТЫРНАД- ЦАТИ ЧАСТЕЙ Военно-Медицин- СКАГО ЖУРНАЛА.

А.

- Asiuncatura*, прошивъ нервной боли. XII. 112 и 251.
- Actea racemosa*, прошивъ чахопки. IV. 278.
- Ajuga reptans*, прошивъ лихорадки и нѣкопрыхъ другихъ болѣзней. V. 155.
- Allium ursinum*, прошивъ цынги. XIII. 47.
- Amavrosis*, прижиганіе прошивъ. IV. 348. V. 265.
- Амміакъ, прошивъ опьяненія. XIII. 463.
- Anevrysma*, сонной артерій, перевязана за опухолью. VII. 245. IX. 282.
- *aortæ thoracicae*, вскрывшаяся въ позвоночный столбъ. V. 264.
- наростъ принять за аневризму. XIII. 459.
- наружной подвздошной артеріи. II. 3. IV. 79. V. 321. XIII. 448.
- *per anastomosin*. I. 75.
- подключичной артеріи. III. 33.
- *popliteum*, лѣченіе глиною. V. 357.
- Angina pectoris*. IV. 45.
- *poliposa*, см. жаба.
- Anus artificialis*. VII. 521.
- Artemisia vulgaris*, прошивъ падучей. VI. 130.

II

Arteria innominata, раненая зажима. VII. 116.

— iliaca communis, съ успѣхомъ перевязана. XIII. 448.

Asthma, у дѣтей. VI. 18.

Б.

Бабка повивальная заражала родильниц. VIII. 76.

Бедро, изсѣченіе онаго. VI. 43.

Belladonna, см. красавица.

Беременность брюшная, вскрытіе бр. полости.

V. 94. VII. 202.

_____ пятью младенцами. V. 363.

Берцовая больш. кость, частное изсѣченіе оной.

XIV. 364.

померщивніе, частное
изсѣченіе. XIV. 367.

Блекота, hyoscyamus niger, опь зубной боли.

VII. 99.

Бобровая струя, способъ различать ее. VI. 129.

Боль лица, prosopalgia, мышьякъ пропивъ. II.

387.

— — — — — прижиганіе прошивъ. IV.

354.

— — — — — extract. belladonae. VII.

118.

— — ГОЛОВЫ. IV. 275. VII. 85. IX. 137.

— — — прижиганіе прошивъ. IV. 353.

— — — кофе пропивъ. IX. 462.

— — желудка, масло ромашки пропивъ. IX. 461.

Боль живота, перецъ пропивъ. II. 370.

— — — — — у дѣтей. VI. 24.

— — зубовъ, блекопа пропивъ. VII. 99.

— — нервная. XII. 106.

— — — — — асирунтура пропивъ. XII. 112, и 251.

— — — — — скипидаръ пропивъ. VI. 131.

— — — — — углекислое желѣзо пропивъ. XII. 124.

Болѣзнь Англійская. VI. 150.

Болѣзни, наименованія и расположенія оныхъ.
IX. 3 и 189.

— — — — — дѣтскія, замѣчанія объ оныхъ. VI. 3 и 148.

— — — — — жаркихъ климатовъ. XII. 3.

— — — — — заразительныя, въ Медицинско - Полицейскомъ отношеніи. XIV. 167.

— — — — — пищеварительныхъ органовъ, способъ лѣченія оныхъ. VII. 3.

— — — — — пищеварительныхъ органовъ, *Eringium saiprestre* пропивъ. XIII. 46.

— — — — — нервныя, въ Судебно-Медиц. отношеніи. XI. 64.

— — — — — въ Судебно - Медицинскомъ отношеніи. XI. 5, 254 и 357. XII. 199.

— — — — — припворныя. VII. 337. XI. 10.

— — — — — искусственно произведенныя. XI. 254.

— — — — — ушаиваемыя. XI. 357.

— — — — — психическія, въ Суд. Мед. отношеніи.
XI. 32.

— — — — — напрасно вѣняемыя. XI. 369.

IV

Болѣзни, раздѣленіе оныхъ. X. 229.

— — различіе острыхъ и хроническихъ. X. 113.

— — худосочныя, польза кровочистительныхъ декоктовъ. VIII. 292.

— — извѣстія о лѣченіи въ Терапевтической Клиникѣ въ С. П. Б. X. 308. XII. 285. XIV. 381.

— — глазъ, замѣчаніе объ оныхъ. IV. 288.

— — — селипрокислое серебро прошивъ. XIV. 120.

Брюхо, вскрытіе онаго. VII. 194.

— — — — при беременности внѣ матки. V. 94.

— — — прободеніе при водяной. XI. 286.

Бруссе, его ученіе. XII. 23 и 157.

Bulimia, см. прожорство.

Бульонъ, сухой. V. 387.

Бура, какъ косметическое средство. IX. 139.

Бѣли, рірег субева противъ. II. 135.

— — средство прошивъ. II. 281.

Бѣлье чесоточныхъ, очищеніе онаго. I. 456.

B.

Ванны, Индійскія. IV. 277.

— — — селипро-солянокислыя. XIII. 381.

— — — муравейныя, вредное ихъ дѣйствіе. IV. 280.

Вены, воспаленіе оныхъ. XII. 269.

— — впрыскиваніе лѣкарствъ въ оныя. II. 351. IV. 98.

— — — ихъ сообщеніе съ всасывающими сосудами, см. сосуды.

В.

Венерическая, замѣчанія о лѣченіи оной. VII. 188.

— — — — — ртутью. XIV.
407.

— — — — — декокшъ Вигару пропивъ. VIII. 42.

— — — — — зараженіе чрезъ бабку. VIII. 76.

— — — — — лѣченіе Карптрейта. IX. 369.

— — — — — — — безъ ршуты. XIV. 418.

— — — — — особый способъ лѣченія. IX. 446.

— — — — — польза Кавказскихъ водъ. I. 275.

— — — — — прививаніе оной. III. 279.

— — — — — язвы въ горлѣ. IV. 264.

Вередъ, огненный опъ элизоотіи. VII. 302. VIII.
194.

Веснушки, средство пропивъ. IX. 139.

Вилки, желѣзныя проглоченныя. IV. 433.

Viscus albus, пропивъ чахотки. II. 135.

Влажность покоевъ, свинцовые листы пропивъ.
II. 431.

Внутренности, превратное положеніе оныхъ.
XIII. 96 и 101 и XIV. 145.

Вода, очищеніе оной. VI. 382. IX. 124.

— морская, ршуть въ оной. V. 388.

Воды, Кавказскія, извѣстіе объ ихъ пользѣ. I.
273. VIII. 87.

— — — — — сравненіе ихъ съ иностранными.
III. 239 и 299.

— Сергіевскія. V. 39.

Водобоязнь, лѣченіе оной въ Ліонѣ. IV. 273.

VI.

Водобоязнь, высасываніе яда. IV. 273.

— — — — — пузырьки подъ языкомъ при оной. I.
437.

— — — — теплая кровь прошивъ оной. IV. 427.

— — — — у коровы. II. 283.

Водяная въ патологико-терапевтич. отношеніи.
XIV. 101.

— — — головная и другія, у младенцовъ. VI. 31.

— — — мышечная въ брюхѣ. VII. 207.

— — — пилюли проптивъ. III. 131.

— — — позвоночного столба, см. Spina bifida.

— — — послѣ лихорадки. VII. 182. XIII. 262.

— — — послѣ скарлатины. IX. 393.

— — — польза селитры. XI. 282. XIII. 85.

— — — составовъ. X. 52 и 151.

— — — средство прошивъ. III. 131 и 427. VII. 119.

Водянки (hydatides) въ большой берцовой кости.
XIV. 364.

Воздухъ близъ моря содержишь соляную кис-
лоту. X. 550.

Возгораніе, произвольное людей. IX. 102.

Ворвань, см. oleum jecinoris azelli.

Воспаленіе венъ. XII. 269.

— — — — — глазъ, въ войскѣ — въ Польшѣ. II.
26.

----- — — искусственное. XI. 274.

----- — — Египетское. I. 89.

— — — — — въ Кронштадтѣ. II. 322. III. 78.

— — — — — Крыму. III. 208.

— — дѣченіе. IV. 289.

Воспаленіе глазъ, лѣченіе *Ogallorana*. VI. 95 и 168.

-----сѣрноокислая мѣдь пропивъ. VI. 103.

XIII. 298.

-----селипрокислое серебро пропивъ.

XIV. 10.

-----райка. IV. 302.

-----въ груди, рвошная соль пропивъ. II. 66.

-----клетчатой плевры. X. 520. XIII. 75.

-----мозга. X. 528.

-----спиннаго. XIII. 409.

-----у дѣшей. VI. 9.

-----легкихъ у дѣшей. VI. 4.

-----мочеваго пузыря. VII. 312.

-----произведеніе онаго. V. 231.

-----соспавляешъ сущность чумы. V. 502.

Вскрышіе мершвыхъ тѣлъ, руководство для се-
го. IV. 232.

Volvulus intestinorum, см. завипокъ.

Вывихъ бедра, произвольный. VI. 194.

Вывихи, замѣчаніе объ оныхъ. X. 181.

Вѣко, выворотъ. IV. 319.

-----заворотъ. IV. 329.

Г.

Галванизмъ, опыты надъ шрупомъ. V. 114.

Гальбанъ, въ болѣзняхъ глазъ. IV. 145.

Гастрическій способъ лѣченія. VII. 3.

Gastrobrosis, см. желудокъ.

hemeralopia, см. слѣпоша.

Genista luteotinctoria пропивъ водобоязни. I. 448.

Гигіена, пропичекая. XI. 205.

Часть XIV. N. 3.

VIII

- Гигіена, въ военное время. XII 139.
- Hydrophobia, см. водобоязнь и III. 455.
- Глазь, гальбанъ въ болѣзняхъ онаго. IV. 143.
- замѣчаніе о ——— IV. 288.
- прижиганіе въ ——— IV. 354.
- Глина, для лѣченія подкожной аневризмы. V. 357.
- Глисты, корки гранатоваго дерева прошивъ. XIV. 140.
- масло папоротниковоe прошивъ. XI. 127.
- *Шабертова* ——— XIV. 85.
- у дѣшей. VI. 25.
- проѣли пищепріемное горло. II. 237.
- ихъ происхождение. V. 243 и 365.
- плоскія, лѣченіе скипидаромъ. II. 395.
- ——— въ мочевомъ пузырьѣ. V. 386.
- *Шмитовъ* способъ лѣченія. XIII. 345.
- Гомеопатія. IX. 335. XIV. 329.
- Гомеопатическое лѣченіе естъ выжидательное. XIV. 300.
- Горбы, способъ лѣчить оныя. XIII. 444.
- Горло дыхательное, лѣченіе суженнаго. XIV. 420.
- Горло пищепріемное сросшееся. IV. 142.
- проѣденное глистами. II. 237.
- Горячка воспалительная (synocha). X. 552.
- желтая, Американская, ящикъ съ вещами умершихъ опъ оной. II. 138.
- желчная въ Тифлисѣ. II. 103 и 107.
- ртуть прошивъ оной. II. 107.

IX

- [illegible]

Д.

- Daphne mezereum, нарывающая смола. V. 213.
Datura stramonium, см. дурманъ.
Декоктъ *Вигару*. VIII. 42.
— — — кровочистительный. VIII. 292.
— — — Лузитанскій и *Циттмановъ*. VIII. 151.
— — — *Поллиновъ*. VIII. 321.
— — — *Циттмановъ*. VIII. 525. XII. 334.
Delirium tremens, см. горячка отъ пьянства.

X

Diabetes mellitus. V. 384.

Dispersia, лѣченіе. XIV. 397.

Дрожжи, прошивъ померштвѣнія. VI. 264.

Дурманъ, полезное и вредное дѣйствіе онаго.

VII. 94.

— — — — прошивъ кашля. III. 128.

Дыханіе, звуки онаго какъ признакъ. XI. 105.

Дѣтскія болѣзни, ихъ лѣченіе. VI. 5 и 148.

E.

Episootia Aphgota. VIII. 137.

Erisipelas, см. рожа.

Eryngium campestre, въ болѣзняхъ брюха. XIII. 46.

***Euphorbia palustris*, какъ лекарство въ Сибири.**

XIII. 45.

Ж.

Жаба грудная (Angina pectoris). IV. 43.

— перепончатая, лѣченіе. VI. 7.

----- квасцами. XIII. 46о.

----- табакомъ, XIV.424.

— — — у дѣшей. VI. 5.

Жабы въ желудкѣ женщины. IX. 404.

Желвакъ, губчатый, артеріальный, см. аневризма.

Желѣзо углекислѣе, проптивъ нервной боли. XII.

I 24.

Желудокъ, дыра онаго. IV. 144. VII. 123.

----- примѣчательное раненіе онаго. VII.

103.

Желчь, исследование особойливой. X. 255.

Желчный пузырь, необыкновенно расширенный.

II. 430.

Жиръ, разложеніе членосоставнаго. V. 392.

З.

Завалы внутренностей, Кавказскія воды про-
пивъ. I. 276.

----- послѣ лихорадокъ. VII. 181.

Завипокъ (volvulus) кишекъ, лѣч. операціею.
VII. 200.

Задній проходъ, запертый у 70-пильпняго спа-
рика. VI. 127.

----- лѣч. операціею. VII.
201.

----- искусственный, при суженіи
прямой кишки. VII. 321.

Запоръ мочи, табакъ пропивъ. II. 426.

----- на низъ, бѣшенство отъ онаго. III. 421.

----- скипидаръ пропивъ. II. 97.

----- отъ ущемленія кишекъ въ саль-
никъ. XIII. 91.

Зараза, свойства оной. XIV. 168.

----- способы предохраненія отъ оной. XIV. 181.

----- испребляется хлор. известью. XIV. 416.

Здравіе солдатъ, способъ сохранять оное. XII. 159.

Зелень, порча и подмѣси оной. XIV. 236.

Зобъ, средство противъ. II. 251. VI. 103. IX.
458.

Золотуха, методическія втиранія прѣтивъ. XII.
557.

ХП

Золотуха у младенцовъ. VI. 36.

----- хлориновая известь пропивъ. X. 288.

Зубы, польза лиственичной смолы. XIII. 48.

---- прудное прорѣзываніе, средство пропивъ.
XIII. 141.

----- сопровождаемое сы-
пями. VI. 6 и 227.

Зудъ, средство пропивъ. IV. 432.

Зунзуй, Кипайское лѣкарство. XIII. 51.

Зѣница, искусственное образованіе оной. IV. 305.

И.

Иглы, выходившія изъ пѣла. II. 208.

Известь хлориновая. VII. 359. X. 283.

----- хлориновая въ Медико-Полиц. употреб-
леніи. X. 299.

----- истребляетъ заразу. XIV.
416.

Изнуреніе, прижиганіе пропивъ. IV. 355.

Influenza, см. насморкъ.

Іодинъ. II. 119, 251.

---- пропивъ подагры. XIII. 136.

Инструменты хирургическіе, предписаніе Воен-
нымъ Врачамъ объ оныхъ. I. 280.

Intussusceptio intestinorum, излѣч. операціею. VII.
38.

Iritis, см. воспаленіе райка.

Испражненія, припворныя. XI. 88.

Истерика, senecio vulgaris пропивъ. IV. 147.

К.

Кавказскія минеральныя воды, см. воды.

Каде-де Во, лѣчение ревматизма. XIV. 399.

Камни желчныя, вышедшіе чрезъ пупокъ. VI.
119.

——— кишечные. VIII. 83.

——— мочевые, изсѣчение чрезъ прямую кишку.
V. 179. X. 351.

——— ——— раздробленіе оныхъ. X. 337.

——— въ поджелудочной желѣзѣ. XIV. 386.

——— почечные, средство противъ. IV. 277.

——— въ сѣмянныхъ венахъ. IX. 95.

Камфора, припадки у младенца отъ паровъ. IV.
430.

Катарръ эпидемическій въ Сибири. VIII. 283.
IX. 379.

——— ——— въ С. Петербургѣ. XII.
287.

Кашель, пилюли противъ. III. 151.

——— у дѣтей, лѣчение. VI. 13.

——— ——— судорожный, *belladonna* противъ.
VI. 16.

Квасцы съ селипрою для сбереженія анатомическихкихъ препаратовъ. II. 431.

Карбункуль, см. вередъ.

Кислоша древесная. XI. 409.

——— селипросоляная въ ваннахъ. XIII. 381.

——— синильная. III. 363.

——— ——— противъ рака. VI. 130.

XIV

Кислота синильная, оправленіе оною. IV. 428 и 430.

——— соляная въ воздухѣ близь моря. X. 350.

——— уксусная, припарки съ оною. IV. 141.

Кишки, измѣненіе при чахоткѣ. XIV. 111.

——— ножницы для вскрытія. X. 239.

——— примѣчательное совлoженіе (intussusceptio). X. 355.

——— полиповидныя сращенія. XIV. 385.

——— признаки сжатія ихъ. VII. 197.

——— совлoженіе, излѣченное операціею. VII. 58.

——— суженіе отъ воспаленія. XIV. 585.

——— ущемленныя въ сальникѣ. XIII. 91.

Клей распительный, пропивъ оправленія сулемою. IV. 377.

Климатъ, вліяніе жаркаго на Европейцовъ. XI. 167.

Клопы ядовитыя въ Персіи. I. 128.

Ключица, изсѣченіе. XIV. 361.

——— переломъ, сросшійся у новорожденнаго. V. 359.

——— помертвѣніе. XIV. 359.

Кожа, болѣзни, Сергіевскія воды полезны. V. 55.

——— припворныя. XI. 366.

——— хлориновая извѣсть полезна. X. 293.

——— у младенцовъ. VI. 152.

——— окрѣпая — VI. 154.

Колика, см. боль живота.

Кондиломы, средство пропивъ. III. 129.

Костовѣда пясныхъ костей. V. 75.

Корнинъ (sulphas cornini), лѣкарство противъ лихорадки. X. 49.

Кофе, противъ боли головы. IX. 462.

Красавица (belladonna), при боли лица. VIII. 118.

— — — — при судорогахъ мочевого канала. III.

281.

— — — — противъ судорожнаго кашля. VI. 16.

Кровь, ея количество въ живономъ. V. 266.

— — — — причина цвѣта оной. X. 279.

— — — — электричество оной. V. 390.

— — — — полезна въ водобоязни, см. водобоязнь.

Кровопускание, замѣчаніе о назначеніи онаго. X,

316.

— — — — — противъ лихорадокъ. XIII. 462.

Кровонакопленіе въ легкихъ. XI. 384.

— — — — — въ мозгѣ, при чумѣ, V. 291.

Кровотеченіе изъ глазъ. IX. 142.

— — — — — изъ мапки, прижатіе брюха противъ. V. 268.

— — — — — перевязываніе конечностей при ономъ. VI. 217.

— — — — — послѣ пѣвока, древесная кислота противъ. XI. 427.

Кровохарканіе, селитра противъ. IX. 135.

Кубанская земля, Топографія. VIII. 225.

Куго, Кипайское лѣкарство. XIII. 450.

Л.

Лабиринтъ уха, способъ показывать оный. XIII,

462.

Лактукарій. XI. 279.

XVI

Laparatomia, см. брюхо.

Lecheguanna, медъ ея ядовитый. V. 224.

Легкія, ихъ болѣзни. XIV. 108.

————— изслѣдованіе, см. степоскопъ.

————— лѣченіе воспаленія. XIV. 393.

————— кровонакопленіе въ оныхъ. XI. 384.

Ледъ, при воспаленіи брюха. X. 133.

Лень, падучая опъ поглощенія онаго. VII. 121.

Lithontritia, см. камни мочевые.

Lithotomia, см. камни мочевые.

Лихорадки, аюга reptans пропивъ. V. 155.

————— въ Бессарабіи. XIII. 247.

————— Грузинская, *Минервина* способъ лѣченія. II. 149.

————— замѣчанія объ оныхъ. XIII. 3.

————— изнурипельная у младенцовъ. VI. 158.

————— кровопусканіе пропивъ. XIII. 462.

————— мышьякъ пропивъ. II. 276.

————— въ Полтавской губерніи. VII. 172.

————— полупридневная. VI. 283.

————— рвотная соль пропивъ. XIV. 155.

————— рѣдки въ С. Петербургѣ. XII. 289.

XIV. 390.

————— thus cotinus пропивъ. II. 178 и 404.

————— въ Сибири. VII. 66.

————— эпидемическая въ Голландіи. VIII. 269.

Лишай зависить опъ разстройства пищеваренія. XII. 249.

————— разѣдающій, *Гелмундово* лѣченіе. VI. 257.

Лишай пропическій. XI. 200.

Lycopodium selago, отравленіе онымъ. IV. 146.

Лобная кость, просверленіе при скопленіи слизи
подъ оною. VII. 137.

Ломоша, аjuga reptans пропивъ. V. 159.

Lupus, наростъ, лѣченіе. XIV. 147.

Лѣкарство, впрыскиваніе въ вены. II. 351.

———— о приѣмъ изъ магазиновъ и аптекъ.
IV. 148.

———— древнія и новѣйшія приготоовленія.
IX. 296.

———— приемы по теоріи controstimuli. II.
317.

Лѣченіе, главные способы онаго. XIV. 296.

———— ————— по Ганеману. IX.
337.

M.

Мазь нарывающая. V. 213. IX. 459.

———— рпупная, см. рпупная мазь.

———— сѣрнопеченочная вмѣсто ваннь. XIII. 120.

Масло миндальное, см. грудь.

———— папоротниковое пропивъ глистовъ. XI. 127.

———— выжатое пропивъ чумы. XIII. 40 и см.
чума.

———— ромашки пропивъ боли желудка. IX. 461.

———— Шабертово пропивъ глистовъ. XIV. 85.

———— шалфея пропивъ ночныхъ половъ. VIII. 67.

Матка двойная. IV. 271.

———— сжиманіе оной по смерпи. II. 277.

XVIII

Матка, ракъ оной. IX. 454.

Маточное рыльцо, отсѣченіе онаго. IX. 318.

Медицина Полицейская, жизненные припасы. XIII.

165 и 323. XIV. 5 и 217.

——— причины несовершенства ея теоріи.
XII. 45.

——— Судебная, см. болѣзни.

Медъ ядовитый. V. 224.

Melanosis, см. черновикъ.

Mezereum, нарывающая смола изъ онаго. V. 213.

Мозгъ, воспаленіе онаго. X. 328.

Мозоли, селипрокислое серебро противъ. XIV.
113.

Мокса противъ падучей. IX. 428.

——— ——— Phlegmasia alba dolens. XIII. 461.

——— способъ приготавливать оную. XIV. 137.

Молнія, исторія пораженнаго оною. II. 91.

Молоко ядовитое. II. 429.

Morphium противъ судорогъ мочеиспускательна-
го канала. IX. 317.

Мошонка, каменистыя опухоли на оной. XIV.

Мохъ Исландскій, препараты. X. 137.

Моча, испражненіе произвольное, припворное,
VII. 352.

——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———
черезъ изрѣженіе воздуха. IV.
281.

—— — рпуть въ оной. X. 358.

—— — сахарная. V. 384.

—— — табакъ противъ задержанія оной. II. 426.

Мочеиспускательный каналъ, запертый у 70-лѣт-
наго спарика. VI. 127.

Муравьи, дѣйствіе ваннъ изъ оныхъ. IV. 280.

Мушки шпанскія пропивъ нервной боли. XII. 107.

Мышьякъ, высасываніе онаго. II. 136.

———— опкрытіе онаго при оправленіи. XIII.
128.

———— пропивъ боли лица. II. 387.

———— лихорадки. II. 276.

———— поноса съ горячкою. II. 111.

———— средство пропивъ оправленія. XIII.
291.

———— рака. VI. 248.

Мѣдъ сѣрнокислая при воспаленіи глазъ. VI. 103.
XIII. 298.

Мѣсячное кровоочищеніе, ајуга reptans полезно.
V. 159.

———— возбуждается прижиганіемъ. IV. 551.

———— ranunculus acris полезно. IV. 552.

———— Сергіевскія воды. V. 57.

Мясо, порча и поддѣлки онаго. XIII. 175.

Myelitis, см. воспаление мозга.

Н.

Народонаселеніе земнаго шара. II. 432.

Наросты каменистые на мошонкѣ. XIV. 423.

Наростъ костной на пальцѣ. V. 66.

———— жировидные въ брюхѣ. X. 128.

Нарывающее средство. V. 213.

XX

- Нарывъ, способъ лѣчить глубокіе. IX. 313.
Насморкъ эпидемическій въ Сибири, см. капарръ.
Насѣкомыя, извергаемыя рвотою. V. 260.
Насѣчки, для лѣченія болѣзней соспавовъ. XIV.
424.
Напръ углекислый вмѣсто іодина. VI. 109. IX.
458.
Нервные болѣзни, прижиганіе противъ. IV. 556.
Нервы, новѣйшія отккрытія объ оныхъ. XII. 207.
——— признаки воспаленія. XII. 114.
——— скипающійся, смерть отъ раненія онаго.
III. 286.
——— чувствованія и движенія. XII. 207 и 230.
Ножи, глашпель оныхъ. V. 104.
Ножницы для вскрытія кишекъ. X. 139.
Носологія, см. болѣзни.
Нух vomica, экстрактъ. IX. 305.
—— ———— полезень въ параличѣ. XII. 88.
Нѣмопа припворная. XI. 277.

О.

- Обливанія холодныя противъ отравленія оніемъ.
I. 115.
Огневикъ, см. вередъ.
Околосердечіе, воздухъ въ ономъ. VII. 119.
——— прободеніе (paracentesis). IX. 311.
——— недоспашокъ онаго. IV. 426.
Окостенѣніе онаго. V. 263.
Окуриваніе для истребленія заразы. XIV. 204.
Oleum jecinatoris azelli. XIV. 138.

Онанизмъ, болѣзни сердца отъ онаго. XIV. 403.

Опій, впрыскиваніе въ вены. II. 362.

— — отккрытія при оправленіи. I. 122.

— — оправленіе младенцовъ. VI. 29.

— — — — — наружнымъ употребленіемъ. IX.

312.

— — при раздраженномъ состояніи легкихъ. X.

318.

— — пропивъ полиповъ. I. 128. IV. 275. XIV.

146.

— — холодныя обливанія пропивъ оправленія. I.

115.

Opіi tinct. bensoica. IX. 302.

— — — — — simplex, лучший способъ приготовленія.

IX. 302.

Опухоль бѣлая состава. VI. 184 и 390.

— — — — — плечевого. VII. 271. VIII.

3 и 149. IX. 151.

— — — — — брыжеечныхъ железъ. X. 336.

— — — — — водяная составовъ. X. 52 и 151.

— — — — — искусственная. XI. 269.

— — — — — у младенцовъ. VI. 148.

— — — — — яичекъ, лѣченіе, см. яичко.

Опьяненіе, амміакъ пропивъ. XIII. 463.

Оспа коровья, дѣйствія ея на другія болѣзни.

III. 382.

— — — прививаніе овечьей. III. 266.

Отвлеченіе, revulsio. XII. 234.

Оправленіе, правила для изслѣдованія. IV. 3.

XXII

Отравленіе, лѣченіе. XIV. 61 и 286.

——— lycopodio selagine. IV. 146.

——— рвотное особливаго рода пропивъ.

II. 283.

II.

Падучая, *Artemisia vulgaris* пропивъ. VI. 130.

——— излѣченная моксоу. IX. 428.

——— мазь рвотнаго камня пропивъ. IV. 282.

——— опъ проглощеннаго льна. VII. 121.

——— у младенцовъ. VI. 161.

Память, потеря оной, лѣченіе прижиганіемъ. IV.

345.

Параличъ, электрическій угоръ пропивъ. II. 427.

——— *Extract. nucis vomicæ* пропивъ. IX. 305.

XII. 323.

——— Кавказскія воды пропивъ. I. 276.

——— полупараличное состояніе всего шѣла.

XII. 235.

——— замѣчанія объ ономъ. XII. 329.

——— *rhys toxicodendron* пропивъ. II. 427. IV.

243.

Патологико-анатомическія наблюденія. VIII. 243.

Паукъ какъ нарывное средство. II. 280.

Перелой (*blennorrhæa*), лѣченіе *pirepe cubeba*.

XIV. 400.

Переломы бедра, излѣченіе бедра. VI. 46.

——— ключицы, сросшіеся у новорожденнаго.

V. 261.

——— костей, замѣчанія объ оныхъ. X. 85.

Перепонки, вышедшія изъ мочевого канала. VII.
318.

Перецъ противъ лихорадокъ. II. 378. III. 426.

——— черный противъ боли живота. II. 370.

——— cubeba противъ перелоя. XIV. 400.

——— бѣлей. II. 135. •

Pericardium, см. околосердечіе.

Печень, лѣчение заваловъ припарками съ уксу-
сомъ. IV. 141.

Phlebitis, см. вены.

Phlegmasia alba dolens, см. воспаление венъ.

——— мокса противъ. XIII. 464.

——— лѣчение повязкою. XII.
183.

Пиво сосновое противъ цынги. V. 173.

Piper cubeba, см. перецъ.

Пиропонидъ, лѣкарство. XIII. 133.

Пищевареніе, вліяніе нервовъ на оное. XII. 132.

——— опыты чрезъ свищъ желудка. VII. 237.

——— худое, см. Dispersia.

Пища въ Медицин.Полиц. отношеніи. XIII. 176.

——— живописная ————

——— расписательная ———— XIV. 3 и

217.

Піявицы, модное лѣкарство въ Парижѣ. III. 288.

——— торгъ ими, содержаніе ихъ и проч. VII.

254 и 372.

Плечо, вывихъ обоихъ. VI. 128.

Плоскость наклоненная, для лѣченія переломовъ.

X. 89.

XXIV

Повязки круговыя для лѣченія phlegmasiæ albæ dolentis. XII. 283.

Подагра, іодинъ пропивъ. XIII. 136.

——— электрическій угоръ пропивъ. II. 427.

Покровы общіе, ихъ Анапомія. XIV. 135.

Полипы, опій пропивъ. I. 128. IV. 275. XIV. 146.

Pollutiones, средство пропивъ. II. 281.

Поль, вліяніе родителей на поль дѣтей. XIII. 142.

Помершвѣніе, дрожжи пропивъ. VI. 264.

——— хлориновая извесьть пропивъ. X. 294.

Понось въ Бессарабіи. XIII. 266.

——— напужный. IX. 65. XII. 5.

——— на Кавказѣ. VIII. 137.

——— послѣ лихорадокъ. VII. 184.

——— простой. XII. 17.

——— припворный. VII. 341.

——— ршунъ пропивъ. II. 106.

——— у дѣтей. VI. 20.

Пострѣль, лѣченіе рвовными. X. 353.

——— прижиганіемъ. IV. 366.

Пѣшуги, рожки для возбужденія оныхъ. XIII. 139.

——— и 366.

Почечуй, ајуга reptans полезна. V. 159.

——— Сергіевскія воды. V. 56.

Почки, измѣненіе оныхъ при водяной. XIV. 102.

Препараты анапомическіе, сбереженіе оныхъ. II.

——— 451.

Прижиганіе брюха при кровотеченіи изъ мапки.

——— V. 268.

Прижиганіе, въ нервной заразителной горячкѣ.

I. 366.

————— для лѣченія горбовъ. XIII. 444.

————— какъ врачебное средство. IV. 343.

————— при глазномъ тускѣ. V. 266.

————— при поспрѣлѣ. IV. 365.

Признаки болѣзней легкихъ. XI. 105.

————— кровонакопленія въ легкихъ. XI. 384.

————— нервной боли и воспаленія нервовъ. XII.

114.

Припасы жизненные въ Медико-Полицейскомъ
отношеніи. XIII. 165 и 323. XIV. 3

и 217.

Прожорство. XII. 320.

————— средство противъ. II. 282.

Prozoralgia, см. боль лица.

Проходъ задній, искусственный. VII. 321.

Пузырь мочевоы, воспаленіе онаго. VII. 312.

Pupilla, см. зрачекъ.

Пястные кости, изсѣченіе. V. 66 и 75.

Пятна на пѣлѣ, съ кровотеченіемъ, лѣченіе
скипидаромъ. II. 400.

Р.

Rachitis, см. болѣзнь Англійская.

Raphania. V. 147.

Ракъ, древесная кислота противъ. XI. 409.

————— матки. IX. 454.

————— сердца. II. 281.

————— синильная кислота противъ. VI. 130.

*

XXVI

- Ракъ, средство противъ. V. 355. VI. 244.
- Рана Arter. innominatæ зажила. VII. 116.
- порѣзанныя, ихъ лѣченіе. XIII. 55.
- примѣчательная черепа. VI. 234.
- съ выпаденіемъ желудка. IX. 455.
- фосфорическій свѣтъ изъ оной. II. 134.
- ядовитыя, лѣченіе. XIV. 72 и 276.
- Раненіе, огнеспрѣльное, въ полоспи зѣва. II. 84.
- Ranunculus acris противъ задержанія мѣсячнаго
кровоочищенія. IV. 352.
- ——— лихорадокъ. IV. 352.
- Рвота насѣкомыми. V. 260.
- Рвотная соль для ослабленія мышцъ при вы-
вихахъ. X. 185.
- ——— противъ воспаленія груди. II. 66.
- ——— лихорадокъ. XIV. 135.
- ——— саюнопеченія опъ рпу-
ши. XIII. 138.
- Рвотное, впрыснутое въ вену. IV. 98.
- въ поспрѣлѣ. X. 353.
- Ревень, щелочь изъ онаго. III. 283.
- Ревматизмъ, Кавказскія воды противъ. I. 276.
- oleum jecinoris azelli противъ. XIV.
138.
- переносъ на сердце. XII. 300.
- лѣченіе. XIV. 399.
- Revulsio. XII. 234.
- Rhus cotinus противъ лихорадокъ. II. 404.
- toxicodendron противъ паралича. II. 427.
IV. 2 9

Рожа лица отъ гноепточника. XII. 328.

——— художественная. X. 520.

Рожки для возбужденія по́пугъ. XIII. 139 и 366.

——— портятъ хлѣбъ. XIV. 4.

——— причина garhaniæ. V. 150.

Roob antisymphilitique. VIII. 314.

Ртуть, вредъ отъ употребленія оной въ венерической. XIV. 407.

——— въ морской водѣ. V. 388.

——— въ мочѣ. X. 558.

——— противъ лихорадки. II. 107.

——— селипрокислая противъ венерической.
IX. 446.

——— солянокислая въ большихъ приѣмахъ противъ венерической. IX. 369.

Ртутная мазь противъ труднаго прорѣзыванія
зубовъ. XIII. 141.

————— чумы. XIII. 40.

C.

Salix alba, противъ чахотки. II. 135.

Salvia aethiopis, отъ язвъ. VIII. 155.

Scrophula, см. золотуха.

Scordium, противугнилостное средство. VIII.
235.

Сведеніе и слабость членовъ, припворныя. VII.
345.

Свидѣтельства Медицинскія, предписанія о выдачѣ оныхъ. I. 279.

Свинецъ, средства противъ отравленія. VI. 128.

XXVIII

Свинець фосфорическій, употребленіе внушрь.
VIII. 60.

Свинцовые листы пропивъ влажності покоевъ.
II. 451.

Свищъ желудка. VII. 103 и 257.

—— мочевыхъ органовъ, прямой кишки и ру-
кава. XII. 66 и 168.

—— слезный. IV. 516.

—— — — — — лѣченіе безъ операціи. X. 348.

Свѣтъ фосфорическій изъ ранъ. II. 154.

Свѣчи врачебныя при ущемленныхъ грыжахъ. V.
551.

Связки, распряженіе оныхъ. XIV. 128.

Secale cornutum, см. рожки.

Селезенка, не найдена въ прулѣ. XIII. 108.

—— — — — — разрывъ оной. XIV. 589.

Селипра для сбереженія анапомическихъ пре-
паратовъ. II. 451.

—— — — — — пропивъ водяной. XI. 282. XIII. 85.

—— — — — — кровохарканія. IX. 155.

Senecio vulgaris пропивъ исперики. IV. 147.

Сердце, болѣзни припворныя. XI. 256.

—— — — — — опъ онанизма. XIV. 403.

—— — — — — воспаленіе послѣ ревматизма. XII. 500.

—— — — — — изслѣдованіе болѣзней онаго. XI. 125.

—— — — — — ракъ. II. 281.

—— — — — — рубецъ на ономъ. V. 262.

—— — — — — трепешаніе у дѣтей. VI. 19.

—— — — — — хроническое воспаленіе. II. 112.

—— — — — — недуги. IV. 45.

Серебро селипрокислое, при воспаленіи глазъ.

VI. 105.

— — — — — наружное употребленіе

оного. XIV. 115.

Синильная кислопа, см. кислопа.

Синюха (Cyanosis). X. 135.

— — — — — у младенцовъ. VI. 156.

Сигоссо, въпръ. VI. 128.

Скипидаръ противъ глистовъ. II. 395.

— — — — — запора на низъ. II. 97.

— — — — — нервной боли. VI. 131.

— — — — — пшень съ кровопеченіемъ.

II. 400.

— — — — — столбняка. III. 126.

Скорбуть, см. цынга.

Слабительныя лѣкарства, замѣчанія объ оныхъ.

VII. 27.

Слабость, Кавказскія воды противъ. I. 277.

— — — — — истинная и ложная. VII. 6.

Слизешеченіе, Сергіевскія воды полезны. V. 59.

Слухъ, прижиганіе въ болѣзняхъ оного. IV. 354.

Слюнопеченіе отъ ртуті, средство противъ.

XIII. 138.

Слѣпопа куриная. IX. 436.

Смерть мнимая. III. 419.

— — — — — способъ оживлять новорожден-
ныхъ. XIV. 148.

— — — — — отъ раненія нерва скипающагося. III. 286.

— — — — — страха. III. 285.

— — — — — при магнетизированіи. III. 426.

XXX

- Смола липтвеницы, зубное средство. XIII. 48.
Сода углекислая, см. напръ.
— — хлориновая. XIII. 276.
— — — — — противъ шолудей. IV. 141.
Соль изъ язвы. IX. 465.
— — морская въ ранѣ и сѣюнѣ. II. 133.
Solani tuberosi extract. II. 135.
Сонная артерія, см. *aneurysma сонной артеріи*.
Сосавъ, бѣлая опухоль. VI. 184 и 390.
— — — — — плечевого. VII. 271. VIII.
3 и 149. IX. 151.
— — — водяная опухоль. X. 52.
— — — лѣченіе нѣкопорохъ неподвижныхъ со-
спавовъ. XIV. 424.
— — — излѣченіе бедра изъ онаго. VI. 45.
Сосуды всасывающіе сообщаются съ венами. XI,
455.
— — — парочные, Сергіевскія воды полезны въ
болѣзняхъ оныхъ. V. 46.
Сперматинъ. V. 391.
Spina bifida, излѣченная прокалываніемъ. XIII,
158. XIV. 145.
Стафиломъ глаза. IV. 326.
Щетоскопъ. XI. 105.
Столбнякъ (*tetanus*), замѣч. патолог.объ ономъ.
XIII. 425. XIV. 425.
Страхъ, смерть отъ онаго. III. 285.
Struma, см. зобъ.
Suboxidum hydrarg. въ желчной горячкѣ. II. 107.

Судебно-Медицинское разсматриваніе болѣзней.

XII. 199.

Судороги у младенцовъ опъ зубовъ. VI. 227.

Судороги мочеиспускательнаго канала, морѣй про-
пивъ. IX. 317.

— — — скипидаръ пропивъ. III. 126.

— — — челюстей, излѣченныя гноепочникомъ и
рпушною мазью. III. 426.

Сулема, клей распишительный пропивъ оправленія
оною. IV. 377.

Сумасшество, замѣчанія объ ономъ. XIII. 452.

— — — — — опъ запора на низъ. III. 421.

Сыворотка крови, изслѣдованіе. V. 593.

Сыпь, см. болѣзни кожи.

Сыпи у младенцовъ. VI. 162.

Т.

Табакъ пропивъ запора мочи. II. 426.

———— — — — перепонч. жабы. XIV. 424.

Тарангуль, укушеніе его. IV. 111.

Tartaras stibii et potassae, см. рвотная соль.

Теорія Бруссе. XII. 23 и 156.

———— contrastimuli. II. 297.

———— Медицины, причины ея несовершенства.
XII. 45.

Tinea capitis, см. шолуди.

Топографія Кубанской земли. VIII. 225.

— — — — — нѣкоторыхъ уѣздовъ Черниговской гу-
берніи. IX. 252.

Trepanatio cranii, см. черепосверленіе.

XXXII

Тѣла умершихъ, руководство для Судебнаго вскры-
пія оныхъ. IV. 252.

Тѣла умершихъ при вскрытіи обмывать хлорино-
вою известью. X. 299.

У.

Убийство (само), для усовершенствованія науки.
IV. 276.

Угольный паръ, смерть отъ онаго. IV. 276.

Угорь электрическій, пропивъ паралича и подаг-
ры. II. 427.

Укалѣваніе иглою, пропивъ нервной боли. XII.
112 и 251.

Укусъ пропивъ зуда. IV. 452.

Уродъ. IV. 145.

Ушопшій спасень. V. 219.

Ф.

Физиологическая Медицина Бруссе. XII. 23 и 156.
XIV. 298.

Fistula, см. свищъ.

Fungus, см. грибъ.

Х.

Хина, препараты изъ оной. IX. 505.

Хининъ вообще. IV. 120 и 185.

— — — разсмаприваемый какъ лѣкарство. XIII. 64.

— — — лучший способъ приготовленія. IX. 307.
X. 38.

— — — приготовленія изъ остатковъ отвара
хины. VII. 231.

XXXIV

Цынга, хлориновая известь пропивъ. X. 289.

Ч.

Чай зеленый какъ лѣкарство. XIII. 294.

Чахотка, *actea racemosa* пропивъ. IV. 278.

———— *salix alba* и *viscus album* пропивъ. II.
135.

Челюсть нижняя, изсѣченіе. XIV. 370.

Черепосверленіе, при скопленіи слизи подъ лоб-
ною костью. VII. 137.

Черновикъ (*Melanosis*). IV. 200.

Чесотка, лѣченіе. XII. 352.

———— средство пропивъ. IX. 138. XIII. 136.

———— Сергіевскія воды пропивъ. V. 55.

Членосоединеніе, см. составъ.

Чума. V. 277. X. 5.

—— Муллы и Иманы не заражаются ею. XIII. 37.

—— мѣры, употребленные въ Карсѣ. XIII. 27.

—— ртутная мазь и масло пропивъ. XIII. 40.

—— рѣдкій случай распространенія ея. II. 156.

Щ.

Шалфей, масло онаго пропивъ поповъ. VIII. 67.

Шолуди, Сергіевскія воды пропивъ. V. 55.

———— хлориновая сода пропивъ. IV. 141.

Я.

Яды, впрыскиваніе рвотныхъ въ вены пропивъ.
II. 359.

—— изслѣдованіе осправленія. IV. 3.

—— особенное рвотное пропивъ. II. 285.

- Яды, лѣчение отравленныхъ. XIV. 61.
 — раздѣленіе оныхъ. III. 277.
 — таблицы системапическія. IV.
 — трубка для выпягиванія яда. XIV. 68.
 Язвы венерическія въ горлѣ. IV. 264.
 — въ полоспи рта, селипрокислое серебро
 пропивъ. XIV. 115.
 — лѣчение древесною кислотою. XI. 425.
 — на ногахъ, лѣчение. IV. 431.
 — припворныя [искусственныя]. VII. 537. XI.
 261.
 — сосковъ, селипрокислое серебро пропивъ.
 XIV. 117.
 Яичко, польза Кавказскихъ водъ пропивъ опвер-
 дѣнія. I. 276.
 — лѣчение опухолей. XIV. 422.
 Яичники, вырѣзываніе оныхъ. V. 336.
 Ялаппа, замѣчаніе объ оной. XIV. 139.
 Ящуръ. VIII. 138.

Э.

- Электричество крови. V. 390.
 — — — — — для возбужденія дѣйствія серд-
 ца. V. 120.
 — — — — — полезно для оживленія утупшихъ.
 V. 222.
 Эпидемія лихорадокъ въ Голландіи. VIII. 269.
 — — — — насморка въ Сибири. VIII. 283.
 — — — — Aphosa на Кавказѣ. VIII. 138.
 Эрипрогенъ. X. 271.



